ENTOMOLOGISCHE
BEYTRÄGE

ZU

DES RITTER LINNE'

ZWÖLFTEN AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

VON

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, der Herzoglichen deutschen Gesellschaft in Helmstädt, der Naturforschergesellschaft in Halle, und der Königlich Schwedischen patriotischen Gesellschaft zu Stockholm.

DRITTEN THEILES DRITTER BAND.

Leipzig,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1781.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

VORREDE.

Dieser *dritte Band* meiner entomologischen Beyträge ist zu einer ziemlichen Stärke angewachsen, weil die *neuen Arten* der *Spinner*, der *Eulen* und der *Spanner* ungemein zahlreich sind. Mit den *letztern* habe ich ihn geschlossen, und werde den *vierten und letzten Theil* der Lepidopterorum mit den *Blattwicklern* anfangen; alsdann aber auch diese ganze Klasse der Insekten zu Ende bringen.

Statt des *schuldigen Nachtrags* zu allen bisher erschienenen Bänden will ich meine Leser mit den wichtigsten und neuesten *Insektenwerken* bekannt machen, die in diesem Iahre herausgekommen sind. Einige müsste ich beynahe ganz ausschreiben, welches ohne Nutzen wäre. Ein jeder kann sich daraus die Insekten aller Geschlechter und Arten sehr leicht seinem Exemplare beytragen; mich aber einer *unbeschreiblichen Arbeit* überheben.

Das erste neue Insektenwerk führt den Titel:

Repréſentation exactement colorée d'après Nature des *Cigales* & des *Punaiſes*, qui ſe trouvent dans les quatre Parties du monde, l'Europe, l'Aſie, l'Afrique & l'Amérique, raſſemblées & décrites par Caſpar *Stoll*, à Amſterdam chez Jean Chrét. *Sepp*. gr. 4. 1780.

Auſserdem hat das Werk einen holländiſchen Haupttitel, und iſt in beyden Sprachen abgefaſst. Bis jezt ſind davon *drey Hefte* erſchienen. Der Preis von jedem 4 holländiſche Gulden. Bey dem dritten wird verſprochen, daſs den Beſitzern des Originals auch der *deutſche Text* unentgeldlich ſolle nachgeliefert werden. Ferner, daſs jeder deutſche Textbogen des eigennützigen Nachdrucks wegen durch J. C. *Sepp* eigenhändig ſolle unterſchrieben ſeyn, auf daſs keine verſtümmelte Kopie dieſes Werks für das Seinige ausgegeben werde.

Wer die *Seppiſchen Malereyen* aus den Niederländiſchen Inſekten und aus ſeinem Vogelwerke kennet, der wird ſich bey dieſem gleichen Fleiſs, gleiche Feinheit und Geſchicklichkeit verſprechen können.

Dieſes gegenwärtige iſt gleichſam ein Pendant zu Cramers Papillons exotiques, deren Ausgabe Herr *Stoll* jezt beſorget. Nur Schade, daſs man in beyden Werken, bey den Inſekten, wie im *Drury*, nichts als eine magere Beſchreibung derſelben, und gar keine Naturgeſchichte findet. Daher der Preis dem eigentlichen Nutzen, wenn wir das Syſtem ausnehmen,

men, wenig entſpricht, da das Kramerſche Werk, wenn es mit dem vierten Theile geſchloſſen wird, 160 Thlr. koſtet.

Der Verfaſſer hat zuerſt die *Zigalen* (Cicada L.), hernach die *Wanzen* (Cimex L.) beſchrieben und abgebildet.

Bey den *erſten* hat er die Linnéiſche Eintheilung in *fünf Familien* beybehalten; ſolche aber mit der *ſechſten* (Fulgora) vermehret, welches hier die erſte iſt.

1) Fulgora *Laternaria* L. t. 1. f. 1.
2) *Cic. Foliacea:* Cigale feuillée à taches noires & blanches: eine *neue*. t. 1. f. 2.
3) *Foliac.* L'Orphelin rouge & noir. t. 1. f. 3. eine *neue*.
4) *Deflexa:* La Cigale Demoiſelle. t. 1. f. 4. eine *neue*.
5) *Deflexa:* Porte-miroir noir. t. 1. f. 5. eine *neue*.
6) Cicada *Querula*. t. 1. f. 6. (m. Beytr. Tom. II. p. 151. no. 17.)
7) *Fulgora* fuſca. t. 2. f. 7. (Beytr. II. p. 123. no. 3. Fulg. *tenebroſa* Fabric.)
8) *Cruciata:* La *Croix*. t. 2. f. 8. eine *neue*.
9) *Deflexa:* Cic. *Phalaenoïdes* L. no. 40. t. 2. f. 9.
10) *Ranatra:* Cic. *Rubra* L. no. 45. t. 2. f. 10.
11) *Mannifera:* Cic. *Haematodes* L. no. 14. t. 2. f. 11.

Wanzen.

Die Eintheilung nach der äuſserlichen Form, und nach dem eigenen Syſtem des Verfaſſers, etwas vom Linnéiſchen verſchieden: in *ſieben Familien*.

 1) *Erſte*

1) *Erste Familie:* glatter Brustschild; das Rückenschildchen so grofs, dafs es die Flügel und den Hinterleib bedeckt.

2) Brustschild glatt und breit; Rückenschildchen grofs und fast dreyeckig; bedeckt mit seinem spitzen Winkel den halben Hinterleib.

3) An den Schultern des Brustschildes ein spitzer Dorn; Rückenschildchen grofs und dreyeckig; die Ränder des Hinterleibs gezähnelt.

4) Brustschild dreyeckig, nach dem Kopfe zu spitz zu laufend; Rückenschildchen klein; bey den Weibchen mehrentheils die Hinterfüfse dicke, und an der Innenseite dornicht. Bey andern die Füfse häutig, wie Schwimmfüfse.

5) Brustschild und Körper sehr flach; die Flügel kürzer als der Körper. Einige, als die Bettwanzen, ganz flügellos.

6) Brustschild uneben, bucklicht und zweytheilicht. Der Kopf sehr hervorstehend, und mit dem Brustschilde durch einen Einschnitt vereiniget. Der Saugrüfsel kurz, und wie ein Halbzirkel gekrümmet; der Körper schmächtig; der Hinterleib klein. Die beyden Vorderfüfse dicker als die vier hintersten.

7) Brustschild glatt; der ganze Körper lang und schmächtig; die Füfse sehr lang. Hieher die länglichten Wasserwanzen.

Hierauf die *Wasserskorpione und Wasserwanzen.*

1) Karaktere der *ersten.*

Kleine mikroskopische fadenförmige Fühlhörner unter den Augen. Der Saugrüfsel unter dem Brustschilde zurückgebogen; die Flügeldecken mehrentheils hart, hornartig, am Ende häutig:

tig: rückwärts in der Queer gefaltet; bedecken Körper und Flügel; ein Rückenſchildchen; die Vorderfüſse zangenförmig, wie die Scheeren der Fangheuſchrecken (Mantis). Die Fuſsblätter zweygliedricht.

2) Karaktere der *zwoten*.

Die Fühlhörner kürzer als der Bruſtſchild; ein unterwärts zurückgebogener Saugrüſsel; ein Rückenſchildchen; harte, über einander liegende Flügeldecken, die den Körper und die Flügel bedecken; die Hinterfüſse zum Schwimmen; die Fuſsblätter zweygliedricht.

1) Punaiſe à écuſſon violet. t. 1. f. 1. *1ſte fam.* eine *neue.*

2) P. de Java. t. 1. f. 2. *2te fam.* eine *neue.*

3) P. épineuſe. t. 1. f. 3. *3te fam. neue.*

4) P. à bandes jaunes. t. 1. f. 4. *4te fam. neue.*

5) P. à deux points. t. 1. f. 5. *3te fam. neue.*

6) *Nepa* ruſtica Fabric. t. 1. f. I. (Beytr. II. p. 177. no. 2.)

7) *Nepa* cinerea L. no. 5. t. 1. f. II.

8) Pun. liſſe à avirons. t. 1. f. III. *neue.*

9) Cimex *criſtatus* Linn. n. 62. t. 1. f. 6. *6te fam.*

10) Cimex *nobilis* L. no. 3. t. 2. f. 7. *1te fam.*

11) P. rayée de Suriname. t. 2. f. 8. *1te fam. neue.*

12) Cim. *lineatus* L. no. 6. t. 2. f. 9. *1te fam.*

13) Cim. *incarnatus* Drury II. p. 67. t. 36. f. 5. t. 2. f. 10. *2te fam.*

14) Cim. *ornatus* L. no. 56. t. 2. f. 11. *2te fam.*

15) Cimex *punctatus* Degeer III. p. 335. no. 5. t. 34. f. 6.) t. 1. f. 12. *3te fam.*

16) P. à bandes orange. t. 2. f. 13. *4te fam. neue.*

17) P. à pattes membraneuſes. t. 2. f. 14. *4te fam. neue.*

18) Cim. *Stockerus* L. no. 2. t. 3. f. 15. *1te fam.*

 19) P.

19) P. bleue de Stocker. t. 3. f. 16. *1te fam. neue.*
20) P. verte de Stocker. t. 3. f. 17. *1te fam. neue.*
21) P. brune à point blanc. t. 3. f. 18. *2te fam. neue.*
22) Cim. *Lineola* L. no. 52. t. 3. f. 19. *4te fam.*
23) P. de Pharaon. t. 3. f. 20. *4te fam. neue.*
24) P. à écuſſon en fleurs. t. 4. f. 21. *1te fam. neue.*
25) P. à écuſſon bleu d'azur. t. 4. f. 22. *1te fam. neue.*
26) P. à écuſſon doré. t. 4. f. 23. *1te fam. neue.*

II. Heft.

I. *Zikaden.*

12) *Ranatra:* Cigale griſe. t. 3. f. 12. *neue.*
13) Mannifera Tettigon: Chanteuſe des Champs. t. 3. f. 13. (Seba IV. t. 85. f. 7. 8.) *neue.*
14) Cic. Mannif. *Septemdecim* L. no. 20. t. 3. f. 14.
15) C. Mannif. *Capenſis* L. no. 13. t. 3. f. 15.
16) Mannif. Cig. écailleuſe de Java. t. 4. f. 16. *neue.*
17) Mannif. Cig. bigarrée. t. 4. f. 17. *neue.*
18) Fulgora: Cig. verte. t. 4. f. 18. *neue.*

II. *Wanzen.*

27) Pun. verte de Stocker. t. 4. f. 24. *1te fam. neue.*
28) P. à bords en Damier. t. 4. f. 25. *2te fam. neue.*
29) P. à Y renverſé. t. 4. f. 26. *2te fam. neue.*
30) P. d'une couleur. t. 4. f. 27. *2te fam. neue.*
31) P. Sexagone t. 4. f. 28. *4te fam. neue.*
32) P. violette. t. 5. f. 29. *2te fam. neue.*
33) P. à arc jaune. t. 5. f. 30. *2te fam. neue.*
34) P. Arlequin. t. 5. f. 31. *2te fam. neue.*
35) P. de Potagers à *taches rouges.* t. 5. f. 32. *2te fam. neue.*
36) Cimex *oleraceus* L. no. 53. t. 5. f. 33. *2te fam. neue.*
37) P. à épaules cornues. t. 5. f. 34. *3te fam. neue.*

38) P.

38) P. à bordure rouge. t. 5. f. 35. *4te fam. neue.*
39) P. à abdomen quarré. t. 5. f. 36. *4te fam. neue.*
40) P. brune. t. 5. f. 37. *4te fam. neue.*
41) Cimex *personatus* L. no. 64. t. 5. f. 38. *6te fam.*
42) Cimex *aurantius Sulzeri* (Gesch. t. 10. f. 10.) t. 6. f. 39. *2te fam.*
43) Cimex *nigripes Sulzeri* (t. 10. f. 9.) t. 6. f. 40. *2te fam.*
44) Cimex *Janus* Fabric. (Beytr. II. p. 247. no. 20.) t. 6. f. 41. *2te fam.*
45) P. Couleur d'Ocre. t. 6. f. 42. *2te fam. neue.*
46) P. à Dos agathe. t. 6. f. 43. *2te fam. neue.*
47) Cimex *haemorrhoïdalis* L. no. 35. t. 6. f. 44. *3te fam.*
48) P. des Bois. t. 6. f. 45. *3te fam. neue.*
49) Cimex *Baccarum* L. no. 45. t. 6. f. 46. *3te fam.*
50) P. à tête pointue. t. 6. f. 47. *3te fam. neue.*
51) P. à écusson rouge. t. 7. f. 48. *1te fam. neue.*
52) P. à écusson à bandes. t. 7. f. 49. *1te fam. neue.*
53) P. à écusson avec des yeux. t. 7. f. 50. *1te fam. neue.*
54) P. à grosses pattes. t. 8. f. 51. *4te fam. neue.*
55) Nepa *grandis* L. no. 1. t. 7. f. IV.
56) Le Scorpion aquatique noir de Tranquebar. t. 7. f. V. *neuer.*
57) Nepa *Plano Sulzeri* (t. 10. f. 2.) t. 7. f. VI.

III. Heft.

I. *Zikaden.*

19) *Deflexa:* Cig. à ailes de Gaze. t. 4. f. 19. *neue.*
20) *Ranatra:* Cig. à quatre points. t. 4. f. 20. *neue.*
21) *Ranatra:* Cig. à Harnois jaune. t. 4. f. 21. *neue.*
22) Cicada *Cruciata aurita* L. no. 7. t. 4. f. 22.
23) *Fulgora* Diadema L. no. 2. t. 5. f. 22.
24) *Fulgora:* Cig. à tête obtuse. t. 5. f. 23. *neue.*

25) Cicada *foliata* L. no. 2. t. 5. f. 24.
26) *Ranatra:* Cig. au Colier rouge. t. 5. f. 25. *neue.*
27) Cicada *Ranatra* Sanguinolenta L. no. 22. t. 5. f. 27.
28) *Fulgora:* Cig. Porte-Lanterne ponctuée. t. 6. f. 28. *neue.*
29) Fulgora *Flammea* L. no. 7. t. 6. f. 29.
30) *Deflexa:* Cig. parée. t. 6. f. 30. *neue.*
43) Cicada *Foliàcea* fronditia L. no. 3. t. 6. f. 31.
44) *Cruciata:* Cig. Porte-Joug. t. 6. f. 32. *neue.*

II. *Wanzen.*

58) P. Hottentot (Femelle) t. 8. f. 52. *4te fam. neue.*
59) — — (Mâle) t. 8. f. 53
60) P. à pattes feuilletées. t. 8. f. 54. *4te fam. neue.*
61) P. à Luiſant d'or. t. 8. f. 55. *4te fam. neue.*
62) P. de Goyaves. t. 8. f. 56. *4te fam. neue.*
63) P. de la Jusquiame de Suriname. t. 8. f. 57. *4te fam. neue.*
64) P. à Reflet vert. t. 9. f. 57. *1te fam. neue.* An Fabricii *Irroratus* no. 15?
65) P. Jaune à Ecuſſon. t. 9. f. 58. *4te fam. neue.*
66) P. Porte-Lis. t. 9. f. 59. *1te fam. neue.*
67) P. à Ecuſſon couleur de Canele. t. 9. f. 60. *1te fam. neue.*
68) P. Samojede. t. 9. f. 61. *1te fam. neue.*
69) P. Griffon, de Suriname. t. 9. f. 62. *6te fam. neue.*
70) Cimex *Lacuſtris* L. no. 117. t. 9. f. 63. *7te fam.*
71) Grande P. à deux taches. t. 9. f. 64. *6te fam. neue.*
72) Cimex *Andreae* L.? no. 80. t. 9. f. 65. *6te fam.*
73) P. épineuſe à ventre rouge. t. 9. f. 66. *6te fam. neue.*
74) P. à antennes en maſſue. t. 10. f. 67. *4te fam. neue.*

75) P.

75) P. à pieds crochus. t. 10. f. 68. *4te fam.* **neue.**
76) P. à Dos rouge. t. 10. f. 69. *4te fam.* **neue.**
77) P. modeſte. t. 10. f. 70. *4te fam.* **neue.**
78) P. à raye blanche. t. 10. f. 71. *4te fam.* **neue.**
79) P. à bout d' Abdomen. t. 10. f. 72. *4te fam.* **neue.**
80) P. coureuſe aux Echaſſes. t. 10. f. 73. *4te fam.* **neue.**
81) P. bigarrée. t. 11. f. 74. *4te fam.* **neue.**
82) P. à quatre points. t. 11. f. 75. *4te fam.* **neue.**
83) P. à corcelet vert. t. 11. f. 76. *4te fam.* **neue.**
84) P. à collier blanc. t. 11. f. 77. *4te fam.* **neue.**
85) P. à antennes bigarrées. t. 11. f. 78. *4te fam.* **neue.** f. 79. *Mâle.*
86) La belle P. à bout d' ailes blanc. t. 11. f. 80. *4te fam.* **neue.**
87) Cim. *Hyoſcyami* L. no. 76. t. 11. f. 80. *. *4te fam.*
88) P. à taches de Sang. t. 11. f. 81. *4te fam.* **neue.**
88) P. jaune en Demi-Lune. t. 11. f. 82. *4te fam.* **neue.**
90) Cimex *2-puſtulatus* L. no. 29. t. 11. f. 83. *4te fam.*
91) Nepa *linearis* L. no. 7. t. 12. f. VII.

Wir erinnern hierbey noch, daſs die Bogen und Kupfertafeln der Zigalen und Wanzen in den Heften ſo unbequem unter einander durch gebunden ſind, daſs man ſich kaum heraus finden kann. Warum nicht lieber ein Heft von Zigalen, und eines von Wanzen?

* Von den Papillons d' Europe etc. beſitze ich den 4ten und 5ten Heft, bey welchem ſich der umgedruckte Bogen Ii des 3ten Heftes befindet, weil in dem erſten aus Verſehen falſche Verwechſelungen geſchehen waren. Alſo

auf

auf diesem, und im 4ten Heft *folgende Schmetterlinge:*

1) Pap. Pleb. Rur. *Betulae L.* no. 220. t. 35. no. 70.
2) — — — *Quercus* L. no. 222. t. 35. no. 71.
3) — — — *Pruni* L. no. 221. Varietates *Esperi* I. t. 39. Suppl. 15. f. 1. a. f. 1. b.) t. 35. no. 72.
4) Pap. Pleb. Rur. *Pruni* L. no. 221. t. 35. no. 73.
5) — — — *Quercus* L. no. 222. Varietas *Esperi* t. 39. Suppl. 15. f. 3.) t. 35. no. 74.
6) Pap. Pleb. Rur. Porte-queue brun à taches fauves. t. 35. no. 75. *Ein neuer.*

Im IVten Heft.

7) Pap. Pleb. Rur. *Boeticus* L. no. 226. t. 37. no. 76. Le *Porte-queue bleu strié.*
8) Pap. Pleb. Rur. *Echion* L. no. 224. t. 37. no. 77. Le *Porte-queue à double queue.*
9) Pap. Pleb. Rur. *Tiresias Esperi* t. 34. Suppl. 10. f. 1. foem. f. 2. Mas.) t. 37. no. 78.
10) Pap. Pleb. Rur. *Tiresias Esperi* Varietas t. 49. f. 2.) t. 37. no. 79. *Les petits porte-queue.*
11) Pap. Pleb. Rur. *Argus* L. no. 232. t. 38. no. 80. *Argus bleu.*
12) Pap. Pleb. Rur. *Meleager Esperi* t. 45. f. 2.) t. 38. no. 81. *Argus bleu découpé.*
13) Pap. Pl. Rur. *Bellargus Esperi* t. 32. f. 3.) t. 39. f. 82. *Argus bleu céleste.* a b c d e f. Varietates Maris et foeminae.
14) Pap. Pl. Rur. *Coridon Esperi* t. 33. f. 4.) t. 39. no. 83. *Argus bleu Nacré.*
15) Pap. Pl. Rur. *Hylas Esperi* t. 45. f. 3.) t. 40. no. 84. *Argus bleu pâle.*

16) Pap.

16) Pap. Pl. Rur. *Telephii Esperi* t. 41. f. 2.) t. 40. no. 85. *Argus bleu-violet.*

17) Pap. Pl. Rur. *Arion* L. no. 230. t. 40. no. 86. t. 41. no. 86. *Argus bleu à bandes brunes.*

18) Pap. Pl. Rur. *Biton Esperi* t. 33. f. 5.) t. 41. f. 87. *Argus bleu à bandes brunes, lignes blanches.*

19) Pap. Pl. Rur. *Argiolus* L. no. 234. t. 42. no. 88. *Le Demi-argus.*

20) Pap. Pl. Rur. *Phocas Esperi* t. 35. f. 1. 2.) t. 43. no. 89. *Argus Myope.*

21) Pap. Pl. Rur. *Rubi* L. no. 237. t. 43. no. 90. *Argus verd.*

22) Pap. Pl. Vrb. *Actorion* L. no. 262. t. 43. no. 91. *L' Argus bronzé.*

23) Pap. Pl. Rur. *Virgaureae* L. no. 253. et Foeminae *Hippothoë* no. 254. t. 44. no. 92. *Argus Satiné.*

24) Pap. Pl. Rur. *Roeselii* III. t. 37. f. 6. 7. *Esperi Hippothoë.* t. 22. f. 3.) t. 44. no. 93. *Argus Satiné à taches noires.*

25) Pap. Pl. Vrb. *Steropes Esperi* t. 41. f. 1.) t. 44. no. 94. *le Miroir.*

26) Pap. Pl. Vrb. *Comma* L. no. 256. t. 45. no. 95. La *Bande noire.*

27) Pap. Pl. Vrbic. *Paniscas Esperi* t. 28. f. 2.) t. 45. no. 96. *L' Echiquier.*

28) Pap. Pl. Vrbic. *Malvae* L. no. 267. t. 46. no. 97. *Le Plein-Chant.*

29) Pap. Pl. Vrbic. *Tages* L. no. 268. t. 46. no. 98. *Le Papillon Grisette.*

30) Pap. *Helicon.* *Apollo* L. no. 50. t. 47. no. 99. *L' Apollon.*

31) Pap. Helicon. *Mnemosyne* L. 51. t. 48. no. 100. *Le Semi-Apollon.*

32) Pap. Dan. Cand. *Crataegi* L. no. 72. t. 48. no. 101. *Le Gazé.*

Im

Im Vten Heft.

33) Pap. *Brassicae* Linn. no. 75. t. 49. no. 202. *Le grand Papillon du Chou.*

34) Pap. *Rapae* Linn. no. 76. t. 49. no. 203. *Le petit Pap. du Chou.*

35) Pap. *Napi* Linn. no. 77. t. 50. no. 204. *Le Papillon Blanc veiné de verd.*

36) Pap. *Sinapi* Linn. no. 79. t. 50. no. 205. *Le Papillon blanc de Lait.*

37) Pap. *Daplidice* Linn. no. 81. t. 50. no. 206. *Le Pap. blanc marbré de Verd.*

38) Pap. *Cardamines* Linn. no. 85. t. 51. no. 207. *L' Aurore.*

39) Pap. *Eupheno* Linn. no. 88. t. 52. no. 208. *L' Aurore de Provence.*

40) *La Diane.* t. 52. no. 209. (Der Wiener *Polixena.* v. *Esper* I. t. 15. f. 1. *Rumina.*)

41) Pap. *Rhamni* Linn. no. 206. Var. no. 205. *Cleopatra.* t. 53. no. 210. *Le Citron.*

42) Pap. *Hyale* Linn. no. 200. t. 54. no. 211. *Le Souci.*

43) Pap. *Palaeno* Linn. no. 99. t. 54. no. 212. *Le Soufre.*

44) Pap. *Morio* (*Antiopa* L.) Varietas t. 55. Suppl. I. no. 1. et 3.

45) *La Tortue moyenne.* t. 55. no. 3. bis. (Der Wiener *Xanthomelas* p. 175.)

46) Varietas Pap. *Gamma maris.* t. 55. Suite de no. 5. t. 5.

47) *Le V blanc.* t. 56. Suppl. II. no. 5. bis. (Der Wiener *Vau album* p. 176.)

48) *La Carte géographique rouge.* t. 56. no. 8. bis. (*Schaeff.* Ic. t. 132. f. 1. 2.)

49) Varietas *Foeminae.* t. 10. f. 11. c. t. 57. Suppl. 3.

50) Varieté du *petit Sylvain.* no. 13. t. 11. t. 57. Suite du no. 13. t. 11.

51) Va-

51) Varieté *mâle du Tabac d' Eſpagne.* no. 15. t. 12. t. 57. Suite du no. 15. t. 12.

52) *Le Cardinal.* t. 58. Suppl. IV. no. 15. bis. (Der Wiener *Pandora.*)

53) Varietates Papp. *Adippe* Linn. no. 212. et *Aglaja.* no. 211. t. 58. Suite du no. 16. t. 13.

54) Variet. du Pap. *le Chiffre.* t. 15. no. 19. t. 59. Suppl. V. (*Eſper* I. t. 18. f. 1.)

55) Pap. *L'Ino*, t. 59. no. 20. bis. *neuer.*

56) Pap. *L' Agave.* t. 59. no. 20. bis. *neuer.*

57) Var. Pap. *Dia* L. no. 207. *Maris.* t. 60. Suppl. VI. Suite du no. 21. t. 15.

58) *La Palés*, grande et petite eſpece, t. 60. no. 21. bis. et 21. tert. (*Eſper* Contin. t. 6. f. 4. 5. *Arſilache.*)

Unter dieſen allen drey bis vier neue; die übrigen alle theils ſehr bekannte, theils häufig abgebildete, oder blos Abänderungen. Wie vielmal muſs man alſo eine Sache bezahlen? Hätten die Verfaſſer nicht beſſer gethan, daſs ſie nur auf dieſe Abbildungen verwieſen hätten? Deſſen ohnerachtet konnten ſie das, was ſie für neu, und merkwürdig hielten, beybringen.

Von *Eſpers* Fortſetzung der europäiſchen Schmetterlinge, oder deſſen 3ten Theile, haben wir *den erſten und zweyten Heft.*

1) Pap. Equ. Ach. *Ajax* L. no. 32. t. 51. f. 1.

2) Pap. Pl. Vrbic. *Malvae.* t. 23. Varietas. t. 51. f. 2.

3) Pap. Pl. Vrbic. *Alceae.* t. 51. f. 3. ein *neuer.*

4) Pap. Pl. Rur. *Tiphys.* t. 51. f. 4. *neuer.*

5) Pap.

5) Pap. Nymph. Phaler. *Vau album.* t. 52. f. 1. ein *neuer.*
6) Pap. Pl. Rur. *Eumedon.* t. 52. f. 2. foem. 3. Mas. *neuer.*
7) Pap. N. Gemm. *Fidia.* t. 49. Varietas. t. 52. f. 4.
8) Pap. Pl. Rur. *Amphion.* t. 53. f. 1. *neuer.*
9) Pap. N. Phal. *Rumina* L. ad t. 15. Tom. I. t. 53. f. 2. aa. Larva. b. Chryſallis. c. Imago.
10) Pap. N. Gemm. *Pronoë.* t. 54. f. 1. *neuer.*
11) Pap. N. Gemm. *Alexis.* t. 44. Varietas. t. 54. f. 2.
12) Pap. N. Gemm. *Philoxenus.* t. 54. f. 3. *neuer.*
13) Pap. Pl. Rur. *Cleobis.* t. 40. Varietas. t. 54. f. 4. a b.
14) Pap. Pl. Rur. *Hylas.* t. 45. Foemina. t. 55. f. 1.
15) Pap. Pl. Rur. *Bellargi* foeminae Varietates. t. 55. f. 2. 3. 4. f. 6. Mas. ad t. 32. Tom. I.
16) Pap. Pl. Rur. *Icari.* t. 32. Variet. t. 55. f. 5.
17) Pap. Pl. Rur. *Medon.* t. 32. Variet. t. 55. f. 7.
18) Pap. Dan. Cand. *Phicomone.* t. 56. f. 1. Mas. f. 2. Foem. *neuer.*
19) Pap. Pl. Vrbic. *Telegonus.* t. 56. f. 3. *neuer.*
20) Pap. N. Phal. *Arſilache.* t. 56. f. 4. *neuer.* f. 5. Varietas.
21) Pap. N. Gemm. *Actaea.* t. 57. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem. *neuer.*
22) Pap. Dan. Feſt. *Hyperanthi.* t. 5. f. 1. Tom. I. Varietates. t. 57. f. 2. 3. 4.
23) Pap. N. Phaler. *Pandora.* t. 58. f. 1. Mas. f. 2. Foemina. *neuer.*
24) Pap. N. Phaler. *Niphe* L. no. 208. t. 58. f. 3.
25) Pap. Pl. Rur. *Amphidamas.* t. 58. f. 4. *neuer.*
26) Pap. Helic. *Mnemoſyne* L. no. 51. t. 2. f. 2. Foemina. t. 58. f. 5.
27) Pap. N. Phal. *Camilla.* t. 59. f. 1.
28) Pap. Pl. Rur. *Arion.* t. 20. Varietas. t. 59. f. 2.

29) Pap. N. Phal. *C album.* t. 13. Variet. t. 59. f. 3.
30) Pap. N. Phal. *Prorsa.* t. 15. Variet. t. 59. f. 4.
31) Pap. N. Phal. *Levana.* t. 15. Variet. t. 59. f. 5.
32) Pap. N. Phal. *Trivia.* t. 37. Tom. I. foem. t. 60. f. 1.
33) Pap. N. Phal. *Aglaja.* foem. t. 60. f. 2.
34) Pap. N. Phal. *Adippe* Varietas. t. 60. f. 3.
35) Pap. N. Phal. *Paphia.* t. 17. Variet. t. 60. f. 4.
36) Pap. Pl. Rur. *Phlaeas.* t. 22. Variet. t. 60. f. 5.
37) Pap. N. Phal. *Didymae.* t. 41. Variet. t. 61. f. 1.
38) Pap. N. Phal. *Diae.* t. 16. Variet. t. 61. f. 2.
39) Pap. N. Phal. *Maturna.* t. 16. foem. t. 61. f. 3.
40) Pap. N. Phal. *Corythallia.* t. 61. f. 4. foem. f. 5. Mas. **neuer.**
41) Pap. N. Phal. *Athaliae.* t. 47. Variet. t. 61. f. 6.
42) Pap. Pl. Rur. *Meleager.* t. 45. f. 2. foem. t. 62. f. 1. Mas.
43) Pap. Pl. Rur. *Hipponoë.* t. 25. f. 5. foem. t. 62. f. 2. Mas.
44) Pap. N. Phal. *L album.* t. 62. f. 3. a. maris Varietas. b. foem.
45) Pap. Pl. Rur. *Biton.* t. 33. f. 5. Mas. t. 62. f. 4. Foem.
46) Pap. Pl. Rur. *Phlaeas.* t. 21. f. 1. Mas. t. 62. f. 5.

Aus *Espers* 2tem Bande sind noch einige *Schwärmerarten* nachzuholen.

1) *Sphinx* Indiae Orient. Vulgo Var. Sph. *Celerio* L. no. 12. t. 22. f. 1.
2) Sph. *Populi* Var. t. 22. f. 2.
3) Sph. *Tiliae* Var. t. 22. f. 3.
4) Sph. *Vespertilio* t. 22. f. 4. (*Füessl.* Archiv der Entomol. t. 11. A.)
5) Sph. *Fenestrina.* t. 23. f. 1. et f. 1. *. (S. Beytr. III B. 2 Th. p. 209. no. 23.)

6) Sph. *Bombyliformis*. t. 23. f. 2.
7) Sph. *Oestriformis*. t. 23. f. 3.
8) Sph. Adsc. *Lonicerae*. t. 24. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem.
9) Sph. A. *Pilosellae*. t. 24. f. 2. a. Mas. f. 1. b. Foem.
10) Sph. A. *Scabiosae*. t. 24. f. 3. a. Mas. f. 3. b. Foem.
11) Sph. A. *Achilleae*. t. 25. f. 1. a. Mas. f. 1. b. Foem. *neuer*.
12) Sph. A. *Peucedani*. t. 25. f. 2. *neuer*.
13) Sph. *Lonicerae*. Var. t. 25. f. 3.

* * *

Aus *Cramers* Pap. exot. Tom. III. und Tom. IV. Heft 25 bis 28 haben wir beyzubringen.

I) Zu den *trojanischen Rittern*.

A) *Linnéische*.

1) *Aeneas Cram*. III. t. 279. AB. *Mas*; CD. *Foem*.
2) *Polytes* — — t. 265. AB. *Foem*. C. *Mas*.
3) *Anchises* — IV. t. 318. AB *Mas*. CD. *Foem*.

B) *Neue*.

1) *Amosis Cram*. III. t. 269. AB.
2) *Panthonus* — t. 278. CD.
3) *Severus* — t. 277. AB. *Mas*. t. 278. AB. *Foem*.
4) *Tullus* — t. 277. CD.

II) Zu *den Griechen oder Achivern*.

A) *Linnéische*.

1) *Jason* no. 26. *Cram*. IV. t. 329. AB.

B) *Neue*.

1) *Aeilus* — — IV. t. 317. AB.
2) *Aristeus* — — — t. 318. EF.
3) *Sinon* — — — t. 317. CD. *Mas*. (S. m. *Beytr*.

m. *Beytr.* III B. 1 Th. p. 72. no. 7.) EF. *Foem.*

4) *Pherecides* no. 26. *Cram.* IV. t. 330. AB.

III) Zu den *Helikoniern.*

A) *Linnéische.*

1) *Piera* L. *Cram.* IV. t. 291. CD. *Foem.* E. *Mas.* Pap. *Vitré.*
2) *Terpsicore* — t. 298. AB. *Foem.* C. *Mas.*
3) *Cephea* — t. 298. DE.
4) *Horta* — t. 298. FG.

B) *Neue.*

1) *Eumella* — III. t. 280. D.
2) *Euritea* — t. 280. C.
3) *Liberia* — t. 268. GH.
4) *Andremona* — IV. t. 297. A.
5) *Vdalrica* — t. 297. B.
6) *Numata* — t. 297. CD.
7) *Ludovica* — t. 297. E.
8) *Equicola* — t. 297. F.
9) *Pireta* — t. 315. A. cf. *Piera* L.
10) *Diaphana* — t. 315. DE. *Foem.* t. 231. C. *Mas.*
11) *Selene* — t. 315. F. *Foem.* G. *Mas.*
12) *Pasinuntia* — t. 316. A. *Mas.* BC. *Foem.*
13) *Pamela* — t. 319. A.

IV) Zu den *Danaïden.*

A) Zu den *Weißen.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Delia.* *Cram.* III. t. 273. A.
2) *Mesentina* — t. 270. AB.

 3) *Au-*

3) *Aurora Cram.* IV. t. 299. AB. *Mas.* CD *Foem.*
4) *Zelmira* — t. 320. CD. *Foem.* EF. *Mas.*

B) Zu den *Bunten.*
I) *Linnéische.*
1) *Midamus Cram.* III. t. 266. AB.
2) *Cassius* — IV. t. 314. CD.
II) *Neue.*
1) *Basilissa* — III. t. 266. C. (S. *Kleem.* Beytr. I. t. 9. f. 1. 2.)
2) *Dyndima* — t. 271. GH.
3) *Eleusina* — t. 266. D.
4) *Epitus* — t. 270. C.
5) *Odilia* — IV. t. 329. CD.
6) *Basilia* — — EF.

V) Zu den *Nymphen.*
A) *Aeugigte.*
I) *Linnéische.*
1) *Orithya Cram.* IV. t. 290. AB. *Mas.* CD. *Foem.*
2) *Lena* — t. 291. AB. *Mas.* t. 198. DF. *Foem.*
3) *Leda* — t. 292. A. *Mas.* Vol. III. t. 126. CD. *Foem.*
II) *Neue.*
1) *Anna* — III. t. 281. AB.
2) *Egista* — — CD.
3) *Judiana* — t. 280. AB.
4) *Orithya* — t. 281. EF.
5) *Sabina* — IV. t. 289. AB. *Foem.* CD. *Mas.*
6) *Mermeria* — t. 289. EF.
7) *Genoveva* — t. 290. EF.

8) *My-*

8) *Mycena Cram.* IV. t. 290. F.
9) *Phedima* — t. 292. B.
10) *Arcensia* — t. 292. C.
11) *Junia* — — DE.
12) *Ebusa* — — FG.
13) *Chloris* — t. 293. AB.
14) *Myncea* — t. 293. C.
15) *Clarissa* — t. 293 DE.
16) *Camerta* — — F.
17) *Lisandra* — — GH.
18) *Arcesilaus* — — AB. *Foem.* CD. *Mas.* (v. *Fabric.* S. E. p. 484. no. 182. Pap. N. Phal. *Chorinaeus.*)
19) *Sophonisba* — t. 295. AB.
20) *Quiteria* — t. 313. AB. *Foem.* CD. *Mas.*
21) *Arete* — t. 313. EF.
22) *Otrea* — t. 314. AB.
23) *Meone* — t. 314. EF. cf. *Linn.* *Megaera* no. 142.
24) *Agnes* — t. 324. AB.
25) *Renata* — t. 326. A.
26) *Rosina* — — B.
27) *Justina* — — C.
28) *Mamerta* — — D.
29) *Francisca* — — EF.

B) Zu den *ohnäugigten geschmückten.*

I) *Linnéische.*
1) *Panope Cram.* IV. t. 294. EF.
2) *Nauplia* — t. 316. DE. *Foem.* FG. *Mas.*
3) *Polychloros* — t. 330. CD.

II) *Neue.*
1) *Ismare* — III. t. 279. EF.

 2) *Co-*

2) *Columella Cram.* III. t. 296. AB.
3) *Coenobita* — — t. 296. CD. (*Pallas* Reise Ausz. Anh. no. 62. Pap. Helic. *Sappho.*)
4) *Leucothoë* — t. 296. EF.
5) *Zingha* — IV. t. 315. BC.
6) *Antonoë* *) — t. 320. AB. *Mas.* t. 279. CD. *Foem.*
7) *Veronica* — t. 325. CD.
8) *Agatha* — t. 327. AB.
9) *Valentina* — — CD.
10) *Blandina* — — EF.
11) *Sulpitia* — t. 328. AB.
12) *Irenea* — — CD.
13) *Lucina* — t. 330. EF.

VI) Zu dem *Pöbel.*

A) *Bauern.*

I) *Linnéische.*

1) *Marsyas Cram.* IV. t. 332. AB.

II) *Neue.*

1) *Fatima* — III. t. 271. ABCD.
2) *Flegyas* — t. 280. EF.
3) *Iolaus* — t. 270. FG.
4) *Ladon* — t. 270. DE.
5) *Larydas* — t. 282. H.
6) *Mandana* — t. 271. EF.

7) *Mi-*

*) Nicht *Eucharis*, auch nicht *Hyparete* Linn. wie ich in meinen Beyträgen angegeben habe.

Ich danke hier dem würdigen Herausgeber aufrichtigst für die Verbesserung aller Fehler, denen ich in den entomol. Beytr. besonders in Absicht der ausländischen Schmetterlinge nicht wohl entgehen konnte, und wobey ich mich immer auf die Aussprüche anderer verlassen musste. Männer, die mit solchem Glimpf anderer Fehler verbessern, sehe ich als Lehrer und Wohlthäter an.

7) *Micylus Cram.* III. t. 282. FG.
8) *Orestes* — t. 282. AB.
9) *Palegon* — t. 284. F.
10) *Silenus* — — E.
11) *Venulius* — t. 286. G.
12) *Nedymona* — IV. t. 299. EF.
13) *Eumolphus* — t. 299. GH.
14) *Camillus* — t. 300. AB.
15) *Ebusus* — — CD.
16) *Beon* — t. 319. BC.
17) *Lajus* — — DE.
18) *Triopus* — t. 320. GH.
19) *Atymnus* — t. 331. DE.
20) *Evander* — t. 331. FG.
21) *Caranus* — t. 332. CD.
22) *Orus* — — EF.
23) *Bubastus* — — GH.
24) *Arogeus* — t. 333. AB.
25) *Phalantus* — — CD.
26) *Megacles* — — EF.
27) *Crolus* — — GH.
28) *Thasus* — — I.
29) *Syncellus* — t. 334. AB.
30) *Menander* — — CD.
31) *Thersander* — t. 335. AB.
32) *Ouranus* — — C.
33) *Epaphus* — — DE.
34) *Lamis* — — FG.
35) *Melander* — t. 336. A. *Foem.* B. *Mas.*
36) *Gelanor* — — CD.
37) *Crotopus* — — EF.
38) *Labdacus* — — GH.

B) *Städter.*

I) *Linnéische.*

1) *Peleus Cram.* III. t. 284. F.

II) *Neue.*

1) *Astylos Cram.* III. t. 283. AB.
2) *Aulestis* — — EFG.
3) *Chromus* — t. 284. E.
4) *Eroteas* — t. 288. CD.
5) *Creteus* — t. 284. CD.
6) *Ladon* — t. 280. G.
7) *Melander* — t. 270. H.
8) *Fantasos* — IV. t. 300. EF.
9) *Crinisus* — — GH.
10) *Adrastus* — t. 319. FG.
11) *Flyas* — t. 328. E.
12) *Otreus* — — F.
13) *Asychis* — t. 333. EF.
14) *Tryxus* — — GH.
15) *Orcus* — — IK.

VII) Zu den *Schwärmern.*

A) *Rechtmäßige.*

I) *Linnéische.*

1) *Vitis Cram.* III. t. 267. C. *Mas.* t. 268. E. *Foem.*

II) *Neue.*

1) *Achemenides* — III. t. 267. AB.
2) *Eacus* — t. 285. E.
3) *Faro* — — C.
4) *Hippotes* — t. 286. A.
5) *Hypothous* — t. 285. D.
6) *Menephron* — t. 285. A.
7) *Opheltes* — t. 285. B.
8) *Pyracmon* — t. 287. B.
9) *Rustica* — IV. t. 301. A. (Beytr. III B. 2 Th. p. 206. no. 10.)
10) *Lucetius* — IV. t. 301. B.
11) *Oenotrus* — — C.

12) *Scyron*

12) *Styron* *Cram.* IV. t. 301. E.
13) *Neoptolemus* — — F.
14) *Alope* — — G.
15) *Pandion* — t. 321. A.

B) *Angenommene.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Heber* *Cram.* III. t. 287. A.
2) *Melanthus* — t. 286. B.
3) *Coras* — IV. t. 312. A.
4) *Meones* — t. 325. E.
5) *Nycteus* — — F.

VIII) Zu den *Attakerphalänen.*

A) *Linnéische.*

1) *Capensis* *Cram.* IV. t. 325. G. *Foem.* t. 302. A. *Mas.*

B) *Neue.*

1) *Aglaura* *Cram.* III. t. 263. F.
2) *Cyane* — t. 267. D.
3) *Lactucina* — t. 273. BC.
4) *Mirabilis* — t. 271. B.
5) *Modestia* — t. 272. CD.
6) *Zerbina* — t. 287. E.
7) *Capensis* — IV. t. 302. AB.
(Von *Paphia* L. no. 4. verschieden.)
8) *Honesta* — IV. t. 302. C.
9) *Nausica* — t. 303. BC. *Mas.*
10) *Io* — — DE. *Foem.* FG. *Mas.*
11) *Calchas* — t. 303. A.
12) *Metea* — t. 304. A.
13) *Domina* — — B.
14) *Obsoleta* — — C.
15) *Canitia* — — D.

16) *Peregrina Cram.* IV. t. 305. A.
17) *Rustica* — — B.
18) *Avia* — t. 307. A.
19) *Alcinoë* — t. 322. AB.

IX) Zu den *Spinnern.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Nivea* IV. t. 321. B.
2) *Brotea* — t. 322. E.
3) *Bitia* — — F.

X) Zu den *Eulen.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Servia* Cram. IV. t. 321. CDE.
2) *Sergilia* — — F.
3) *Hypermnestra* — t. 323. AB.
4) *Melicerte* Var. — — CDE. cf. t. 62. CD.
5) *Mezentia* — — F.
6) *Euristea* — t. 324. A.
7) *Damonia* — — BCDE.
8) *Oculata* — — F.
9) *Ancea* — — G.

XI) Zu den *Spannern.*

I) *Linnéische.*

II) *Neue.*

1) *Panthona* Cram. IV. t. 322. C.
2) *Glaucopis* — — D.

In dem 1sten Probeheft von *Füeßly* Archiv der Insektengeschichte ist:

1) Beytrag zur Naturgesch. des *Mittelperlmutterfalters* Pap. *Adippe* L. Tab. I. von *Füeßl.*

2) Der

2) Der *Fledermausschwärmer:* Sph. *Vespertilio* von *Füeßly*. Tab. II. A.

3) *Die schwarze Todtenkopfraupe* (Sph. *Atropos*) Tab. III. von *Hübner* in Halle, mit Zusätzen von *Füeßly*.

4) Der *Köchlinsschwärmer*, Sph. *Koechlini*, von *Füeßly*. Tab. IV. A.
Viel ähnliches mit Sph. *Galii*. Derselbe beym *Esper* II. t. 8. f. 4. Varietas Sph. *Celerio*.

5) Der *Trauerschwärmer*, Sph. *Infausta* L. no. 43. von *Füeßly* Tab. II. B.

6) Die *Perspektivfliege: Diopsis*, Tab. V. f. 1-5.

7) Naturgeschichte des *Silbermönchs:* Phal. *argenta* von *Herbst*, Tab. VI.
S. die Rezension dieses Instituts im I St. des *Leipziger Magazins* zur Naturkunde &c. p. 138.

Ich komme nun zu einem Insektenwerke, das der Herr Hofmeister bey dem Braunschweigischen Karolino, *Knoch*, angefangen, und dessen 1ten Heft unter dem Titel: Beyträge zur Insektengeschichte, 8. Leipzig 1781. geliefert hat. Es sind dabey sechs illuminirte Kupfertafeln; aber so fein, getreu, und vortrefflich, daſs ich sie den *Röselschen* und *Seppischen* Zeichnungen an die Seite zu setzen kein Bedenken trage. Einige sehr seltene Insekten, besonders Phalänen, sind nicht nur *sehr genau* beschrieben; sondern der würdige Herr Verfasser hat auch die Oekonomie und Naturgeschichte derselben so weit als möglich verfolget, und daher verschiedene Merkwürdigkeiten, aus eigener Beobachtung und Erfahrung

bekannt

bekannt gemacht, die man in manchem grossen und kostbaren Insektenwerke vergeblich sucht. Ob ich gleich diese Beyträge schon bey diesem dritten Bande des dritten Theils genutzt habe; so will ich doch den Inhalt kurz hersetzen, weil sie noch nicht in vielen Händen sind, und recht vorzüglich verdienen, bekannter zu werden.

1) Phal. Geom. *Sesquistriatarta*, der *grüne Spannmesser mit anderthalb weißen Streifen.* Tab. I. f. 1. *Hufnagels Vernaria.*
2) Ph. Noct. C *aureum*, das goldene C. Tab. I. f. 2. Der *Wiener* N. *Bractea.* p. 314.
3) Ph. Geom. *Melanaria* L. no. 212. Tab. I. f. 3. der *Schwärzling.*
4) Ph. Geom. *Punctaria* L. no. 200. der *Punktstrich.* Tab. I. f. 4.
5) Ph. Geom. *Innotata*, die *Beyfussmotte.* Tab. I. f. 8. *Hufnagels Innotata.*
6) Phal. *Bombyx Everia*, der *Wollträger.* Tab. II. f. 6. Mas. f. 7. Foem. *neu.*
7) Ph. Geom. *Albicillata* L. no. 255. der *weisse Schleier.* Tab. II. f. 8. *Raupe.*
8) Ph. Noct. *argentea*, der *silberfleckichte Mönch.* Tab. III. f. 2. *Berlin. Mag.* I B. 6 St. p. 648. Tab. Tit. *Archiv* der Entomol. t. 6.
9) Ph. Bomb. *Vidua*, die *junge Wittwe.* Tab. III. f. 3. *neu.*
10) Ph. Geom. *Lichenaria*, die *Moosmotte.* Tab. III. f. 9. Foem. *Hufnagels Lichenaria.*
11) Ph. Geom. *Pectinataria*, das *gekämmte Fühlhorn.* Tab. III. f. 10. *neu.*
12) Ph. Noct. *Dissimilis*, das *unähnliche Weibchen.* Tab. IV. f. 3. Foem. f. 4. Mas. *neu.*

13) Ph.

13) Ph. Noct. *Domiduca*, die *Sturmhaube*. Tab. IV. f. 5. *Husnagels Domiduca*, der Wiener N. *Ianthina*.

14) Ph. Bomb. *Velitaris*, die *Segelmotte*. Tab. IV. f. 8. *Hufnagels* Velitaris.

15) Phal. Tin. *Perlella*, die *Perlmotte*. Tab. IV. f. 6. *Scop*. Perlella p. 243. no. 620.

16) Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*. Linn. no. 358. Tab. IV. f. 7.

17) Pap. Pleb. Vrbicola *Silvius*, der *Silvius*. Tab. V. f. 1. 2. *neu*.

18) Pap. Nymph. Phal. *Arsilache*, die *Arsilache*. Tab. V. f. 3. 4. *Espers* Arsilache I. t. 56. f. 5.

19) Pap. Pl. Rur. *Optilete*, das *Gelbauge*. Tab. V. f. 5. 6. *neu*.

20) Curculio *Albinus* L. no. 79. die *Weifsstirn*. Tab. VI. f. 1-7.

21) Curculio *Nebulosus* L. no. 84. die *Wolkendecke*. Tab. VI. f. 8-11.

Pallas hat abermal ein neues Insektenwerk angefangen, das sein Name schon empfiehlt, und dem Gründlichkeit und Genauigkeit den Werth geben. Der Titel ist:

Icones Insectorum, praesertim Rossiae Sibiriaeque peculiarium, quae collegit et descriptionibus illustravit —

Fasc. I. mit 3 illuminirten Kupfertafeln.

Es werden in allem 4 Hefte mit 13 Platten werden, und jede Ausgabe kostet 2 Rthl.

In dem *ersten Hefte:*

1) *Lucanus* apterus t. A. f. 1. a b c. (S. m. Beyträge I. p. 116.)

2) Scar. *Moeris* t. A. f. 2. *neu*.

3) Scar.

3) Scar. *Mopſus.* t. A. f. 3. (differt a *Voet.* t. 26. f. 28. et *Schaeff.* Ic. t. 3. f. 7.)
4) Scar. *Menalcas.* t. A. f. 4. a b. (Beytr. I. p. 70.)
5) Scar. *Bonaſus.* t. A. f. 5. (Beytr. I. p. 69.)
6) Scar. *Gibbulus.* t. A. f. 6. (*Geoffr.* I. p. 90. no. 5.)
7) Scar. *Scriptus.* t. A. f. 7. (Beytr. I. p. 100.)
8) Scar. *Ammon.* t. A. f. 8. AB. (Beytr. I. p. 116.)
9) Scar. *Tenebrioïdes.* t. A f. 9. *neu.*
10) Scar. *Pectinatus.* t. A. f. 10. (*Fabric.* Ent. App. p. 818. *Trox* horridus.)
11) Scar. *Morticinii.* t. A. f. 11.
12) Scar. *Coccinelloïdes.* t. A. f. 12. (Scar. *bimaculatus* Laxm. S. Beytr.)
13) Scar. *bimucronatus.* t. A. f. 13. *neu.*
14) Scar. *oxypterus.* t. A. f. 14. a b. (Beytr. I. p. 114. no. 230. p. 96. no. 125. p. 106. no. 181.)
15) Scar. *Alopecias.* t. A. f. 15 a. b. (Linn. Scar. *Syriacus:* Muſ. reg. p. 24. S. N. ed. 12. no. 56.)
16) Scar. *Arctos.* t. A. f. 16. *neu.*
17) Scar. *Bombyliformis.* t. A. f. 17. *neu.*
18) Scar. *Albellus.* t. A. f. 18. (Beytr. I. p. 114. no. 231. p. 111. no. 214.)
19) Scar. *Succinctus.* t. A. f. 19. *neu.*
20) Scar. *Aureolus.* t. A. f. 20. *neu.*
21) Scar. *Hololeucus.* t. B. f. A. 21. (Beytr. I. p. 114 no. 233.)
22) Scar. *Teſtaceus.* t. B. f. A. 22 *neu.*
23) Scar. *Hemiſphaericus.* t. B. f. A. 23. *neu.*
24) Scar. *Cruentus.* t. B. fig. A. 24. *neu.*
25) Curculio *Varicoſus.* t. B. f. 1. *neu.*
26) Curc. *Rynchoceros.* t. B fig 2. *neu.*
27) Curc. *Piceus.* t. B. fig. 3. (Beytr. I. p. 384. n. 67.)
28) Curc. *Anomalocrps.* t. B. fig 4. (An Linn. Curc. *diſparis:* Muſ. reg. p. 50. Varietas?)
29) Curc. *Inderienſis.* t. B. fig. 5. (Beytr. I. p. 402. no. 35. p. 399. no. 14.)

30) Curc.

30) Curc. *Nomas*. t. B. fig. 6. (Beytr. I. p. 384. no. 66.)
31) Curc. *Candidatus*. t. B. fig. 7. Beytr. I. p. 402. no. 33.)
32) Curc. *Roridus*. t. B. fig. 8. *neu*.
33) Curc. *Cenchrus*. t. B. fig. 9. *neu*.
34) Curc. *Tetragrammus*. t. B. fig. 10. (*Lepech*. Reiſ. II. App. p. 329. t. 11. fig. 28.)
35) Curc. *Tribuloïdes*. t. B. fig. 11. *neu*.
36) Curc. *Nigrivittis*. t. B. fig. 12. *neu*.
37) Curc. *Vibex*. t. B. fig. 13. *neu*.
38) Curc. *Gibber*. t. B. fig. 14. *neu*.
39) Curc. *Carioſus*. t. H. fig. B. 15. *neu*.
40) Curc. *Feneſtratus*. t. H. fig. B. 16. *neu*.
41) Curc. *Flaviceps*. t. B. fig. 17. (*Lepech*. Reiſ. II. App. p. 327. t. 2. fig. 27.)
42) Curc. *Pictus*. t. H. fig. B. 18. (*Pall*. Reiſ. I. App. p. 463. no. 33.)
43) Curc. *Hololeucus*. t. H. fig. B. 19. *neu*.
44) Curc. *Tenebrioïdes*. t. B. fig. 20. (*Friſch* XIII. p. 28. t. 26. *Schaeff*. Ic. t. 62. fig. 11.)
45) Curc. *Albator*. t. B. fig. 21. *neu*.
46) *Mylaris gigantea*. t. C. fig. 1. (*Linn*. Tenebr. *Gigas*. S. N. ed. 12. p. 674. no. 1.)
47) Myl. *Gibboſa*. t. C. fig. 2. *neu*.
48) Myl. *ſpecioſa*. t. C. fig. 3. (Cf. *Schäff*. Ic. t. 51. fig. 3.)
49) Myl. *Violacea*. t. C. fig. 4. *neu*.
50) *Tenebrio auritus*. t. C. fig. 5. a b. *neu*.
51) Ten. *Pterygodes*. t. C. fig. 6. (*Fabr*. Ent. p. 252. no. 9. *Pimelia* reflexa. *Forsk*. Anim. p. 79. no. 9. Tenebr. *vulgaris*. S. Beytr.)
52) Ten. *Setoſus*. t. C. fig. 7. *neu*.
53) Ten. *Nomas*. t. C. fig. 8. (Beytr. I. p. 689. n. 15.)
54) Ten. *Longicornis*. t. C. fig. 9. (An *Pimelia* anguſtata *Fabr*. Ent. p. 253. no. 13?)

55) Ten.

55) Ten. *Hypolithus*. t. C. fig. 10. (*Geoffr*. I. p. 351. no. 8. An Linn. *Latipes* S. N. ed. 12. p. 678. no. 30?)
56) Ten. *Glandiformis*. t. C. fig. 11. a b. (Beytr. I. p. 688. no. 6.)
57) Ten. *Gibbus*. t. C. fig. 12. *neu*.
58) Ten. *Caspicus*. t. C. fig. 13. *neu*.
59) Ten. *Muricatus*. t. C. fig. 14. (Beytr. I. p. 674. no. 17.)
60) Ten. *Cephalotes*. t. C. fig. 15. (Beytr. I. p. 674. no. 16.)
61) Ten. *Subglobosus*. t. C. fig. 16. (Beytr. I. p. 677. no. 28. p. 688. no. 10.)
62) Ten. *Torulosus*. t. C. fig. 17. *neu*.
63) Ten. *Costatus*. t. C. fig. 18. *neu*.
64) Ten. *Pubescens*. t. C. fig. 19. (An Linn. Ten. angulatus S. N. ed. 12. p. 677. no. 22?)
65) Ten. *Leucographus*. t. C. fig. 20. (Beytr. I. p. 684. no. 4.)
66) Ten. *Spinimanus*. t. C. fig. 23. (An Linn. Ten. gigas no. 14?)
67) Ten. *asperrimus*. t. H. fig. C. 22. *neu*.
68) Ten. *Laticollis*. t. H. fig. C. 21. *neu*.

Wir danken übrigens diesem unserm Lehrer ebenfalls öffentlich für alle Berichtigungen unserer Beyträge, und freuen uns, daſs wir dadurch solchen Kennern Anlaſs gegeben haben, viele Verwirrungen zu heben, die wir aufzulösen nicht im Stande waren.

* * *

In des Franc. de Paula *Schrank* Enumeratio Insectorum, Austriae Indigenorum c. figur. 8. Aug. Vindel. 1781. liefert der Verfaſser 1127 Insekten-

Insektenarten nach einer systematischen Beschreibung, mit beygefügtem Maaſs der Gröſse, auch Anzeige der Oerter, wo er sie in Oesterreich gefunden. Die Schmetterlinge hat er übergangen, weil wir die Beschreibung derselben von *Schiffermüller* zu erwarten haben. Sein Werk zeuget von vielem Fleiſs und Genauigkeit eines sehr erfahrnen Forschers der Natur. S. Leipziger Magazin zur Naturkunde von Funk, Leske und Hindenburg, I St. p. 130.

Wir fügen diesem bey

Ioh. Chr. *Fabricii* Species Insectorum exhibentes eorum differentias specificas, Synonyma Auctorum, loca natalia, metamorphosin, adiectis observationibus, descriptionibus, Tom. I. 8. Hamb. et Kilonii.

In diesem Werke sind die in den verschiedenen Schriften des Verfassers zerstreuten neuentdeckten Insekten zusammengetragen, und viele Gattungen fast um die Hälfte mit neuen Arten vermehrt: auch verschiedene im System eingeschlichene Fehler verbessert. Das übrige s. im Leipz. Magaz. I St. S. 126 ff.

Ferner gehöret hieher

Iohann Nepomuk von *Laicharting* zu Eichberg und Lüzelgnad, tyrolischen Landmanns, Verzeichniſs und Beschreibung der *Tyroler Insekten* I Theil, käferartige Insekten, I Band, Zürich, bey Füeſsly 1781. 8.

Der Verfasser macht *zehn Ordnungen* von Insekten.

1) *Scaraboïdes*, käferartige.

2) *Grylloïdes*, grillenartige.

3) *Cimicoïdes*, wanzenartige.
4) *Papilionoïdes*, ſchmetterlingartige.
5) *Libelloïdes*, waſſerjungfernartige.
6) *Veſpoïdes*, weſpenartige.
7) *Muſcoïdes*, fliegenartige.
8) *Cancroïdes*, krebsartige.
9) *Aranoïdes*, ſpinnenartige.
10) *Oniſcoïdes*, aſſelartige.

Jeder ſind die Geſchlechtskennzeichen beygefügt, und jeder groſsen Ordnung wird ein Theil gewidmet ſeyn, der nach den Umſtänden wieder mehrere Bände begreifen wird.

In dieſes Iten Theiles Item Bande iſt die erſte Ordnung der Tyroler *käferartigen* Inſekten beſchrieben. Es kommen hier folgende *Geſchlechter* vor:

I. *Lucanus*, *Schrotkäfer*.

Dabey vier *Linnéiſche* Arten: Cervus; Parallelepipedus; Caraboïdes; Cylindricus.

Bey dem *erſten* macht der Verf. eine artige Erfahrung bekannt, welche die *Röſelſche* Meynung, daſs die mit kurzen Kinnladen die *Weibchen* der mit langen Oberkinnladen ſind, begünſtiget. Er hat von jenen 2, und von dieſen 3 in eine Schachtel eingeſperrt, und bey Eröffnung derſelben 2 von der erſten Gattung mit 2 von der letzten *gepaart* gefunden.

Der walzenförmige Schrotkäfer macht den *füglichſten Uebergang* zu den *Dungkäfern*.

II. *Scarabaeus*, *Dung* (Miſt) *käfer*.

Dabey 17 *Linnéiſche* nebſt einigen andern bekannten, und drey *neue*.

Naſicornis, deſſen *Weibchen Forſteri* nov. Sp. Inſ. Cent. I. p. I. no. I. Scar. *Excavatus*.

Ster-

Stercorarius; Vernalis; Fossor; dieser nicht immer gleich groſs; vielleicht *Scop.* Scar. *oblongus.*

Fimetarius; dessen Griseus hält er für eine eigene Art. no. 7. *Conspurcatus:* noch eher eine Varietät des Fimetarii. *Tessulatus:* keine Abänderung des Fimetarii. *Sacer*: in den wärmern Theilen Tyrols sehr gemein.

Lunaris; das untrüglichste Kennzeichen die vom *Linné* angegebene *Längsfurche* des Brustschildes.

Armiger, Scop. Ann. 5. H. N. p. 78. n. 16. *Taurus; Vacca; Nuchicornis; Thoracocircularis*, Schäff. Ic. t. 74. f. 6? der *rundbrüstige Dungkäfer Schreberi:* die Schaefferſche Abb. Ic. t. 73. f. 6. kömmt mit der Linn. Beſchr. nicht genau überein. Er hat vier abgesonderte rothe Flecke auf den Flügeldecken, nicht aber, wie beym *Schäffer*, zwey rothe Bänder. Wie oft aber haben Sch. Malereyen schon getäuscht?

Ovatus: Vitulus Fabric. Mant. p. 209. no. 101-102. Nicht Linn. Vacca; eher *Geoffr.* I. p. 90. Copris. 5. *Bousier à deux cornes.*

Der *neuen sind drey.*

1) Scar. *Ictericus*, der *gelbsüchtige Dungkäfer.* Niger, elytris flavis. Im Kuhkoth gemein.

2) Sc. *Verticicornis*, der *scheitelhörnige Dungkäfer.* Totus niger, verticis spina erecta. Im Kuhkoth etwas selten.

3) Sc. *Quadrituberculatus*, der *vierhökrige Dungkäfer.* Subtus tomentosus obscurus. Auf dortigen Viehweiden häufig.

III. *Trox*, *Erdstaubkäfer.* Le *Sablieur.*

1) Trox *sabulosus* Linn. nicht Scop. *rugosus;* denn dieser ist Sc. Taurus Linn. und Scop. *Illyricus.*

2) Trox *hispidus.* Pontopp. N. G. v. D. p. 199. no. 19.

3) Trox *barbosus*, der *bärtige Erdstaubkäfer.*

Ein *neuer.* Nigrescens. Im Sommer des Abends bey Hunderten, setzen sich an die Blanken, die gemeinsten in Tyrol.

c 2 4) Trox

4) Trox *holosericeus Scop.* Ann. 5. hist. nat. p. 77. no. 15. der *sammetne Erdstaubkäfer.*

IV. *Melolontha*, der *Laubkäfer.*

1) *Vulgaris* Sc. Melol. *Linn.* Man findet sie mit *rothbraunem und schwarzem Brustschilde* in fettem und steinichtem Erdreiche zugleich.

2) *Solstitialis* L. im Tyrolischen *Brachkäfer;* sehr haaricht; hängt sich gern an die Kornähren, und bestätiget *Lentins* Meynung, dass er das *Mutterkorn* verursache.

3) *Dubia* Scop. E. C. p. 3. no. 4. Nicht zwey Exemplare einander gleich. Eine Abänderung tota obscure-violacea. In *Lauis* (Lugano) oft im Julius so häufig, dass sie fast alles Weinlaub abfressen. *Frisch* hat ihn daher nicht ohne Ursache *Weinblattkäfer* genannt.

4) *Agricola* L. 5) *Horticola* L.

6) *Floricola*, *Blumenlaubkäfer.* Ein *neuer.* Auf Heraclium Sphondilium, und Achillea Millefol. L. Subpilosa nigra, elytris griseis. Cf. *Füeßl.* Verz. p. 3. no. 37. *Fabric.* S. E. p. 38. no. 30. *Geoffr.* I. p. 80. no. 15. *Derselbe* nach *Füeßl.* Anzeige.

7) *Argentea*, der *übersilberte Laubkäfer.* Scar. *farinosus* L. Auf *Weiden* sehr gemein. Der grüne Staub unter dem Vergrösserungsglase perlmutterfarbige runde Bläschen.

V. *Trichius*, der *Schirmblumenkäfer.* Le *Chevilliard.*

1) Tr. *fasciatus* L. no. 70. Auf allen *Umbellen.*

2) *Hemipterus* L. no. 63. das Weibchen grösser, ganz schwarz; der After endigt sich in einen an der Spitze sägeförmigen Legestachel.

VI. *Cetonia*, der *Metallkäfer.* La *Cetoine.*

1) Cet. *aurata* L. no. 78. Am *zweyten* Gliede des Hinterleibes zwo ausgehende Spitzen.

2) C. *Sticfica* L. no. 54. Das Männchen unterſcheidet ſich durch die mindere Gröſse, und eine Reihe von vier weiſsen Flecken, die in der Mitte der Bauchringe hinunterlaufen. Dies ſind eben die vier Flecke, die Stoff zur Verwirrung geben. Man beobachtete ſie an einigen, und vermiſste ſie an andern. Die *erſtern* nannte L. Variabilis; die letztern Sticticus. Es ſind nicht zwo Arten, da ſie der Verf. beyde oft in Copula angetroffen, und hat dadurch meine Muthmaſsung Beytr. I. p. 50. gerechtfertiget. Aus *Röſel* II. Vorber. gehört nur p. 27. Tab. B. f. 5. und ſonſt nichts hieher. *Schäff.* Ic. t. 98. f. 8. iſt ſehr unnatürlich.

3) C. *hirta*, L. *hirtellus*, no. 69. dem Sticfico ſehr ähnlich; aber doch hinlänglich unterſchieden.

VII. *Hiſter*, *Stutzkäfer*.

1) *Unicolor* L. no. 3.
2) *Quadrimaculatus* L. no. 6.
3) *Bimaculatus* L. no. 5.
4) *Pygmaeus* L. no. 4.

VIII. *Dermeſtes*, *Speckkäfer*.

1) *Lardarius* L. no. 1.
2) *Murinus* L. no. 18.
3) *Undatus* L. no. 3.
4) *Pellio* L. no. 4. Bey dieſem die Geſtalt der Fühlhörner ſehr ungleich.
5) *Fumatus Fabric.* S. E. p. 57. no. 12. In Häuſern und auf verſchiedenen Blumen. Schwerlich Linn. *fumatus* no. 22.
6) *Vini*, *Weinſpeckkäfer*. In den *Weinkellern* häufig, beſonders an dem mit Wein befeuchteten Holz.

Teſtaceus exiguus.

 Nach

Nach ihrem ganzen Habitus habe ich diese immer für Abänderungen des Ptinus fur, oder selbst für den Pt. *Germanus* L. no. 6. gehalten. *Goeze.*

IX. *Bostrichus*, *Kaputzkäfer.*

1) B. *Typographus*, D. Linn. no. 7.

Von der besondern Oekonomie und Kolonien dieser Käfer unter alten Borken hoffe ich noch einmal einige Bemerkungen mitzutheilen, weil ich davon merkwürdige Stücke besitze. *Goeze.*

Der Verf. hat Recht, daſs *Sulzers* Abb. von dem Typogr. nicht mit dem eigentlichen Borkenkäfer übereinkomme. Sie sind walzenförmig, und der Brustschild länglicht.

2) *Piniperda*, L. D. no. 11.

3) B. *pectinatus*, der *gekämmte Kaputzkäfer.*

Niger; antennis pectinatis, sat longis. Ein *neuer*. Weil die Flügeldecken ganz, und nicht abgestumpft sind, kann es L. D. *Microgr.* nicht seyn.

X. *Cistela*, der *Fugenkäfer.*

1) *Pillula*; L. *Byrrhus* no. 4. Auf den Flügeldecken schwarz und goldgelb unterbrochene *Lineolae*, nicht Fasciae.

2) C. *varia Fabric.* S. E. p. 60. no. 2.

3) C. *Aenea Fabric.* l. c. no. 3.

XI. *Byrrhus*, *Knollkäfer.* La *Vrillette.* *)

1) *Scrophulariae* L. no. 1.

2) *Verbasci* L. no. 3.

XII. *Ptinus*, *Bohrkäfer.* La *Panache.*

1) *Fur* L. no. 5.

2) *Rufovillosus Degeer* IV. p. 230. no. 2.

XIII.

*) Ist es schon erwiesen, daſs diese Käfer wie die *Ptinen* (Vrillettes) und ihre Larven sich durch alles durchbohren?

XIII. *Sphaeridium*, der *Halbkugelkäfer.*

Sphaerid. *Fabric.* Dermeſtes *Linn. Geoffr.* Anthribus *Geoffr.* Silpha *Linn.* Coccinella *Linn.*

1) *Scaraboïdes* L. no. 17. Schwerlich *Scop.* Derm. Scaraboïdes E. C. p. 18. no. 36.

2) *Unipunctatum* L. Cocc. no. 6.

3) *Atomarium* L. Silpha no. 35.

4) *Haemorrhoïdale Geoffr.* Antrib. no. 5.

5) *Xantopterum Fabric.* Sphaer. *minutum?* no. 8.

XIV. *Silpha*, *Aaskäfer.*

1) *Veſpillo* L. no. 2. Oft auf den Blumen, am liebſten auf den Gipfeln von Bromus, Dactilis, Aira, und andern Grasarten. (Vielleicht die kleinere Art.)

2) *Littoralis* L. no. 11.

3) *Abſciſſa*, der *abgeſtutzte Aaskäfer.*

Atra, apice elytrorum truncato. Nur halb ſo groſs als der Littoralis. Ein *neuer.*

4) *Sinuata*, der *geſchwänzte*, *Geoffr.* I. p. 120. no. 2.

5) *Thoracica* L. no. 13.

6) *Quadripunctata* L. no. 14.

7) *Atrata* L. no. 12. *)

8) *Laevigata Geoffr.* I. p. 122. no. 8.

9) *Obſcura* L. no. 18. *Schäff.* t. 93. f. 5?

10) *Tyrolenſis.* Auf den feuchten Wieſen in den Thälern der Tyroler Eisberge.

Nigra, elytris caſtaneis. Ein *neuer.*

11) *Rugoſa* L. no. 16. **)

12) *Opaca* L. no. 15.

XV. *Oſtoma*, *Beinkäfer.*

1) *Rubicunda* L. Silpha ferruginea no. 19.

2) *Ferruginea Fabric.* S. E. p. 77. no. 3.

*) Zu dem Schäff. Citato Icon. t. 93. f. 5. hat mich *Füeſsl.* Verz. p. 6. verleitet, und nach ihm ſoll f. 6. S. *opaca* ſeyn.

**) *Degeer* Tom. IV. p. 182. no. 7. hat bey ſeinem Bouclier raboteux ſelbſt dieſe Rugoſam Linn. citirt. Doch habe ichs nachher eingeſehen, daſs er Unrecht hatte.

3) *Bipustulata* L. no. 4.
4) *Colon* L. no. 27.
5) *Discoidea Fabric.* S. E. p. 78. no. 5.

XVI. *Cassida*, *Schildkäfer*.

1) *Canaliculata*, der *hohlgerandete Schildkäfer*. Nigra, supra rubra, marginibus thoracis elytrorumque canaliculatis. An einer Gartenmauer. Der gröfste von allen. Ein *neuer*.
2) *Affinis* Fabric. S. E. p. 88. no. 3. Wir geben dem Verf. Recht, dafs das Frischische Citat eher zu diesem, als zu *Viridis* zu ziehen sey.
3) *Viridis* L. no. 1. Die Erfahrung, dafs die grünen Schildkäfer im Tode grün bleiben, hebt meine Vermuthung auf, dafs *Viridis* und *Nebulosa* einerley Arten wären.
4) *Fusca*, der *braune*; in der Gröfse des grünen: Nigra, supra fusca. Ein *neuer*.

XVII. *Coccinella*, *Sonnenkäfer*.

1) C. 2-*punctata* L. no. 7.
2) C. 5-*punctata* L. no. 11.
3) C. 7-*punctata* L. no. 15.
4) C. 8-*punctata* L. no. 14. *Linné* hat das *Weibchen* beschrieben, und des Staatsr. *Müllers* C. 6-*punctata* Pr. Z. D. no. 622. ist das *Männchen*. Der Verf. hat sie in der Begattung angetroffen.
5) *Notata* Fabric. Mant. p. 217. Cocc. 7-*maculata*.
6) *Constellata*, der *gestirnte*. Nigra, elytris punctis septem. Eine *neue*.
7) *C. 20-punctata* L. 26?
8) *C. Conglobata* L. no. 30.
9) *C. Tetragonata*, der gewürfelte L. C. 14-*punctata*. no. 14.
10) *Conglomerata* L. no. 31. Hieher meine Citata aus *Müller* und *Scop.* bey der vorigen.
11) *Ocellata* L. no. 3.
12) *Oblongoguttata* L. no. 38.

13) 10-

13) 10-*guttata* L. no. 33.
14) 14-*guttata* L. no. 34.
15) 2-*pustulata* L. no. 42.
16) 4-*pustulata* L. no. 43.
17) 6-*pustulata* L. no. 44.
18) 10-*pustulata* L. no. 45.
19) 14-*maculata* L. no. 46.

XVIII. *Chrysomela*, *Blattkäfer*.

1) *Chr. Tenebricosa.* L. *Tenebrio* laevigatus no. 29? Das Frischische Citat bey *Geoffroi* XIII. p. 27. t. 22. stellt nicht diese, sondern den Carabus Spinipes L. vor.
2) *Chr. Coriaria*, der *lederartige Blattkäfer*. Nicht Chr. Göttingensis L. aber vielleicht *Fabric.* Chr. Götting., da er bey der Tenebricosa sagt: Statura et summa affinitas Chr. Gött. at *triplo major.*
3) *Chr. Metallica*, der *metallfarbige*. Ein *neuer*, nur Fabric. *Cuprea* S. E. p. 96. no. 10. etwas ähnlich.
4) *Chr. Goettingensis* L. no. 4. Das Röselsche Citat II. 3 Kl. t. 5. gehört nicht hieher.
5) *Chr. Haemoptera* L. no. 11.
6) *Chr. Viridula* L. Faun. Su. ed. 2. no. 520.
7) *Chr. Versicolora Scop.* E. C. p. 72. no. 224. Coccin. *Vitellinae.* Vermuthlich Linn. Chr. *aenea* no. 8.
8) *Chr. Populi* L. no. 30.
9) *Chr. Staphylaea* L. no. 26.
10) *Chr. Polita* L. no. 27.
11) *Chr.* 10-*punctata* L. no. 32.
12) *Chr. Pallida* L. no. 25. Leicht mit dem Derm. *Fumatus* zu verwechseln. Auch nicht Geoffr. *Crioceris* I. p. 243. no. 6. Es ist kein *Crioceris.*
13) *Chr. Polygoni* L. no. 24. Bey *Schäff.* Ic. t. 51. f. 5. die *grüne;* und t. 173. f. 4. a. b. die *blaue* Art.

14) *Chr. Fastuosa* L. no. 18. Nahe mit der *Speciosa* L. verwandt.

15) *Chr. Sanguinolenta* L. no. 38. Durchaus nicht Scop. *Buprestis* Sanguinolenta. Scop. versteht allemal durch *Buprestis* einen Cryptocephalus des Geoffroi.

16) *Chr. Marginata* L. no. 39. *Sulzers* Gesch. t. 3. f. 10. Chr. *marginata* nichts als eine Chrys. sanguinol.

17) *Chr. Marginella* L. n. 40.

18) *Chr. Betulae* L. no. 10. Nicht Scop. Cocc. *Betulae*, sondern Riparia no. 223.

19) *Chr. Vitellinae* L. no. 23. Dies Scop. Cocc. *erratica* no. 226.

Um dieses Geschlecht hat der Verf. grosse Verdienste, und viele Verwirrungen glücklich gehoben, auch eben so viele falsche Zitata berichtiget.

XIX. *Clytra*, *Sägekäfer*.

Chrysomela *Linn.* Melolontha *Geoffr.* Cryptocephalus *Fabric.* Buprestis *Scopoli.*

1) *Cl. Longipes* Fabric. S. E. p. 105. no. 1.

2) *Cl. Quadripuncta* L. no. 76.

3) *Cl. Rubicunda Geoffr.* I. p. 196. no. 2.

4) *Cl. Tridendata* L. no. 73.

XX. *Cryptocephalus*, *Fallkäfer*. *Le Gribouri.*

Cryptocephalus *Geoffr. Fabric.* Chrysom. *Linn.* Buprestis *Scopoli.*

1) *Cr. Sericeus* L. no. 86.

2) *Cr. Violaceus Geoffr.* I. p. 23. no. 1.

3) *Cr. Coryli* L. no. 88.

4) *Cr. Signatus* Scop. no. 207.

5) *Cr. 6-punctatus* L. no. 92.

6) *Cr. Imperialis*, der *kaiserliche*. Niger, elytris stramineis. Ein *neuer*, in der Grösse des Coryli.

7) *Cr.*

7) *Cr. Podae* Muſ. gr. p. 28. no. 9.
8) *Cr. Limbatus* Scop. no. 203.
9) *Cr. Hieroglyphicus* Schäff. Ic. t. 114. f. 6. a b?
10) *Cr. Frenatus*, der *gezäumte*. Niger, thorace luteo ſtriato. Ein *neuer*. Auf Weiden ſehr gemein.
11) *Cr. Triſtis*, der *Traurige*. Niger, maculis duabus luteis thoracis. Ein *neuer*. Auf Weiden.

XXI. *Crioceris*, *Schnurrkäfer*.

Crioceris *Geoffr. Fabric.* Chryſomela *Linn.* Attelabus *Scopoli.*

1) *Cr. Merdigera* L. no. 97.
2) *Cr. 12-punctata* L. no. 110. *Spargelkäfer.*
3) *Cr. Campeſtris* L. no. 113.
4) *Cr. Melanopa* L. no. 105.

XXII. *Adimonia*, der *Forchtkäfer*.

Galeruca *Geoffr.* Chryſomela *Linn. Fabr.*

1) *Adim. Tanaceti* Linn. no. 5. Hieher *Röſel* II. 5 Kl. p. 15. t. 5.
2) *Adim. Violacea Geoffr.* I. p. 254. no. 6.
3) *Adim. Polygonata Geoffr.* I. p. 224. no. 5.
4) *Adim. Verna*, der *Frühlings-Forchtkäfer*. Tomentoſa teſtacea. Ein *neuer*. Auf verſchiedenen Stauden, beſonders auf dem Viburnum lantana L.

XXIII. *Altica*, *Hüpfkäfer*.

Chryſomela *Linn.* Altica *Geoffr. Fabr.* Chryſomela *Fabric.*

1) *Altic. Hyoſcyami* L. no. 54.
2) *Altic. Voluta*, der *gerollte*. Nur einmal auf *Taubneſſeln*. Tota teſtacea nitida. Ein *neuer*.
3) *Altic. Exoleta* L. no. 59.
4) *Altic. Rufipes* L. no. 65.
5) *Altic. Nitidula* L. no. 60.
6) *Altic. Nemorum* L. no. 62.
7) *Altic. Atra* Geoffr. I. p. 247. no. 8.

XXIV. *Curculio*, *Rüſſelkäfer.*

1) *Curc. Germanus* L. no. 58.

2) *Curc. Gemmatus Scop.* no. 90.

3) *Curc. Vagus* Geoffr. I. p. 282. no. 10. Scop. Curc. *triſtis* no. 94. kömmt ihm am nächſten.

4) *Curc. Cupreus* Scop. no. 94. C. *infidus?*

5) *Curc. Anthracinus* Scop. no. 92.

6) *Curc. Argentatus* L. no. 73. *Sulzers* Anführungen aus Schäffers Entom. t. 86. alle irrig. Kein Mylatris.

7) *Curc. Viride aeris*, der *Berggrüne.* Auf wilden Kaſtanien. Ein *neuer.*

Totus viridis.

8) *Curc. Fuſcus* Schäff. Ic. t. 163. f. 6.

9) *Curc. Excavatus*, der *Ausgehöhlte.* In Wäldern. Ein *neuer.*

Niger, punctis excavatis ſtriatus fulvo-maculatus.

10) *Curc. Abietis* L. no. 57. et no. 19. *Pini.*

11) *Curc. Longipes*, der *Langfuß.* Nur einmal am Stamme eines Taxbaums. Ein *neuer.*

Longiroſtris murinus, pedibus anterioribus longiſſimis.

12) *Curc. Mutilatus*, der *geſtümmelte.* Auf einer Hangbutenſtaude. Ein *neuer.*

Supra ater ſubopacus, ſubtus niger elytris abbreviatis.

13) *Curc. Violaceus* L. no. 63.

14) *Curc. Granarius* L. no. 16.

15) *Curc. Lapathi* L. no. 20.

16) *Curc. Punctatus* Geoffr. I. p. 279. no. 5.

17) *Curc. Pericarpius* L. no. 31. Der *Kernbehälterrüſſelkäfer.*

18) *Curc. Scrophulariae* L. no. 61.

19) *Curc. Paraplecticus* L. no. 34.

20) *Curc. Colon* L. Mant. p. 531.

21) *Curc. Pollinis*, der *Blumenstaubrüsselkäfer.* Auf der Berberis communis L. nicht selten. Ein **neuer.** Nigrescens, maculis albescentibus pilosis.

22) *Curc. Purpureus* L. no. 14.

23) *Curc. Flavipes* Geoffr. I. p. 272. no. 8.

24) *Curc. Sulcirostris* L. no. 85.

25) *Curc. Bilineatus* Sch. Ic. t. 155. f. 2.

26) *Curc. Viridis* L. no. 76.

XXV. *Rhinomacer*, der *Afterrüsselkäfer.*

Rhinomacer *Geoffr.* Curculio *Linn. Fabric.* Attelabus *Linn. Fabric.* Curculio *Scopoli.*

1) *Rhin. Bacchus* L. no. 38. Hieher die meisten Zitata bey C. *purpureus.*

2) *Rhin. Betulae* L. no. 39. *Frisch* XII. p. 17. t. 8. 2 Pl. ist wohl C. *Bacchus.*

3) *Rhin. Coryli* L. Attel. 1. Hieher gehöret mit Recht auch Attel. Avellanae L.

4) *Rhin. Curculionoïdes* L. Att. 3.

XXVI. *Attelabus*, der *Bienenkäfer.*

Attelabus *Linn.* Clerus *Geoffr. Fabric.* Notoxus *Fabr.*

1) *Attel. Apiarius* L. Att. 10. Dessen Larve in dem Neste der Mauerbienen, und nährt sich von den Bienenmaden.

2) *Attel. Formicarius* L. Att. 8.

3) *Attel. Mollis* L. no. 11.

4) *Attel. Geoffroyanus*: L. Derm. violaceus no. 13.

So weit gehet des ersten Bandes erster Theil dieses vortrefflichen Buchs. Ich habe darum einen so weitläuftigen Auszug daraus gemacht, weil ich noch kein Insektenwerk kenne, worinnen mehr Genauigkeit, Gründlichkeit, und auf Erfahrungsgründen beruhende Berichtigung vieler Verwirrungen, auch mehr Bescheidenheit und Wahrheitsliebe wäre, als in diesem.

ſem. In dieſem mehr litterariſche, entomologiſche Kenntniſs, im *Schrank* etwas mehr eigentliche Naturgeſchichte. Beydes ein Paar der trefflichſten Bücher zur Entomologie.

* * *

Ein eben ſo wichtiges Werk für die Thier-Inſekten- und beſonders für die *Wurmgeſchichte* iſt folgendes:

Fauna Groenlandica: Syſtematice ſiſtens Animalia *Groenlandiae occidentalis*, hactenus indagata, quoad nomen ſpecificum, triviale, vernacalumque, Synonyma Auctorum plurium, Deſcriptionem, Locum, Victum, Generationem, Mores, Vſum, Capturamque ſinguli, prout detegendi occaſio fuit, maximaque parte ſecundum *proprias obſervationes Othonis Fabricii*, Miniſtri Evangelii, quondam Groenlandis ad Coloniam Friederichshaab, poſthac Norvagis Drangedaliae, nunc vero Danis Hopunti Jutiae, Membri Societatis Scientiarum, quae eſt Hafniae. 8. Hafniae et Lipſiae 1780.

Ein würdiger Schüler des würdigſten Otto Friedr. *Müllers!* Wer hätt' es geglaubt, daſs man von Grönland eine ſo reiche Faunam liefern könnte? Dieſe Fauna iſt gleichſam der Prodromus eines gröſſern Werks, das wir noch von dem Verf. zu erwarten haben, und welches aus drey Theilen beſtehen wird.

Pars I. *Phyſica* cum figuris variis rariorum.
— II. *Geographica* cum chartis.
— III. *Hiſtorica.*

In

In dieſer Fauna, wobey eine Kupfertafel, hat ſich der Verf. was die Klaſſen und Geſchlechter der Thiere betrifft, nach *Müllers* Zool. Dan. Pr. gerichtet. Von Inſekten 371 Arten. Von Würmern 709 Arten. Von *Bandwürmern* kommen p. 316 f. inſonderheit vor:

1) Taenia *Phocarum.*
2) — *Erythrini.*
3) — *Alcae.*
4) — *Tordae.*
5) — *Scorpii.*
6) — *Gaſteroſtei.*

Ich kann dieſes intereſſante Werk nicht genug empfehlen, weil es keinen Auszug leidet.

❊ ❊ ❊

In den Bemerkungen der Churpfälziſchen phyſikaliſchen oekonom. Geſellſch. vom Jahr 1779. finde ich No. 4. Hrn. *Pollich* Abhandlung von einigen *Inſekten*, die in des Ritt. von *Linné* Naturſyſtem nicht befindlich ſind.

1) *Papilio Pompadour*, der *Weißſaum.*
2) *Cimex* punctum album, der *Weißpunkt.*
3) *Cimex ſuperbus*, der *Felſenſteiger.*
4) *Cimex* Vilburgenſis, der *Naſſauer.*
5) *Tenthredo* arbuſtorum, der *Baumgärtner.*
6) *Lucanus* aeneus, der *Kupferſchröter.*
7) *Ichneumon* mixtus, der *Miſchling.*
8) *Phalaena* bipunctata, der *Zweypunkt.*

Die glückliche Entdeckung der Oekonomie der *Prachtkäfer* (Bupreſtis), die bisher noch ſo dunkel war, haben wir dem Hrn. Pred. *Herbſt* in Berlin zu danken. S. Schriften der Berlin. Geſellſch. Naturf. Freunde, I. p. 85 ff.

Zum

Zum Beſchluſs will ich noch des neuen, prächtigen und koſtbaren Inſektenwerks gedenken, das nach *Baldingers* neuem Magaz. für Aerzte 2 B. 5 St. p. 464. von Lyon angekündiget iſt:

Les Inſectes de France, décrits et claſſés ſelon la méthode de Mr. *Linnaeus*, par Mr. de *Villers* des Acad. de Lyon & de Marſeille, deſſinés par Mr. *Gonichon* & gravés par les plus célebres Artiſtes, in 4. *quatre Volumes*, propoſés par Subſcription.

Darinn eine Menge ſeltener und wenig bekannter Inſekten: mehrere, von denen man geglaubt hat, ſie wären in Afrika und Amerika zu Hauſe. Im Junius 1781 die erſte, und im Junius 178; die letzte Ausgabe. Der Preis 120 Livr. Die Zahl der Inſekten auf drittehalbtauſend. Bey jeder Ausgabe 12 - 15 Platten. Ueberall bis 230 Platten.

Wenn das ſo fortgehet, ſo fürchte ich, daſs allein das Inſektenſtudium anſehnliche Bankeroute veranlaſſen werde.

Vor der Michaëlismeſſe 1781.

3. Zungen-

3. Zungenlose *Spinner*, mit niedergedrückten Flügeln und Kammrücken (alis depressis, dorso cristato).

54. *Pudibunda*, der *Kopfhänger*.

Müller l. c. p. 669. no. 54. der *Kopfhänger*.

Füeßlins schweiz. Ins. p. 35. no. 671. der *Rothschwanz*.

Auf *Büchen*, *Eichen und Nußbäumen*.

— Magaz. der Entomol. II. B. p. 3.

Berlin. Magaz. II B. p. 418. no. 35.

Phal. *pudibunda*, der *Rothschwanz*. Aschgrau mit drey graubraunen Queerstreifen durch die Oberflügel.

Röfels Insektenbel. I. N. V. 2te Kl. p. 222. t. 38. die gelbe *Bürstenraupe*, und derselben Verwandlung *).

Maders (Kleemanns) Raupenkalender, p. 32. no. 78. Phal. *pudibunda*, der *Kopfhänger* **). p. 111. no. 312. der *Kopfhänger*, *Streckfuß*.

Gle-

*) *Rösel* hat beyde Geschlechter, Männchen und Weibchen, mit borstenförmigen Fühlhörnern abgebildet, da doch nur das Männchen *kammförmige* Fühlhörner hat; diesen kleinen Irrthum aber im 3ten B. p. 270. §. 6. berichtiget.

**) Hierbey am Rande *Rösels* t. 37. f. 1-9. unrichtig angeführt, welche

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 569. no. 5. Phal. *pudibunda*, der *Rothſchwanz*.

Fiſchers N. G. von Livland, p. 152. no. 355. Phal. *pudibunda; der Kopfhänger; ſchamhafter Nachtſchmetterling.*

Syſtemat. Verzeichn. der Schmetterl. der Wien. Geg. p. 55. G. *Bürſtenraupen;* Larvae faſciculatae (Chenilles à broſſes); *Streckfüßigte* *) *Spinner;* Phal. Bomb. *Tendipedes.*

1) Beyde Geſchlechter mit abhangenden Flügeln.

2) Die Männchen mit flachverbreiteten Flügeln; die *Weibchen flügellos.*

No. 1. der erſten Abtheilung:

Wallnußſpinnerraupe (Iuglandis regiae): La Chenille à broſſes du Châtaigner.

Wallnußſpinner: Phal. *pudibunda; la patte-étendue.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 403. Phal. *pudibunda.*

Bekm. Epit. Syſt. Linn. p. 164. no. 54. Phal. *pudibunda.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 185. no. 7. *Phalaena* media cinerea, alis oblongis, exterioribus quatuor lineis nigricantibus transverſis diſtinctis **).

— — p. 309. no. 3. *Eruca* pulcherrima rarius piloſa, cum 4 in medio dorſo pilorum faſciculis albicantibus

welche die *Faſcelinam* vorſtellt; hingegen p. 111. bey der nämlichen pudibunda die rechte Kupfertafel t. 38. f. 1-6. zitirt.

*) Weil alle Falter dieſer Klaſſe das *Familienzeichen* haben: daſs ſie im Sitzen beyde Vorderfüſſe lang vor ſich herſtrecken, und zwiſchen denſelben den niederhangenden Kopf verbergen.

**) Scapulae, caput, vt et pedes primores, (quos, cum quieſcit, antrorſum recta protendit, iisque oculos et caput occultat,) longa et denſa lanugine veſtiuntur.

tibus cum diluta purpurae tinctura, et *penicillo purpureo* erecto in cauda.

Raj. Hist. Inſ. p. 344. no. 9. *Eruca* major pulcherrima piloſa, e viridi flavicans, 4 in medio dorſo ſcopulis e flavo albicantibus, cum purpureo penicillo longiore ſupra caudam.

Syſt. Natur. du Regne Animal, Tom. II. p. 146. no. 19. *Phalene* de la Chenille à broſſes, qui ſe trouve ſur le Châtaigner.

Scop. Entom. carn. p. 194. no. 489. Phal. *pudibunda.*

Long. lin. 9½. Lat. 4½.

Antennae rufae; rachi alba; Alae albidae: *anticae* lineis tribus, repandis, umbrinis faſciatae; pagina alae inter faſciam mediam et poſticam umbrina tota; *poſticae* ſubtus macula media, fuſca.

Fabric. Syſt. entom. p. 570. no. 50. Bomb. *pudibunda.*

Alis deflexis, cinereis; faſciis tribus fuſcis, linearibus, undatis.

Larva faſciculata, piloſa, flava, capite luteo, caudae faſciculo longiori rubro, dorſi quatuor albis.

Pupa folliculata, antice nigra, poſtice brunnea, flavo-maculata.

Schaeff. Icon. t. 44. f. 9. 10. *Foemina.* t. 90. f. 1. 2. 3. (*Wien. Schmett.* p. 151.)

Mülleri Faun. Frider. p. 40. no. 364. Ph. B. *pudibunda.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1367. Phal. B. *pudibunda.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 113. no. 15.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis, cinereo-undulatis, faſciis transverſis obſcurioribus, capite inter pedes porrectos.

La *patte-étendue.*

 Long.

Long. 1 pouce.

Degeer Inſ. I. Mém. 7. p. 243. t. 16. f. 7 - 12.

Belle Chenille velue jaune, à broſſes et à aigrettes, qui a des bandes transverſales noires et veloutées à la jonction de quelques anneaux, et qu'on trouve en Automne ſur les Poiriers, les Châtaigners et d'autres arbres.

— — p. 697. t. 16. f. 11. 12.

Phalene à antennes à barbes brun - jaunâtres, ſans trompe; gris - blanchâtre à quelques rayes transverſales ondées brunes.

— Tom. II. Part. 1. p. 317. no. 6. *Phalene patte-étendue blanche.*

Phalene à antennes à barbes jaunes ſans trompe; à corcelet huppé, à ailes cendrées blancheatres avec des rayes transverſes ondées brunes et cendrées.

— *Ueberſ.* I. 7 Abh. II Quart. p. 27. t. 16. f. 7 - 12.

Die ſchöne, rauche, gelbe *Bürſten-* und *Büſchelraupe*, mit ſammtſchwarzen Queerſtreifen in einigen Ringgelenken, die man im Herbſt auf den Birn - Kaſtanien - und andern Bäumen findet.

— IV Quart. p. 120. t. 16. f. 11. 12. Ein weiſslichgrauer *Nachtvogel* mit braungelblichen bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, und einigen wellenförmigen braunen Queerſtreifen.

— II Th. I B. p. 229. no. 6.

Die ohnzüngige *Phaläne*, mit gelben bärtigen Fühlhörnern; einem Rückenkamm, und weiſslich aſchgrauen Flügeln mit braunen und aſchgrauen gewäſſerten Queerſtreifen.

Der *weiſſe Streckfuſs.*

β. Phal. *Scopularia.*

Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 521. no. 144.

Clerk Icon. t. 5. f. 8.

Cathol.

Cathol. A. p. 352. *Chenille annulaire;* Annularia*).
Eruca *annularis Frisch.*
Neustria major *Mouffet.*
Eruca sepiaria gregaria maior pulchre colorata. *Raj.*

55. *Fascelina*, die *Bürstenmotte.*

Müller Erl. des L. N. S. V B. I Th. p. 669. no. 55. t. 14. f. 6. der *Büschelraupenvogel.*
Füeßl. schweiz. Inf. p. 35. no. 672. die *Bürstenmotte.*
Auf dem Weisdorn, etwas selten.
— Magaz. der Entomol. II. p. 4. Phal. *Fascelina.*
In Bündten im Frühjahr gemein, auf dem *Klee* besonders mehrere beysammen.
Berlin. Magaz. II. p. 422. no. 41. Phal. *Fascelina*, die *Bürstenmotte.*
Aschfarbig mit vielen feinen braunen Punkten, und einem schmalen braunen Queerstreif durch die Oberflügel.
Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 K. p. 217. t. 37.
Die graue *Bürstenraupe*, und derselben Verwandlung.
Maders (Kleem.) Raupenkalender p. 15. no. 18. Phal. *fascelina*, *Bürstenmotte.*
Gleditsch Forstwiss. I. p. 683. no. 7. Phal. *fascelina*, das *gestreifte Band.*
— II. p. 740. no. 28. Ph. *fascel.* *das gestreifte Band.*

A 3 *Wien.*

*) Die *Ringelraupe*, d. i. eine 16füssige Raupe, welche ihre Eyer um die höchsten Zweige der Obstbäume, sehr nahe bey einander, in einem Kreis oder Ring herumlegt. Diese Raupe hat sehr schöne Farben. Sie ist die Larve des Nachtschmetterlings, der beym *Linné* Phalaena *Scopularia* heisst, und eine Gattung der Phal. *pudibunda* ist.

Beyde, Larve und Phaläne, mir völlig unbekannt. Bloss im Clerk eine Abbildung der Phaläne. Wer sie kennet und besitzt, mache sie doch im *Naturforscher* bekannter.

Wien. *Schmett.* p. 55. G. no. 3. *Kleeblumenſpinnerraupe.* (Trifol. pratenſe.) La *Limaçonne.* Goed. *Kleeblumenſpinner.* Phal. B. *faſcelina.*

Onomatol. hiſt. nat. P. I. p. 469. Antennulata *Mouff.* die *Löwenzahnraupe;* die *Butterblumenraupe.*

— P. 6. p. 366. Phal. *faſcelina*, der *Büſchelraupenvogel.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 55. Phal. *faſcelina.*

Catholic. A. p. 359. Antennulata *Mouff. Löwenzahnraupe.*

Syſt. *Natur.* du Regn. Anim. II. p. 147. no. 20. *Phalene du Trefle.*

Goed. belg. I. p. 84. t. 36. Eruca *faſciculata.*

Merian. Europ. t. 18. *Taraxacum.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 186. no. 8.

Phalaena obſolete cinerea, alas corpori velut circumvolvens, pedes primores longa et denſa lanugine hirſutos antrorſum longiſſime porrigens.

— — p. 334. *Phalaena* e cinereo albicans, corpore habitiore; antennis plumoſis rubentibus, primores pedes, cum ſedet, protendens, et alas corpori velut circumvolvens.

— — p. 344. *Eruca* nigra media, longis pilis hirſutis, quinque medio dorſo innaſcentibus pilorum longiorum ſcopulis nigro albo et ex luteo viridi coloribus variis.

Fabric. Syſt. entom. p. 571. no. 51. B. *faſcelina.*

Alis deflexis cinereis; atomis nigris ſtrigisque duabus fulvis, repandis.

Larva piloſa, *faſciculata*, rubro-punctata; faſciculis quinque dorſalibus albis, capitis anique fuſcis.

Pupa folliculata, brunnea, linea dorſali piloſa.

Mülleri

Mülleri Faun. Frider. p. 40. no. 365. Phal. B. *fascelina.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1368. Nom. *Linn.*

Degeer Inf. I. Mém. 7. p. 261. t. 15. f. 12 - 15.

Chenille noire très - velue, à cinq brosses demi - noires et demi - blanches sur le dos, et à trois longues aigrettes noires.

— — p. 697. t. 15. f. 15. Phalene à antennes à barbes, sans trompe, d'un gris d'achate, à deux rayes noires bordées de jaune et à tache noire bordée de blanc.

— Tom. II. Part. I. p. 318. no. 7. *Phalene* à antennes barbues sans trompe, à corcelet huppé, d'un gris d'agathe, avec deux rayes noires bordées de jaune et une tache noire bordée de blanc sur les ailes supérieures.

Phalene patte - étendue agathe.

— *Uebers.* I. 2 Qu. 7 Abh. p. 40. t. 15. f. 12 - 15.

Die schwarze rauche Raupe, mit fünf halbschwarzen und halbweissen Rückenbürsten, sammt drey langen schwarzen Haarbüscheln.

— 4 Qu. p. 119. t. 15. f. 15.

Ein achatgrauer *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüssel, mit zwo schwarzen gelbbordirten Streifen, und einem schwarzen Fleck mit weissem Rande.

— II Th. I B. p. 230. no. 7.

Die ohnzüngige Phaläne mit bärtigen Fühlhörnern, einem achatgrauen Rückenkamm, und zwo schwarzen gelbgerändelten Streifen, nebst einem schwarzen weissgerändelten Fleck, auf den Oberflügeln.

Der *achatfarbige Streckfuß.*

56. *Antiqua*, der *Sonderling* *).

Müller l. c. p. 670. no. 56. der *Sonderling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 35. no. 673. der *Laſtträger.*

— Magaz. der Entomol. II B. p. 4. Phal. *antiqua.*

„Auf dem neunten und zehnten Gelenke ha„ben die Raupen *kleine rothe Knöpfchen*, die ſie „aus- und einziehen können, welches weder „*Reaumur* noch *Röſel* bemerkt haben“ **). — Nach der *fünften* und letzten Häutung bekommen ſie alle die *Bürſten*, die einige nach der *vierten* noch nicht haben. (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Mag. II. p. 408. no. 21. Phal. *Antiqua*, der *Laſtträger.*

Das *Weibchen* weiſs, und *ohne Flügel.* Die Flügel des Männchens glänzend braun, mit weiſſen und oraniengelben Zeichnungen.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 225. t. 39. f. 1 - 4.

Die mit rothen Knöpflein gezierte graue Bürſtenraupe, nebſt derſelben Verwandlung.

— — Fig. 4. das *ungeflügelte Weibchen.*

— III B. p. 81. t. 13. das *Männchen* ***).

Maders

*) Das Weibchen dieſes Nachtvogels iſt völlig *flügellos*, und ſiehet aus wie ein *Kellerwurm.* Man kennet bis jezt unter den *Spinnern* nur zwo Arten, deren Weibchen *flügellos* ſind: dieſe, und Ph. *Gonoſtigma.* Unter den *Spannern* giebt es mehrere.

**) Herr *Kleemann* ſagt ausdrücklich in ſeiner Anmerkung zum *Röſelſchen* Text I. B. p. 227. Zwiſchen dem letzten Paar der rothen Knöpflein auf dem *neunten und zehnten Abſatz* ſtehet ein noch viel mehr hochrother fleiſchiger blaſenartiger Knopf, den die Raupen einziehen und wieder hervortreiben können.

***) Schleppt das Weibchen nicht durch die Luft, da ſolches gleich befruchtet wird, wie es aus der Puppe kömmt, und ſich nicht von der Stelle bewegt, ſondern ſeine Eyer gleich an das Gewebe

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 32. no. 79. Phal. *Antiqua*, der *Laſtträger; Sonderling.*

Swammerd. Bib. der Nat. p. 223. t. 33. f. 3. 6. 8.

Altes Hamb. Magaz. I B. 6 St. p. 167. *Ungeflügelte Schmetterlinge.*

Neue Mannichfalt. II Jahrg. p. 516. 612.

Naturforſcher V St. p. 253. Phal. *Antiqua.* Das Weibchen legt auf 300 Eyer.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 388. no. 4. Phal. *antiqua*, der *Laſtträger.*

— — p. 549. no. 4.

Wien. Schmetterl. p. 55. G. No. 5. *Abrikoſenſpinnerraupe* (Pruni Armeniacae); *Abrikoſenſpinner;* Ph. B. *antiqua.*

Schriften der königl. *norwegiſchen* Geſellſch. der Wiſſenſchaften, IV. p. 281. no. 37. t. 16. f. 14. Phal. *antiqua.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 370. no. 9. Ph. *antiqua.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 315. Phal. *antiqua*, der *Sonderling.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 56. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 146. no. 18. *Phalene de la Chenille à broſſes* ſur le Prunier.

Cathol. A. p. 372. Ph. *antiqua.*

Act. Upſal. 1736. p. 25. no. 74. *Papilio* alis depreſſis cinereo-fuſcis; antennis pectinatis.

Liſt. Goed. p. 185. no. 78. a b. *) Eruca *miranda; Antik peregrinum.*

 Raj.

webe auf einen Haufen legt, und ſtirbt; die jungen Räupchen aber ſich von einem Baum auf den andern zerſtreuen.

*) Es iſt doch ſonderbar, daſs ſchon *Goedart* und *Liſer* Erfahrungen gehabt, daſs aus Schmetterlingseyern, ohne Zukunft des Männchens, junge Räupchen ausgekommen ſeyn ſollen.

Raj. Hift. Inf. p. 173. no. 24. *Phalaena* cinericea ventricofa corpore brevi, *alarum expers (Foemina).*

— — p. 200. no. 24. *Phalaena* minor rufa, in utravis ala exteriore macula alba rotunda prope angulum imum interiorem infignita *(Mas).*

— — p. 344. no. 8. *Eruca* fublutea pilofa, quatuor in medio dorfo agminulis feu penicillis pilorum longiorum luteorum, et longo pilorum nigrorum penicillo in cauda.

Scop. Entom. carn. p. 198. no. 496. Phal. *antiqua.*

Long. lin. 7. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.

Antennae longitudo eft dimidia latitudinis alae anticae, quibus macula corticina alba linea terminata ad apicem, nec non lunula alba prope pofticum angulum.

Folliculus duplex ut in *pudibunda.*

Fabric. Syft. Entom. p. 584. no. 98. B. *antiqua.* Nom. *Linn.*

Larva fafciculata; fafciculis dorfalibus quatuor albis, antennalibus caudalique obfcuris.

Pupa folliculata, nigro luteoque variegata.

Mülleri Faun. Frider. p. 41. no. 366. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 118. no. 1369. Phal. *antiqua.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 119. no. 23.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis rotundatis fufco-ferrugineis, fuperioribus macula alba anguli ani; *foemina aptera.*

L' *étoilée.*

Long. 7 lign.

Degeer Inf. I. Mém. 7. p. 253. t. 17. f. 1-15.

Chenille très-commune, noire à quatre broffes jaunâtres fur le dos, et à cinq aigrettes noires

en

en forme de pinceaux, qui a des tubercules rouges, et qui mange les feuilles de plusieurs especes d'arbres.

Degeer Inf. I. Mém. 7. p. 697. t. 17. f. 13. 14. 15.

Phalene à antennes à barbes, sans trompe, dont la femelle est grise et sans ailes, et dont le mâle est jaune brun, à deux taches blanches.

— Tom. II. Part. I. p. 292. no. 2.

Phalene à antennes barbues sans trompe, à ailes étendues d'un brun jaunâtre, avec une tache blanche; dont la femelle est grise et sans ailes. — *Phalene paradoxe.*

— *Uebers.* I B. 2 Qu. 7 Abh. p. 33. t. 17. f. 1-15.

Die sehr gemeine schwarze *Raupe*, mit vier gelblichen Rückenbürsten, fünf schwarzen Haarpinseln und rothen Knöpfen, fast auf allen Bäumen.

— — 4 Qu. p. 120. t. 17. f. 13-15.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern ohne Saugrüssel; das Weibchen grau und ungeflügelt; das Männchen gelbbraun mit zween weissen Flecken.

— II Th. I B. p. 208. no. 2.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Sauger, welche die Flügel breit trägt, die gelbbraun sind und einen weissen Fleck haben; das Weibchen grau und ungeflügelt.

Das *Paradoxum.*

57. *Gonostigma*, der *eckfleckige Spinner.*

Müller l. c. p. 671. no. 57. der *Eckfleck.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 36. no. 674. der *Eckfleck.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 6. Phal. *gonostigma.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 32. no. 80. Phal. *Gonostigma*, der *Eckfleck.*

Röſels Inſektenbel. I B. N. V. 2 Kl. p. 229. t. 40. die *ſchön pomeranzengelbgeſtreifte Bürſtenraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 55. G. no. 6. *Zwetſchkenſpinnerraupe* (Pruni domeſticae). La Chenille *à broſſes* du Prunier. *Réaum.* La *Soucieuſe.* Goed. *Zwetſchkenſpinner.* Phal. B. *Gonoſtigma.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 373. Phal. *Gonoſtigma.*

Scop. Entomol. carn. p. 199. no. 497. Phal. *Gonoſtigma.*

Long. lin. 6. *Lat.* 3⅔.

Ochreacea, alis anticis macula *trigona,* alba — *differt* ab antiqua antenn. rachi ochreacea. Alis ſubtus concoloribus: primoribus ſupra faſcia antica obſoleta obſcuriore, atmoſphaera fuſca circa maculam albam.

Fabric. Syſt. Ent. p. 585. no. 99. B. *Gonoſtigma.*

Alis incumbentibus fuſcis; maculis duabus albis oppoſitis; *foemina aptera.*

Differt manifeſte a praecedente. Alae ochreaceae, maculis duabus albis, altera ad angulum ani, altera oppoſita ad marginem craſſiorem maculae ferrugineae innata.

Larva gregaria, faſciculata, faſciculis octo dorſalibus albis, collaribus duobus analique nigris.

Pupa antice flava, poſtice nigra.

58. *Tremula,* der *Eſpenſpinner.*

Müller l. c. p. 671. no. 58. der *Zahnflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 675. *der Zahnflügel.*

Wien. Schmetterl. p. 49. A. *Scheinſchwärmerraupen: Mondmaklichte Spinner* mit geründeten Flügeln.

No. 4. *Aeſpenſpinnerraupe* (Populi tremulae); *Aeſpenſpinner.*

Fiſchers

Fischers N. G. von Livl. p. 152. no. 356. Ph. *Tremula; Zitterschmetterling; Zahnflügel.*
Naturforscher VI. p. 116. t. 5. f. 4.
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 298. no. 1121. *)

59. *Coeruleocephala*, der *Blaukopf* **).

Müller l. c. p. 671. no. 59. der *Blaukopf.*
Füeßl. schweiz. Ins. p. 36. no. 676. Ph. *Coeruleocephala*, der *Blaukopf.*
— Magaz. der Entomol. II. p. 6. Phal. *coeruleocephala* ***).

Frisch

*) Daselbst die Beschreibung sehr genau, und mit der im Naturforscher befindlichen Abbildung übereinstimmend.

**) Auch an dieser hat der grosse *Bernoulli* das Vermögen bemerkt, fruchtbare Eyer zu legen, ohne sich begattet zu haben. S. *Erxlebens* physik. Bibl. II B. p. 363.

So wenig wir geneigt sind, die Erfahrungen eines *Bernoulli* und anderer abzuleugnen; so sehr empfehlen wir bey Wiederholung solcher Versuche Genauigkeit und Vorsicht. Denn dies wäre sicher der Fall, worinn sich die Natur von ihren gewöhnlichen, und in dem grossen unermeslichen Thierreiche durchgängig bestätigten Gesetzen am weitesten entfernte. Man müsste von dergleichen, aus unbefruchteten, oder vaterlosen Eyern ausgekommenen Raupen wieder welche zur Verwandlung zu bringen suchen, um zu sehen, wie weit sich dann diese vermeinte Fruchtbarkeit erstrecke.

***) „Viele dieser Raupen, sagt der Herr Chorherr *Meyer*, die an einem Tage ganz gesund schienen, traf ich am folgenden wie verfault an, indem aus jeder eine ungeheure Menge sehr kleiner Würme oder Larven kamen, nachdem sie die Raupe bis auf den Balg, und dieses, wie es scheint, in wenigen Stunden, ausgehöhlt hatten. Dies hemmet die starke Vermehrung dieser gefrässigen Baumraupe."

Dieser Umstand ist mir in Ansehung des vorigen Phänomens von den fruchtbaren Eyern dieser Phaläne ohne Begattung sehr wichtig. Wie wenn dergleichen *Ichneumonslarven* in den Eyern

gestekt,

Frisch Inf. X. p. 5. no. 3. t. 3.

Die *blaugrünliche Raupe* mit gelben Streifen, und der Papilion davon.

Berlin. Magaz. II. p. 410. no. 22. Phal. *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*

Braun, etwas ins Graue und Bläuliche fallend; die Oberflügel mit drey an einander flofsenden gelblich weiffen Flecken.

Röfels Infektenbeluft. I. N. V. 2 Kl. p. 105. t. 16. die *dicke meergrüne gelbgeftreifte und fchwarzpunktirte Raupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 13. no. 12. Ph. *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*

Gleditfch Forftwiff. II. p. 785. no. 6. Phalaena *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Infektologie p. 97. no. 20. Phal. *coeruleocephala.*

Die *Raupe* hat auch das *Fleifchhorn* unten am erften Ringe zwifchen der Unterlippe, und dem erften Paar Füfsen.

Wiener Sehmetterl. p. 59. M. *Halbhaarraupen*, Larvae *fubpilofae; grofsftirnichte Spinner;* Phal. Bomb. *Capitones.*

No. 3. *Mandelnfpinnerraupe* (Amygdali communis); La tête bleue. *Goed. Mandelnfpinner.* Ph. *coeruleocephala.*

Fifchers N. G. von Livland, p. 152. no. 357. Phal. *coeruleocephala*, *Blaukopf.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 370. no. 10. Phal. *coeruleocephala.*

Onomat.

gefteckt, und etwas vor der Zeit aus diefen Eyern ausgekommen wären? Hab' ich doch Erfahrungen, dafs fich in den Eyern der Phal. *caftrenfis* die kleinen Ichneumons bis zur *Fliege* verwandelt haben. S. *Naturforfch.* 15 St. p. 49.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 326. Phal. *coeruleocephala*, der *Blaukopf.*
Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 59. Phal. *coeruleocephala.*
Fabric. Syſt. entom. p. 572. no. 53. B. *coeruleocephala.*

Alis deflexis griſeis; faſciis duabus ferrugineis, maculaque albida duplicato-didyma.

Larva nuda, coeruleſcens, luteo-lineata, nigro punctata.

Pupa folliculata, brunnea.

Imago thorace antice ferrugineo, poſtice griſeo.

— Reiſe durch Norwegen p. 69. Ph. *coeruleocephala.* Die *Raupen* faſt alle Obſtbäume kahl gefreſſen.
Raj. Hiſt. Inſ. p. 163. no. 17.

Phalaena alis exterioribus pullis duabus tribusve maculis albis, e duobus circulis compoſitis, contiguis notatis.

— — p. 163. no. 17. *Eruca* rarius piloſa, mali, pyri.
Mülleri Faun. Frider. p. 40. no. 363. Ph. B. *coeruleocephala.* Nom. *Linn.*
-- Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1370. Phal. *coeruleocephala.* Nom. *Linn.*
Syſtem. Nat. du Regn. anim. II. p. 149. no. 27.

Phalene du Poirier, qui eſt le *bleu-Céphale*, *coeruleocephalus.*

Geoffr. Inſ. II. p. 122. no. 27.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis fuſcis, macula duplici albido-flaveſcente geminata.

Le *double-omega.*

Long. 10. lign.

60. *Di-*

60. *Dictaea*, der *brandflüglichte Spinner* *).

Müller l. c. p. 672. no. 60. der *Brandflügel.*

Wien. Schmetterl. p. 62. R. *Buckelraupen*, Larvae *gibbosae; rückenzähnichte Spinner.* Phal. B. *Dorso dentatae.*

1) mit unrichtigen *Hoekern*, vornehmlich auf dem *eilften Ringe.*

No. 1. *Schwarzpappelspinnerraupe.* (Populi nigrae): *Schwarzpappelspinner.* B. *Dictaea.*

Fabric. Syst. Nat. App. p. 831. 55-56. Phal. *Dictaea.* Nom. *Linn.*

Habitat in Europae populo nigra, betula alba.

61. *Ziczac*, der *Zickzackspinner* **).

Müller l. c. p. 672. no. 61. der *Zickzack.* Die *Raupe*, die *Sattel-Drachen-Kameelraupe.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 36. no. 677. das *Zickzack.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 7. Phal. *Ziczac.*

Raupe häutet sich *fünfmal.*

Frisch Inf. III. p. 4. no. 2. 1 Pl. t. 2. von der Raupe mit den *Kameelbuckeln.*

Berlin. Magaz. II. p. 410. no. 23. Phalaena *Ziczac*, das *Zickzack.*

Weißlichgrau und gelblich; an einigen Orten braun; die Unterflügel weißsgrau.

Lessers Theol. der Inf. p. 263. not. o. die *Kameelraupe*, ὁ φοβερός.

Röfels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 129. t. 20. die *Kameelraupe* mit ihrer Verwandlung.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 740. no. 29. Ph. *Ziczac*, das *Zickzack.*

Wiener

*) *Nicht abgebildet.*

**) Der Feind der Raupe ist der Ichneumon *pugillator* Linn. S. N. ed. 12. p. 936. no. 50.

Wiener Schmetterl. p. 63. R.

3) mit buckelförmigen Erhöhungen auf den Mittelringen.

No. 5. *Flechtenweidenspinnerraupe* (Salicis pentandrae): *Flechtenweidenspinner.* Ph. B. *Ziczac.*

Neuer Schaupl. der Natur, IV. p. 361. *Kameelraupe.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 418. Ph. *Ziczac,* der *Kameelraupenvogel.*

Bekm. Epit. S. L. p. 164. no. 61. Ph. *Ziczac.*

Schaeff. Icon. t. 69. f. 2 3.

Fabric. Syst. Ent. p. 573. no. 55. B. *Ziczac.* — antennis *squamatis.*

Larva solitaria, nuda, dorso gibberibus duobus, cauda rufa.

Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 40. no. 362. Ph. *Ziczac.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1371. Ph. *Ziczac.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 123. no. 29.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis exterioribus fuscis, venis plurimis, fascia circulari, et marginis interioris appendice nigricantibus; inferioris albidis, limbo lineari fusco.

Le *bois veiné.*

Long. 7. lign.

Degeer Inf. I. Mém. 3. p. 116. t. 6. f. 1 - 10.

Chenille rase, à trois tubercules charnus en forme de cornes sur le dos, qui mange les feuilles de l'Ozier et du Saule, et qu'on a nommée le *Ziczac.*

— — p. 696. t. 6. f. 7. 10.

Phalene à antennes à barbes, ſans trompe; d'un brun pâle, dont les ailes ſupérieures ſont marquées vers leur baſe d'une grande tache obſcure.

Degeer Tom. II. Part. I. p. 309. no. 1.

Phalene à antennes barbues ſans trompe; à corcelet huppé, dont les ailes ſont d'un brun clair à nuances couleur d'agathe, avec une grande plaque ovale nuancée et bordée de brun obſcur ſur les ſupérieures.

Phalene Ziczac à trois tubercules.

— No. 2. Phalene à antennes barbues ſans trompe, à corcelet un peu huppé, d'un brun obſcur, avec des rayes ondées transverſes d'un roux foncé ſur les ailes ſupérieures, et une tache couleur de ſouffre à leur origine.

Phalene Ziczac à cinq tubercules. Tab. 4. f. 17.

Chenille raſe d'un verd jaunâtre *à cinq éminences charnues* en forme de cornes ſur le dos. Tab. 4. f. 13.*)

— Ueberſ. I. 1 Quart. p. 90. t. 6. f. 1-10. die glatte *Weidenraupe* mit drey *Fleiſchhoekern* auf dem Rücken, das *Zickzack* genannt.

— — 4 Quart. p. 118. t. 6. f. 7. 10.

Ein fahlbrauner *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, deſſen Oberflügel am Hinterrande einen groſsen dunklen Fleck haben.

— II Th. 1 B. p. 222. No. 1.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Kammrücken und hellbraunen Flü-

*) Dem Anſchein nach eine bloſse Abänderung von Phal. Ziczac.

Flügeln, die eine Schattirung von Achat, und besonders die Oberflügel ein grosses schattirtes, und dunkelbraun gerändeltes Feld haben.

Das *dreyhökrige Zickzack.*

No. 2. t. 4. f. 17.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, und einem kleinen dunkelbraunen Rückenkamm. Die Oberflügel haben dunkelbraune gewässerte Queerstreifen, und bey der Wurzel einen schwefelgelben Fleck.

Das *fünfhökrichte Zickzack.*

Die *Raupe*, t. 4. f. 13. glatt gelblichgrün, mit *fünf* hörnerförmigen Fleischhökern auf dem Rücken.

62. *Dromedarius*, der *Dromedarspinner.*

Müller l. c. p. 672. no. 62. der *Dromedar.*

Berlin. Magaz. II. p. 416. no. 33.

Phalaena *Dromedaria*, der *Kameelbuckel.*

Die Oberflügel schwärzlichgraubraun mit verschiedenen, theils okergelben graubraunen, theils dunkelgrauen Flecken und Strichen; die Unterflügel weissgrau.

Wiener Schmetterl. p. 63. R. no. 7. *Birkenspinnerraupe* (Betulae albae): *Birkenspinner;* Ph. B. *Dromedarius.*

Fabric. System. Entom. App. p. 831. 55 - 56. Nom. *Linn.*

63. *Cossus*, der *Weidenbohrer* *).

Müller l. c. p. 673. no. 63. der *Holzdieb.*

 Füeßl.

*) Eins der merkwürdigsten Insekten. An der Raupe besondere Eigenschaften:

1) sie

Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 36. no. 678. Ph. *Coſſus*, der *Holzbohrer*.

Friſch Inſ. VII. p. 1. 1 Pl. t. 1.

Von der wurmförmigen Erdraupe und ihrem Papilion.

Berlin. Magaz. II. p. 410. no. 24.

Phal. *Coſſus*, der *Weidenbohrer*. Grau und weiſs marmorirt; die Unterflügel ganz grau.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 113. t. 18.

Die groſse, roth- und fleiſchfarbige *Holzraupe* mit ihrer Verwandlung.

— — p. 120. *Brummvogel.*

Stral-

1) ſie lebt ganz allein von faulem Weidenholze, und hat den widrigſten, penetranteſten Geruch, den man ſich denken kann. S. *Degeer* Ueberſ. I. 1 Quart. p. 31. 32. *Anmerk.*

2) ſie ſpritzt einen ekelhaften Saft von ſich, und beiſst ſtark mit ihren Freſszangen. *Röſel* l. c. p. 117. t. 18. f. 1. a.

3) ſie freſſen ſich unter einander ſelbſt auf, wenn ſie eingeſperrt ſind. *Röſel* l. c. p. 118.

4) ihr innerer Bau ganz bewundernswürdig. Hierüber giebt *Lyonets* eigenes anatomiſches und unnachahmliches Werk von dieſer Raupe die Erklärung. Auſser den Nerven, Luftröhren und andern Gefäſsen

allein für den Kopf	228	*Muskeln.*
für den Körper	1647	— —
für den Magenſchlund, Magen und Gedärme	2186	— —
In allen	4061	*Muskeln.*

S. *Degeer* Ueberſ. I. 1 Qu. p. 10 - 15. *Anmerk.*

5) hat verſchiedene Feinde, als die *Schlupfweſpen* und eine gewiſſe Art *Läuſe*. S. *Börners* Sammlung aus der N. G. etc. I. p. 164. 165. aus *Lyonets* Traité anatom.

6) häutet ſich auf *achtmal*, da ihr Wachsthum langſamer als bey andern Raupen iſt. S. *Stralſ. Mag.* I. p. 236.

7) das Weibchen legt mehr als 1000 Eyer. *Röſel* l. c. p. 120.

Stralſund. Magaz. I. p. 236. Phal. *Coſſus*, *Weidenholzraupe.*

Börners Samml. aus der N. G. etc. I. p. 157. Naturgeſchichte des *Weidenbohrers* (aus *Lyon.* Traité anat.).

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 33. Phal. *Coſſus*, der *Weidenbohrer.*

Wien. Schmetterl. p. 60. *N. Holzraupen*, Larvae *Lignivorae; bleichringigte Spinner;* Ph. B. *Albocinctae.*

1) mit blätterichten Fühlhörnern.

No. 1. *Kopfweidenſpinnerraupe* (Salicis pentandrae etc. *Truncatae*): *Kopfweidenſpinner.* Ph. B. *Coſſus.*

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 73. *Holzraupe; Holzdieb.* Phal. *Coſſus.*

Blumenbachs Handbuch der Nat. p. 371. no. 11. Phal. *Coſſus*, *Weidenraupe.*

Bekmanns phyſ. ökonom. Bibl. VII. p. 293. Phal. *Coſſus* *).

*) Eine ſehr gegründete Anmerkung: „Unmöglich können die Römer die häſslich ſtinkende Raupe dieſer Phaläne als einen Leckerbiſſen gegeſſen haben, ſondern ihre Coſſi müſſen Larven von Käfern oder Holzböcken (Cerambyx) geweſen ſeyn, ſo wie noch in Indien die vom Curculio Palmarum und Cerambyx cervicornis gegeſſen werden. *Plinius* Lib. 17. c. 24. (auf den ſich *Linné* beruft,) ſagt auch deutlich, daſs es Würmer aus *Eichbäumen* geweſen, in welchen man dieſe rothe Raupen nicht findet".

Herr Hofr. *Beireis* hat in einem Progr. de vſu hiſtoriae naturalis bewieſen: daſs die Coſſus der Römer die Larven des *Hirſchkäfers* oder *Feuerſchröters*, Lucanus Cervus *Linn.* geweſen ſind. S. *Leske* Ueberſ. der philoſ. Transact. II. p. 44.

Wenn alſo *Liſter* im *Goedart* p. 108. not. 1. ſagt: Hanc Erucam in Trunco Quercino recens exciſo et in partes ſerra diviſo reperi

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 460. no. 9. Phal. *Coſſus*, der *Holzbohrer*.

— deſſ. Ueberſ. der philoſ. Transact. II. p. 45. Ph. *Coſſus*.

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 63. Phal. *Coſſus*.

Onomat. hiſt. nat. P. 3. p. 444. *Coſſus*.

— — P. 6. p. 345. Ph. *Coſſus*.

Liſt. Goed. p. 105. no. 39. f. 39. *Eruca Cancer: Olens hircus.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 150. no. 2.

Phalaena grandis, alis cineraſcentibus, lineolis creberrimis nigricantibus.

— — p. 351. no. 25.

Eruca maxima ſubterranea, raris pilis obſita, ſupina parte tota, excepto capite, rubra, prona flava.

Lyonet ſur Leſſer t. 1. f. 17-22.

— Traité anatomique de la *Chenille*, qui ronge le bois de Saule. à la Haye 4. 1762 *).

Schaeff. Icon. t. 61. f. 1. 2.

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 142. no. 4. Le *Coſſus*.

Mouffet Inſ. p. 196. f. 1. *Spondyla* rubra.

Scop. Entom. carn. p. 200. no. 500. Phal. *Coſſus*.

Long. Unc. 1. et lin. 5. *Lat.* 9½.

Thorax antice linea transverſa cerea, poſtice maculis binis nigris lateralibus. *Alae poſticae* murinae, baſi albidae, obſcurioribus anaſtomo- ſanti-

reperi — ſo iſt es ganz gewiſs nicht dieſe, ſondern eine *Käferlarve* geweſen.

*) Zeugniſſe von dieſem ganz unnachahmlichen Werke ſ. *Blumenbachs* Handb. der Nat. p. 366. *Anmerk. Röſel* l. c. p. 113. *Anmerk. Degeer* Tom. II. Part. I. p. 370. Ouvrage ſurprenant, et un vrai chef-d'œuvre inimitable.

ſantibus lineis reticulatae; *anticae* baſi et medio murinae, alibi albae, utrinque lituris ſtrigisque transverſis nigris lineolisque murinis ramoſisque variegatae.

Fabric. Syſt. Ent. p. 569. no. 48. B. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

Larva ſubpiloſa incarnata, dorſo ſanguineo, capite nigro.

Pupa folliculata, antice brunnea, poſtice flava.

Mülleri Faun. Fridr. p. 40. no. 358. Phal. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1372. Phal. *Coſſus.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 102. no. 4.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis albo-cinereis, ſtriis transverſis nebuloſis nigris; abdomine annulis albis.

Le *Coſſus.*

Long. 15. lign.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 368. no. 1.

Phalene à antennes filiformes feuilletées, ſans trompe, à corcelet huppé, avec une bande noire et un collier blanc, à ailes d'un gris cendré, avec une infinité de veines transverſes noires.

Phalene *Coſſus.*

Chenille raſe luiſante d'un rouge - brun en deſſus, et blanc - jaunâtre en deſſous, avec deux plaques écailleuſes brunes ſur le premier anneau.

— Ueberſ. II Th. I B. p. 268. no. 1.

Eine *Phaläne* mit fadenförmigen geblätterten Fühlhörnern ohne Saugrüſſel, mit ſchwarzgeſtreiftem Rückenkamm und weiſſem Hals-

bande, und aſchgrauen Flügeln, mit vielen ſchwarzen Queeradern.

Die *Koſſusphaläne.*

Die *Raupe* glänzend glatt, oben braunroth, unten weiſsgelblich, mit zween hornartigen braunen Flecken auf dem erſten Ringe. — Etwas von der Oekonomie dieſer *Raupen* und von ihren *Puppen* ib. p. 270. *Anmerk.*

64. *Palpina*, der *Rüſſelſpinner* *).

Müller l. c. p. 673. no. 64. der *Sichelfühler.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 679. Phal. *Palpina*, die *Schnauzmotte.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 85. Phal. *Palpina.*

Berlin. Magaz. II. p. 422. no. 40. Phal. *Palpina*, die *Rüſſelmotte.*

Gelblichgrün, mit etwas dunklerm ſchattirt; an dem innern Rande der Oberflügel drey Spitzen, und am Munde 2 *lange Rüſſel.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 743. no. 35. Phal. *Noctua* palpina, die *Rüſſelmotte.*

Wiener Schmetterl. p. 62. G. *Scheinſpannraupen*, Larvae *Geometriformes*; *großzähnichte Spinner;* Ph. B. *Eroſae.*

No. 2. *Weißweidenſpinnerraupe* (Salicis albae): *Weißweidenſpinner:* Ph. B. *Palpina.*

Naturforſcher II. p. 14. t. 1. f. 6. *Fiſchſchwanzmotte*, *Männchen* allein mit dem *Fiſchſchwanz* (D. *Kühn*).

— — VIII. p. 107. no. 40. Phal. *Palpina.*

Das

*) Stellt ſich wie tod an. Giebt kein Gefühl des Lebens von ſich, auch wenn man ſie mit der Nadel auſſpieſst, auſser wenn man ihre *Bartſpitzen* berührt, ſo fängt ſie an zu flattern.

Das *Weibchen* grösser, grauer, und die Fühlhörner etwas dünner (*von Rottemburg*).

Fabric. Syst. Entom. p. 575. no. 64. B. *palpina.* Nom. *Linn.*

Larva solitaria, nuda, viridis; linea laterali flava.

Sepp Nederl. Inf. IV. p. 17. t. 4. De *Snuit-Vlinder* *).

Degeer Inf. I. Mém. II. p. 61. t. 4. f. 7.

— — p. 665. t. 4. f. 7. *Phalene* à antennes à barbes et à trompe; grise à ailes en toit, dont le corcelet est raboteux, et dont les barbillons longs et larges s'avancent en Museau.

— Tom. II. Part. I. p. 334. no. 2.

Phalene à antennes barbues à trompe, à corcelet huppé, à ailes en toit aigu dentelées grises, dont les barbillons de la tête s'avancent en long museau applati.

Phalene à museau.

Chenille à seize pattes rase verte, à lignes longitudinales blanches, avec du jaune citron sur le devant du corps, qui vit sur le Saule.

— *Uebers.* I B. 1 Quart. p. 52. t. 4. f. 7.

— — 4 Quart. p. 117. t. 4. f. 7.

Der graue *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel; dachförmigen Flügeln, hökrichem Bruststchilde, und langen, breiten, wie eine Schnauze vorstehenden Bartspitzen.

— II Th. 1 B. p. 242. no. 2.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, Rückenkamm, grauen gezackten, wie ein spitziges Dach stehenden Flügeln, und langen, wie ein flacher Rüssel vorstehenden Bartspitzen.

*) Die ganze Naturgeschichte vom Ey an.

Die *Rüſſelphaläne.*

Die *Raupe* ſechzehnfüſsig, grün, glatt, am Vordertheile des Körpers zitrongelb, mit weiſ-ſen längſt laufenden Linien: auf den Sohlweiden.

65. *Arenacea*, der *kapenſiſche Sandflügelſpinner.*

Müller l. c. p. 674. no. 65. der *Sandflügel.*
Catholicon A. p. 462. Phal. *arenacia.*
Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 33. t. 18. f. 1. Ph. *arenacea.*
— du Cap. de B. E.

Les taches noires ſur les ailes ſupérieures, vuës à l'aide du microſcope, paroiſſent comme des écailles dreſſées.

66. *Morio*, der *Mohrenkopfſpinner* *).

Müller l. c. p. 674. no. 66. das *Mohrenköpflein.*
Wien. Schmett. p. 50. C. *Knoſpenraupen*, Larvae *Tuberoſae; nacktflüglichte Spinner*, Phal. B. *Subnudae.*

No. I. *Lülchſpinnerraupe* (Lolii perennis): *Lülchſpinner:* Ph. B. *Morio.*

67. *Purpurea*, der *Purpurbärſpinner.*

Müller l. c. p. 674. no. 67. der *Purpurbär.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 680. der *Purpurbär.*
Wiener Schmetterl. p. 53. E. *Bärenraupen*, Larvae *Urſinae;* ädle *Spinner:* Ph. B. *nobiles.*

3) auf den einfarbigen Oberflügeln ſchwärzliche Fleckchen, Punkte und Striche.

No.

*) *Nicht abgebildet.*

No. 9. *Megerkrautſpinnerraupe* (Galii Molluginis); *Megerkrautſpinner:* B. *purpurea.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 54. no. 148. Ph. *purpurea*, der *gelbe Purpurbär;* der *gelbe S-Bär.*

— — p. 73. no. 207.

— — p. 100. no. 284.

Röſels Inſektenbeluſt. I. N. V. 2 Kl. p. 65. t. 10.

Die ſchnell kriechende hell- und rothgelbe haarige *Raupe* mit weiſsen Flecken.

Naturforſcher VI. p. 75. die ſchnell laufende rare Raupe des gelben *S-Bärs.* Ph. *purpurea.*

Im März und April unter den auf der Erde liegenden Blättern der gemeinen Klette — in ihrem Winterlager. (D. Kühn.)

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 404. Phal. *purpurea*, der *Stachelbeervogel.*

Schaeff. Icon. t. 59. f. 4. 5.

Fabric. Syſt. Ent. p. 580. no. 82. B. *purpurea.* Nom. *Linn.*

Larva hirſuta, griſea, albo-maculata: odorem *Mari veri* ſpargens.

Pupa nuda, brunnea.

Sebae Theſ. IV. t. 59. f. 4. 5.

Geoffr. Inſ. II. p. 105. no. 6.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus flavis, maculis fuſcis; inferioribus rubris, nigro-maculatis.

L' écaille mouchetée.

Larg. 23 lign. *Long.* 10 lign.

4. *Ge-*

4. *Gezüngelte Spinner mit glattem Rücken und niedergebogenen Flügeln* (B. ſpirilingues, dorſo laevi, alis deflexis).

68. *Aulica*, die *Hofdame*.

Müller l. c. p. 675. no. 68. t. 22. f. 5. die *Hofdame*. (Die Abbildung eine *Chineſiſche.*)
Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 231. p. 226-231. Phal. *aulica* *).
Naturforſcher III. p. 141. t. 1. f. 8.
— — VI. p. 115. t. 5. f. 3.
Wiener Schmetterl. p. 53. E.

2) auf den dunklen Oberflügeln bleiche Makeln (*Guttae*).

No. 6. *Tauſendblattſpinnerraupe* (Achillaeae Millefolii).

La dure-peliſſe. *Goed. Tauſendblattſpinner.* Ph. B. *aulica.*

Catholicon A. p. 651. Ph. *aulica*, die *Hofmotte*.
Fabric. Syſt. Ent. p. 576. no. 67. B. *aulica.* Nom. *Linn.*

Parva. Alis anticis *maculis quinque*, anteriore longiore.

69. *Lubricipeda*, der *Haſenſpinner* (der *Haſe*)**).

Müller l. c. p. 675. no. 69. der *Glitſchfuſs.*
Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 36. no. 981. die *Tigermotte.*
— Magaz. der Entom. II. p. 7. Ph. *Lubricipeda.*

Auf

*) Wo erwieſen wird, daſs die im *Naturforſcher* vom ſel. *Walch* und *Meineke* angebene ſeltene Phaläne keine andere als dieſe *aulica* L. ſey.

**) Weil die Raupe auſserordentlich ſchnell zu laufen pflegt.

Auf den *Zichorienblättern.* Die Raupen pflegen ſich durch die Papierdeckel auf den Gläſern durchzuarbeiten, und die Stelle vorher zu benetzen. (Chorherr *Meyer.*)

Berlin. Magaz. II. p. 412. no. 25. Ph. *lubricipeda alba*, die *Hermelinmotte* *).

Weiſs mit ſchwarzen Punkten.

— — no. 26. Phal. *lubricipeda lutea*, die *Tigermotte.*

Okergelb mit kleinen ſchwarzen Flecken.

Naturforſcher VIII. p. 104. no. 25. 26. Ph. *Lubricipeda alba et lutea* **).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 116. no. 327. Phal. *lubricipeda*, der *Glitſchfuß*, die *Hermelinmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 257. t. 46. die ſchwarz- und ſtreifhaarichte *Raupe* mit dem gelben Rückenſtreif. (Ph. lubr. *alba.*)

— — p. 260. no. 47. die weiſsliche oder hellbraune, haarichte, geknöpfelte uud geſtreifte *Raupe.*

(Dies die Phal. lubricipeda *lutea.*)

Friſch Inſ. III. p. 22. no. 11. 2 Pl. t. 8. f. 1-5. Von der *braunhaarichten Neſſel- oder Meldenraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 646. no. 11. Phal. *lubricipeda*, die *Tigermotte* (*lutea*).

Wie-

*) *Hufnagel* hält nach p. 436. L. die folgende no. 26. Ph. *lubricipeda lutea*, die *Tigermotte*, *Röſ.* II. N. V. 2. t. 47. die *Linné* für eine Spielart der erſten anſiehet, für eine beſondere Gattung.

**) Herr von *Rottemb.* iſt der Meynung des *Hufnagels* und *Röſels*, daſs es zweyerley beſondere Arten ſind, indem ſich die weiſsen allezeit mit den weiſsen, die gelben aber mit den gelben gepaart haben. Er hat ſie ferner aus den Eyern gezogen, und unter den weiſsen ſowohl, als gelben, *Männchen und Weibchen* gefunden. Das ſind entſcheidende Beweiſe.

Wiener Schmetterl. p. 54. F. *Hasenraupen*, Larvae *celeripedes*, *gelbfüßige Spinner*. Phal. B. *luteopedes*.

No. 1. *Hollunderspinnerraupe* (Sambuci nigrae).

La *roulante. Goed.*

Hollunderspinner. Ph. B. *lubricipeda.*

Glaser von schädlichen Raupen p. 35. *Schnellfüßige Raupe:* Ph. *lubricipeda.*

— Neue verbeff. Aufl. 1780 mit *illum.* K. p. 43. Ph. *lubricipeda.*

Onomatol. hist. nat. P. 6. p. 381. Phal. *lubricipeda.*

Bekm. Epit. Syst. Linn. p. 165. no. 69. Phal. *lubricipeda.*

Syftem. Nat. du Regn. anim. II. p. 145. no. 15. *Phalene blanc à points noirs.*

Act. Upsal. 1736. p. 124. no. 59.

Papilio alis depressis albis, punctis nigris, ventre quinque punctorum.

Raj. Hist. Inf. p. 196. no. 155.

Phalaena media, ex albido sublutea, alis exterioribus punctis paucis nigris στικτοῖς (*lutea*).

— — p. 195. no. 40. *Phalaena* media pulcherrima, *alba*, alis exterioribus punctis nigris perbelle στικτοῖς.

Réaum. Inf. II. t. 1. f. 7-9. La *lièvre.*

Scop. Entom. carn. p. 208. no. 513. Phal. *lubricipeda.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5.

Alba; oculis antennisque nigris, alis deflexis, anticis nigro-punctatis, abdomine supra paleaceo, punctorum nigrorum ordinibus quinis.

Fabric. Syst. Entom. p. 576. no. 68. Bomb. *Lubricipeda.* Nom. *Linn.*

Variat alarum colore et punctorum numero.

Larva

Larva piloſa, fuſca, punctis coeruleis lineaque dorſali pallida.

Pupa folliculata, coeruleſcens, ſtigmatibus rubris.

Geoffr. Inſ. II. p. 118. no. 21.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis albidis, punctis nigris, abdomine ordinibus quinque punctorum.

La *Phalene - tigre.*

Long. 9 lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 42. no. 374. Ph. *lubricipeda.* Nom. *Linn.*

-- Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1375. Nom. *Linn.*

Variat punctis ſparſis; linea punctorum interrupta transverſa, ac punctis binis, altero remotiore aegre conſpicuo.

Schaeff. Icon. t. 24. f. 8. 9.

— — t. 114. f. 2. 3.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 7. t. 3. f. 2. 3.*)

— de la *nouelle York*, du *Maryland* et de la *Virginie*, où elles engendrent deux fois l'année.

Degeer Inſ. I. Mém. 5. p. 178. t. 11. f. 1 - 8.

Chenille velue brune, à dix tubercules, qu'on trouve en automne ſur plusieurs arbres, et qu'on a nommée le *Lievre* ou *Chenille de la Vigne.*

— — p. 696. t. 11. f. 7. 8.

Phalene à antennes à barbes, ſans trompe, à ailes ou blanches, ou d'un jaune clair, à points noirs.

Degeer

*) Dies ſcheinen doch verſchiedene, obgleich ähnliche Arten zu ſeyn: die eine mit weiſsgraulichen, etwas gelblichen, ſchwarzpunktirten Ober- und Unterflügeln; die andere mit ſolchen Ober- aber ganz okergelben Unterflügeln; auf jedem der letztern drey, im Dreyeck ſtehende ſchwarze Punkte.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 304. no. 3.

Phalene à antennes barbues noires ſans trompe, à ailes en toit blanches ou d'un jaune clair, picquées de points noirs, dont le ventre eſt jaune à cinq rangs de points noirs.

Phalene *lievre.*

Chenille très-velue, à tubercules brunes et rouſſes, dont les poils ſont de la même couleur.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. 5te Abh. p. 132. t. 11. f. 1-8.

Die braune rauche *Raupe*, mit zehn Buckeln; im Herbſt auf allerley Bäumen: der *Haſe*, oder die Weinraupe.

— — 4 Quart. p. 118. t. 11. f. 7. 8.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel: entweder mit weiſſen, oder mit hellgelben ſchwarzpunktirten Flügeln.

— — II Th. I B. p. 218. no. 3.

Die ohnzüngige *Phaläne* mit ſchwarzen bärtigen Fühlhörnern, und dachförmigen, weiſſen oder hellgelben, mit ſchwarzen Punkten geſprenkelten Flügeln; gelbem Körper mit fünf Reihen ſchwarzer Punkte.

Der *Haſe.*

Die *Raupe* haaricht, mit braunen und fuchſichten Knöpfen, deren Haare eben ſolche Farbe haben.

70. **Lota**, der *Schwarzpunkt.*

Müller l. c. p. 675. no. 70. der *Schwarzpunkt.*

Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 9. Phal. *Lota.*

Die ſchwarzgraue *Raupe* mit weiſs- und ſchwarzen Streifen, und weiſslichen Pünktgen.

Wien. Schmetterl. p. 76. L. *Spreckenraupen*, Larvae *Albopunctatae;* geradgeſtrichte *Eulen*, Phalaenae *Noctuae* Rectolineatae.

2) Die

2) Die Raupen bräunlicht.

No. 6. *Wasserweideneulenraupe* (Salicis pentandrae), *Wasserweideneule.* Ph. N. *Lota.*

71. *Russula*, der *Rothrand.*

Müller l. c. p. 676. no. 71. der *Rothband.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 36. no. 682. Phal. *Russula*, der *Rothrand.*

Wien. Schmett. p. 54. E. No. 13. *Apostemkrautspinnerraupe* (Scabiosae arvensis); *Apostemkrautspinner.* Ph. B. *Russulae.*

Raj. Hist. Inf. p. 228. no. 75.

Phalaena minor, corpore crasso, e fusco et rubro diversicolore; alis exterioribus obscure rufis seu pullis, duobus maculis nigris notatis, interioribus e pullo et rubro variis.

Linn. Syst. Nat. ed. 10. p. 520. no. 136. Phal. *Vulpinaria.*

— Faun. Suec. ed. 2. no. 1135. Phal. *Sannio.*

Syst. Natur. du Regn. anim. II. p. 149. no. 28. *Phalene du Gramen ou Chiendent.*

Act. Upsal. 1736. p. 23. no. 41.

Papilio alis planis fulvis, macula rubente.

Schaeff. Icon. t. 83. f. 4. 5.

Fabric. Syst. Ent. p. 579. no. 80. B. *Russula.* N. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 129. no. 39.

Phalaena pectinicornis, spirilinguis, alis deflexis, pallido-luteis, limbo roseo, superioribus macula, inferioribus fascia duplici fusca.

La *bordure ensanglantée.*

Long. 10 lign.

Scop. Entom. carn. p. 211. no. 520. Phal. *Sannio.*

Alae omnes macula media obscuriore; anticae subtus, posticae supra fascia fusca.

4. *Variat.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1389. Phal. *Sannio.* Nom. *Linn.*

β. Phalaena *Russula.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 48. no. 130. Phal. *Russula β.* der *Rothrand.* p. 67. no. 191.

Kleem. Beytr. I. p. 172. t. 20. die kleine überaus-schnell laufende, mit braunrothen Haaren, einem gelben Rückenstreif und schwarzen als Kupfer glänzenden Kopfe versehene Raupe.

Geoffr. II. p. 129. no. 39. N. B.

Il y en a une variété plus petite, qui n'a que six lignes de long. Elle est beaucoup plus jaune, de couleur de Tabac d'Espagne, et ressemble tout-à-fait à l'autre, mais ses antennes sont moins barbues.

72. *Rufina*, der *Rothflügel.*

Müller l. c. p. 676. no. 72. der *Rothflügel.*

Wien. Schmetterl. p. 85. R. *Halsschildraupen*, Larvae *Scutellatae*, *röthlichbraune Eulen*, Ph. *Noctuae Badiae.*

No. 9. *Loheichenenlenraupe* (Quercus Roboris *Tuberiferae*). *Loheicheneule*, Ph. *Noctua* Rufina.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1142. Phal. *Helvola.*

73. *Graminis*, der *Grasspinner.*

Müller l. c. p. 676. no. 53. der *Grasmäher.*

Frisch. Inf. X. p. 24. no. 21. 3 Pl. t. 21. f. 1. 2. 3. Von einer grauen *Erdraupe*, die nur vier Rückenknöpfe und den Seitenspiegel hat.

Allgem. Magaz. der Natur etc. IX. p. 328. §. 3. *Wiesenlarven; Wiesenwürmer* *).

Ab-

*) Ihretwegen thörichte Gottesdienste gefeyert: zu Anfang des Som-

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. IV. p. 51. Abr. *Becks* Beschr. der *Grasraupen* t. 2. f. A-E.
— — XII. p. 185.
— — XX. p. 48. *Grasraupen.*
Wiener Schmetterl. p. 81. O. *Breitstreifraupen*, Larvae *Largostriatae*, *jaspisfarbige Eulen.* Phal. *Noctuae* venosae.

2) Graulicht mit weissen Linien.

No. 3. *Futtergraseulenraupe* (Poae pratensis); *Futtergraseule.* Phal. *Noctua* Graminis.

Naturforscher VIII. p. 105. no. 27.

Diese Ph. *graminis* (*Berl. Magaz.* II. p. 412. no. 27. Ph. *graminis*, der *Grasmäher*) ist nicht *Linn.* Ph. *gram.* sondern dessen Ph. Noct. *Mi.* No. 106.

Fischers N. G. von Livland, p. 152. no. 358. der *Grasmäher.*
Onomat. hist. nat. P. 6. p. 373. Ph. *graminis*, der *schädliche Grasraupenvogel.*
Linn. Faun. Suec. ed. 1. no. 826. Phal. *calamitosa.*
Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 73. Phal. *graminis.*
— Physik. ökon. Bibl. II. p. 313. Phal. *graminis.* Die *Krähen* (Cornix) verzehren die Raupen. S. *Hannov. Magaz.* 1767. St. 39.
Syst. Nat. du Regn. anim. II. p. 146. no. 17. *Phalene* de la Chenille, que l'on trouve sur la Tithymale.
Act. Upsal. 1736. p. 25. n. 75.

Sommers Buss- und Bettage, um Iohannis Dankfeste, da sie weg waren. Das war ihre Verwandlungszeit. S. *Neue Mannichfalt.* I Jahrg. p. 303-316. 319-334. vom *Aberglauben* in der Naturgeschichte. *Martini* Naturlex. I. p. 98.

Papilio alis depreſſis fuſcis, faſcia pallida longitudinali ramoſa, ſubtus puncto nigro notatis.

Cathol. G. p. 235. *Chenille* du *Gramen*, die *Grasraupe;* der *Grasmäher:* Ph. *Graminis.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 228. no. 104.

Phalaena e minoribus majuscula, alis oblongis, exterioribus e cinereo albicantibus, nigris punctis et maculis variis, et linea alba tridente in medio.

Fabric. Syſt. entom. p. 586. no. 106. B. *Graminis.* Nom. *Linn.*

Otto *Fabric.* Faun. Groenland. *) Hafn. et Lipſ. 8. 1780. p. 193. no. 144. Phal. *Graminis.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 42. no. 375. Phal. *graminis.* ſpirilinguis, alis depreſſis griſeis; *linea ramoſa lunulaque glaucis.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1376. Phal. *graminis.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. II. Part I. p. 340. no. 5. *Phalene* à antennes barbues à trompe, à ailes rabatues d'un gris brun, avec une raye longitudinale branchue blancheâtre, et trois taches jaunâtres ſur les ſupérieures.

Phalene de l'herbe.

Chenille

*) Magna copia 1778 omne gramen conſumſit in ſinu dicto *Angmakſivik* e regione boreali Coloniae Friderichshaab. Omni conſumto, ſe in mare et aquas propinquas plures praecipitarunt. *Groenlandi* illas faſtidientes, dum tentoria illorum intrant metamorphoſeos gratia, pellere conantur incendio graminis, illis nulli uſui.

Eines der herrlichſten Werke zur Naturgeſchichte, worinn das *Wurmgeſchlecht* vorzüglich bereichert iſt.

Chenille rafe d'un gris obfcur, avec une raye jaune de chaque côté du corps et une ligne jaune le long du dos.

Degeer Ueberf. I. 1 Qu. p. 42. *Anm.* Phal. *graminis.*

— — II Th. 1 B. p. 39. *Anm.* Phal *graminis.*

— — — p. 247. no. 5.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, einem Saugrüffel, und graubraunen herabhangenden Flügeln mit einer weifslichen längftgehenden äftigen Streife, und drey gelblichen Flecken auf den Oberflügeln.

Die *Grasmotte.*

Die *Raupe* glatt, dunkelgrau, mit einer gelben Streife auf jeder Seite, und einer gelben längft dem Rücken gehenden Linie.

74. *Luforia*, die *Spielart.*

Müller l. c. p. 676. no. 74. die *Spielart.*

Wiener Schmetterl. p. 94. Aa. *Schlangenraupen*, Larvae *Serpentinae*, *fpannerförmige Eulen*; Ph. *Noctuae* Geometriformes.

1) Mit einer fchwärzlichen unvollkommenen Mondmakel auf den Oberflügeln.

a) Mit einigem Anfange von allen Bauchfüfsen.

No. 2. *Lekritzwickeneulenraupe* (Aftragali Glycyphylli); *Lekritzwickeneule.* Phal. *Noctua* Luforia.

75. *Grammica*, der *Streifflügel.*

Müller l. c. p. 677. no. 75. der *Streifflügel.*

Füeßl. fchweiz. Inf. p. 36. no. 683. Phal. *grammica.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 23. no. 84. Ph. *grammica*, der *Streifflügel.*

Berlin. Magaz. II. p. 418. no. 34. Phal. *grammica*, das *Eichhörnchen.*

Die Oberflügel gelb mit ſchwarzen Streifen der Länge nach. Die Unterflügel oraniengelb mit einem breiten ſchwarzen Rande.

Naturforſcher VIII. p. 106. no. 34. Ph. *grammica.* Die *Weibchen ſehr rar.*

Röſels Inſektenbeluſt. IV. p. 150. t. 21. f. a b c d. das *Männchen.*

Die kleine ſchwarzbraune und kurzhaarichte Raupe, mit dem rothgelben Rückenſtreif, und einer weiſſen Einfaſſung an jeder Seite.

Wiener Schmetterl. p. 54. E. no. 12. *Schwingelſpinnerraupe* (Feſtucae duriuſculae); *Schwingelſpinner*, Ph. B. *Grammica.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 169. n. 28.

Phalaena media pulla, corpore et alis valde longis et anguſtis.

— — p. 280. no. 13. *Eruca* coeruleo-viridis glabra, linea alba in medio dorſo a capite ad caudam ſecundum longitudinem decurrente, lutea in utroque latere hinc inde ſupra pedes.

Fabric. Syſt. Ent. p. 579. no. 81. B. *grammica.* Nom. *Linn.*

Larva fuſca, linea dorſali alba, pedibus rufis.

Pupa nuda, brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 115. no. 17.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis, ſuperioribus faſciis pallido-flavis nigrisque alternis longitudinalibus, inferioribus croceis faſcia marginali nigra.

La *Phalene chouette.*

Long. 5-7 lign.

Schaeff. Icon. t. 92. f. 2.

β) Pha-

β) Phalaena ſtriata.
Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 502. no. 31.

76. *Cribrum*, der *Siebflügel.*

Müller l. c. p. 677. no. 76. der *Siebflügel.*
Wien. Schmett. p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen*, Phal. *Noctuae* Tineiformes.
No. 8. Unbekannte Raupe, *Weiſſe ſchwarzpunktirte Eule.* Ph. *Noctua* Cribrum.
Le *Manteau à points. Geoffr.*
Fiſchers N. G. von Livland, p. 152. no. 359. das *Sieb.*
Fabric. Syſt. Ent. p. 588. no. 112. B. *Cribrum.* Nom. *Linn.* Anus flaveſcens.
Geoffr. Inſ. II. p. 190. no. 21.
Taenia alis argenteis, corpori circumvolutis, faſcia duplici transverſa punctorum nigrorum.
Le *Manteau à points.*
Long. 8 lign.
Réaum. I. t. 38. f. 7. 8. 9.

5. *Kammſauger* (*Bombyces* ſpirilingues, dorſo criſtato, alis deflexis).

77. *Celſia*, das *Roßkreuz.*

Müller l. c. p. 677. no. 77. das *Roßkreuz.*
Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 247.
Phal. *Celſia*, *Roßkreuz.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1141. t. 2. f. 1141. (umſtändl. Beſchr.)
Syſt. Nat. du Regn. anim. II. p. 143. no. 8. *Phalaena* pectinicornis, alis ſupra viridibus, faſcia transverſali ſinuato-dentata glauca.

78. *Libatrix*, der *Näſcher* *).

Müller l. c. p. 677. no. 78. der *Näſcher.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 684. Die *Sturmhaube.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 10. Phal. *Libatrix.* (Einige Merkwürdigkeiten bey der Verwandlung. Chorh. *Meyer.*) **)

Berlin. Magaz. II. p. 414. no. 28. Phal. *Libatrix*, die *Sturmhaube.*

Theils oraniengelb, theils braunroth mit 2 weiſſen Queerſtreifen, und ſtark ausgezakten und ausgeſchwungenen Flügeln.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 31. Phal. *Libatrix*, die *Sturmhaube.*

Wien. Schmetterl. p. 62. Q. No. 1. *Dotterweidenſpinnerraupe* (Salicis vitellinae); *Dotterweidenſpinner.* Ph. B. *Libatrix.*

Sulzers Geſchichte der Inſ. p. 160. t. 21. f. 7. Ph. *Libatrix*, die *Sturmhaube.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 10. *Dotterweidenſpinner.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 78. Phal. *Libatrix.*

Syſt. Nat. du Regn. anim. II. p. 148. no. 24. Phalene *Libatrix.*

Act. Vpſal. 1736. p. 25. no. 63.

Papilio alis depreſſis eroſis, croceo-rufis.

Schaeff. Icon. t. 124. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 209. no. 516. Phal. *Libatrix.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5.

Alae *anticae* cervinae, baſi maculis 4 ochreaceis: media longa prismatica: faſciis binis line-aribus

*) Wohnet gern in *Kellern* und dunklen Speiſekammern.

**) Hält die *Röſelſche*, IV. t. 20, welche der Staatsr. *Müller* modeſtam nennet, mit dieſer Libatrix für einerley.

aribus pallidioribus: poſtica duplici, punctis duobus albis, margine externo denticulato, ita ut diſtantia apicis a primo dente eadem ſit, quae ab eodem dente ad angulum poſticum.

Fabric. Syſt. Ent. p. 604. no. 62. *Noctua* Libatrix. Nom. *Linn.*

Larva nuda, viridis, flavo-annulata; lineis tribus fuſcis ſtigmatibusque rubris.

Pupa folliculata, nigra.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 183. no. 2.

Phalaena media, domeſtica, alis exterioribus rubro, rufo, cinereo et albicante colore variis, cum transverſa linea albicante, imo margine laciniato.

Poda Muſ. graec. p. 92. t. 2. f. 9. Phal. *Salictaria.*

Mülleri Faun. Frider. p. 42. no. 377. Ph. *Libatrix.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1377. Phal. *Libatrix.*

— Strigis obliquis tribus, poſtica pallida — cet. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 121. no. 26.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis cinereoflavoque rufis, margine laceris.

La *Découpure.*

Long. 10 lign.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 332. no. 1. t. 5. f. 5.

Phalene à antennes barbues ſans trompe, à corcelet huppé, à ailes découpées voutées griſes nuancées d'orange, avec deux lignes blancheatres, et deux points blancs.

Phalene friande.

Chenille à 16 pattes, raſe, veloutée, verte, à deux lignes longitudinales noires bordées de blanc. f. 3.

Degeer Inſ. *Ueberſ.* II Th. I B. p. 240. no. 1. t. 5. f. 5. Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, mit einem Kamm auf dem Bruſtſchilde, mit ausgezackten, gewölbten, grauen, orangegelbſchattirten, mit zwo weiſslichen Linien, und zween weiſſen Punkten bezeichneten Flügeln.

Der *Näſcher.*

Die *Raupe* ſechzehnfüſsig, glatt, ſammetgrün, mit zwo längſtherunterlaufenden ſchwarzen, weiſsgerändelten Linien. f. 3.

79. *Capucina,* der *Kapuzinerſpinner* *).

Müller l. c. p. 678. no. 79. der *Kapuziner.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 685. der *Kapuziner.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 742. no. 32. Phal. *Capucina,* die *Kapuzinermotte.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 43. die *Kapuzinermotte.*

Wien. Schmetterl. p. 63. R.

1) Die Raupen unrichtige Höker, vornämlich auf dem eilften Ringe.

No. 4. *Bachweidenſpinnerraupe* (Salicis vitellinae); *Bachweidenſpinner.* Ph. B. *Capucina.*

Fabric. Syſt. Entom. p. 575. no. 65. B. *Capucina.* Nom. *Linn.*

80. *Camelina*, der *Kameelſpinner.*

Müller l. c. p. 678. no. 80. t. 22. f. 6. der *Kronenvogel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 686. der *Flügelzehe.* *Füeßl.*

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 11. Phal. *Camelina.*

Häufig und allemal auf *Erlen.* Die *seltsame Stellung* s. *Réaum.* II. t. 20. f. 10. 11. *Sepp* I. t. 1. f. 2. 7. 10. hat *Rösel* nicht angemerkt. (Chorherr *Meyer.*)

Berlin. Magaz. II. p. 414. no. 29. Phal. *Camelina*, die *Kameelmotte.*

Gelbbraun, mit stark ausgezackten Oberflügeln, in deren Mitte ein weisser Punkt und eine Kappe über dem Kopfe; ingleichen eine Spitze am Rande der Oberflügel.

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 164. t. 28.

Die meergrüne, glatte, mit einzelnen Härchen besetzte, und auf dem hintersten Absatze mit zwey rothen Stacheln versehene *Raupe.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 389. no. 5. Phal. *Camelina*, die *Kameelmotte.*

Wien. Schmetterl. p. 63. R. no. 3. *Erlenspinnerraupe* (Betulae Alni); *Erlenspinner.* Phal. *Camelina.*

La Crête de Coq. *Geoffr.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 335. Phal. *Camelina*, der *Kameelvogel.*

Fabric. Syst. Entom. p. 575. no. 66. B. *Camelina.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, virescens, corniculis duobus caudalibus, stigmatibus purpureis.

Pupa folliculata, antice brunnea, postice fusca.

Geoffr. Inf. II. p. 111. no. 12. *Phalaena* pectinicornis elinguis, pallido-rufa, crista dorsali nigra.

La *crête de coq.*

Long. 8 lign.

Mül-

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1378. Phal. *Camelina.* Nom. *Linn.*

Sepp Nederl. Inf. IV. p. 1. t. 1. f. 1-10. *Kroon-Vogeltje.*

81. Oo, das *doppelte O.*

Müller l. c. p. 678. no. 81. die *Nullnull.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 36. no. 687. das *doppelte O.*

Berlin. Mag. II. p. 414. no. 30. Phal. *O o*, das *doppelte O.*

Weifsgrau, mit röthlichen Zeichnungen auf den Oberflügeln, welche unter andern zwey *O* vorftellen.

Maders (Kleemanns) Raupenkalender, p. 17. no. 25. Phal. O o, das *doppelte O.*

Röfels Infektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 311. t. 63.

Die glatte, braunrothe, mit befondern weiffen Flecken gezierte, fchwarzköpfige *Raupe.*

Gleditfch Forftwiff. I. p. 647. no. 12. Phal. Oo, das *doppelte O.*

Wiener Schmetterl. p. 87. T. *Mordraupen*, Larvae *Larvicidae; gewäfferte Eulen.* Phal. *Noctuae* undatae.

1) Die Oberflügel gelblicht.

No. 1. *Viereicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Viereicheneule.* Phal. *Noctua* O o.

Onomat. hift. nat. P. 6. p. 390. Phal. O o.

Fabric. Syft. Ent. p. 575. no. 63. B. *Oo.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, rubra; punctis lineisque albis, dorfali interrupta, capite nigro.

Pupa nuda rubra, ftigmatibus albis.

Unab-

Unabgebildete Spinner.

(Bombyces.)

1. No. 60. *Dictaea.*
2. No. 66. *Morio.*
3. No. 79. *Capucina.*

Neue Arten von Spinnern *).

Phal. *Bombyces.*

1. Ph. BOMB. *Diaphana*, der *durchſichtige Spinner.*

Seligm. ausl. Vögel, II B. t. 70.

Corpus craſſum; colore glauco, ſtriga longitudinali, quatuorque transverſis flavis, tribusque alternantibus atris. Abdomine binis flavis lunulis lateralibus. Alae *hyalinae*, Tipuliformes, vero ſenſu *alepidopterae.*

2. *Porcellanea*, der *Porzellanſpinner.*

Berlin. Magaz. II. p. 420. no. 38.

Albo-griſea; margine interiore toto, anteriore ſemifuſco.

3. *Veſtigialis*, der *Erdläufer.*

Berlin. Magaz. II. p. 422. no. 42.

Albogriſea; alis *anticis* fuſco-maculatis; *poſticis* albogriſeis concoloribus.

Naturforſcher VIII. p. 107. no. 43.

Ph. *Veſtigialis*. Statura Phal. Chryſorrhoeae (vom Hrn. *von Rottemburg* umſtändlicher beſchrieben).

4. *Pu-*

*) Ich habe bloſs die allgemeine *Klaſſe*: Spinner oder Bombyx, beybehalten, ohne mich auf die beſondern Eintheilungen des *Linné* einzulaſſen.

4. *Putris*, der *Einſiedler.*

Berlin. Magaz. II. p. 424. no. 44.
Obſcure griſea, virideſcens, fuſco-ſparſim maculata.

Naturforſcher VIII. p. 108. Ph. *Putris.*
Nicht *Putris* L. (vom Hn. v. *Rottemb.* umſtändlich beſchrieben).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 651. no. 26. Phal. *Putris*, der *Einſiedler.*

5. *Clavis*, die *Nagelmotte.*

Berlin. Magaz. II. p. 426. no. 47.
Griſea; anticarum macula fuſca *Reni*-ſ. *Claviformi.*

Naturforſcher VIII. p. 109. no. 47. Phal. *Clavis.*
(Hr. *von Rottemb.* macht es wahrſcheinlich, daſs dieſe Clavis eine beſondere Gattung, und nicht das Weibchen von der in dem folgenden von *Hufnagel* angeführten Phal. *Clavus* oder *Exclamationis* Linn. ſey.)

6. *Gibboſa*, der *Buckelſpinner.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 39. no. 355.
Criſtata; alis griſeis nigro-punctatis, ſtriga maculisque flavis; *tergo* tuberculis duobus.

— Zool. Dan. Prodr. p. 119. no. 1374. Ph. *gibboſa.*
In *Pruno ſpinoſo.*

7. *L nigrum*, der *ſchwarze L-Spinner.*

Mülleri Faun. Frid. p. 40. no. 360. Elinguis, criſtata: *alis* candido-pellucidis: primoribus littera *L nigra.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1373. Ph. *L nigrum.*
In *pratis.*

8. *Mo-*

8. *Modesta*, der *sanftfarbige Spinner.*

Mülleri Faun. Frid. p. 42. no. 378.
Alis erosis flavo-rubentibus; strigis obliquis tribus, postica pallida, punctisque duobus albis. In *Salice.*

— Zool. Dan. Pr. p. 119. no. 1377.*)

Rösels Insektenbel. IV. p. 141. t. 20. die schöne gelblichtgrüne *Raupe* des Weidenbaums.

9. *Similis*, der *Schwan.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 35. no. 662.
Auf den *Schwarzdornen* und Obstbäumen ziemlich gemein; lebt niemals gesellschaftlich unter einem Gespinnst, wie die Chrysorrhoea und andere.

— Magaz. der Entomol. I. p. 287. Phal. *Similis*, der *Schwan.*
Die Raupen *häuten* sich öfter als irgend eine bekannte Art. (Chorh. *Meyer.*)

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 101. no. 287. p. 111. no. 310. Phal. *Similis*, der *Schwan.*

Frisch Ins. III. t. 1? **).

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 134. t. 21. die kleine, haarige, schwarze, rothgestreifte und weissgefleckte *Raupe.*

10. *Sphinx*, der *Storch.*

Berlin. Magaz. III. p. 400. no. 75. Schwärzlich grau, flammicht gezeichnet.

Na-

*) Dem Anschein nach seine Meynung geändert, und mit *Libatrix* L. für einerley gehalten.

**) Dies Zitatum hat Hr. *Füeßl.* nur fragweise gesetzt, und es trifft auch nicht zu.

Naturforscher IX. p. 133. no. 75. Ph. *Sphinx* — keine Noctua, sondern ein *Bombyx.*

Röfels Infektenbel. III. p. 239. t. 40. f. 1-5. Die auf Eichen und Linden fich aufhaltende blafsgrüne *Raupe*, mit vier gelben, und einer weifsen Linie, an welcher der letzte Abfatz mehr als die übrigen erhöhet ift.

11. *Auftralafiae*, der *neuholländifche grofsbärtige Spinner.*

Fabric. Syft. Ent. p. 562. no. 22. Bomb. *Auftralafiae.*

Alis reverfis *helvolis:* pofticis bafi fubtus ferrugineis.

Palpi magni, valde compreffi, obtufiffimi.

12. *Stigma*, der *füdamerikanifche weifspunktirte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 563. no. 25. B. *Stigma.*

Alis reverfis, teftaceis, fufco-irroratis, *punctoque centrali niveo.*

13. *Amphimene*, der *füdländifche braunpunktirte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 563. no. 27. B. *Amphimene.* — In *Terra del Fuego.*

Alis fubreverfis, integris, cinerafcentibus; ftrigis duabus nigris; *anticis puncto medio fulvo.*

14. *Ocularia*, der *füdamerikanifche Augenfpinner.*

Fabric. S. E. p. 564. no. 29. B. *ocularia. Magna.*

Alis fubreverfis albis: *punctis ocellaribus* nigris numerofis.

15. *Hibi-*

15. *Hibiſci*, der *oſtindianiſche Ibiſch-Ketmiaſpinner.*

Fabric. S. E. p. 564. no. 30. B. *Hibiſci.*

Alis ſubreverſis concoloribus luteis; anticis ſtrigis duabus, poſticis unica.

16. *Ceraſi*, der *engliſche Kirſchenſpinner.*

Fabric. S. E. p. 564. no. 31. B. *Ceraſi.*

Alis reverſis luteis, ſtrigis duabus punctoque medio fuſcis poſticoque albo.

17. *Lagopus*, der *chineſiſche ſtreckfüßige Spinner.*

Fabric. S. E. p. 568. no. 45. B. *Lagopus.*

Alis deflexis flaveſcentibus; atomis ſtrigisque duabus fuſcis; *pedibus anticis porrectis* hirſutiſſimis.

18. *Imperialis*, der *indianiſche Kaiſerſpinner.*

Fabric. S. E. p. 569. no. 46. B. *Imperialis.*

Alis flavis fuſco-maculatis, omnibus macula ſubocellari ferruginea.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 17. t. 9. f. 1. 2.

Il déploye ſes ailes environ *quatre pouces et trois quarts.* — de la *Nouvelle York.* Ils engendrent *deux fois* l'anuée: en Juin et Septembre.

19. *Craſſicornis*, der *indianiſche dickhornichte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 569. no. 47. B. *Craſſicornis.*

Alis deflexis cinereis: atomis ſtrigisque undatis fuſcis.

Antennis pectinatis, flexuoſis, *baſi craſſiſſimis*, apice tenuioribus.

20. *Dione*, die *amerikaniſche Dione.*

Fabric. S. E. p. 572. no. 54. B. *Dione.*

Alis deflexis albis, nigro-ſtriatis, punctatisque, ſubtus margine purpureo.

21. *Alphaea*, die *neuholländiſche braune Punktſtreife.*

Fabric. S. E. p. 573. no. 57. B. *Alphaea.*

Alis deflexis ferrugineis; puncto medio albo ſtrigaque punctata fuſca.

22. *Flava*, der *indianiſche Gelbling.*

Fabric. S. E. p. 574. no. 59. B. *flava.*

Alis deflexis *flaviſſimis;* apice punctis tribus nigris.

23. *Lutea*, der *neuholländiſche leimfarbige Spinner.*

Fabric. S. E. p. 574. no. 60. B. *Lutea.*

Alis deflexis, flaviſſimis, immaculatis.

24. *Laeta*, der *ſchwediſche Weiſsling.*

Fabric. S. E. p. 576. no. 69. B. *Laeta.*

Alis deflexis; *anticis niveis*, faſcia lata nigra; antennis ſimplicibus.

25. *Milhauſeri*, der *dresdenſche braungefleckte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 70. B. *Milhauſeri.*

Alis deflexis, canis; *maculis duabus dorſalibus fuſcis;* antennis apice ſetaceis.

Larva viridis, *ſpinis dorſalibus furcatis;* pedibus ſubcaudalibus nullis.

Pupa folliculata, brunnea, antice acuminato-emarginata.

26. *Popularis*, der *deutſche Landmann.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 71. B. *popularis.*

Alis deflexis, fuſcis, albo-ſtriatis; *ſtigmatibus albis*, *pupilla brunnea.*

27. *Stri-*

27. *Strigula*, der *dresdensche Streifling.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 72. B. *Strigula.*

Alis deflexis; *anticis* griseis apice albo-nigroque striatis.

28. *V nigrum*, das *sächsische schwarze V.*

Fabric. S. E. p. 577. no. 73. B. *V nigrum.* In Saxoniae *tilia.*

Alis deflexis, albis, *V nigro* notatis.

Larva fasciculata; fasciculis dorsalibus octo, anticis posticisque albis, collari hirsutissimo.

Pupa viridis, macula thoracis nigra.

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 86. no. 3. Bomb. *V nigrum.*

Naturforscher II. p. 16. §. 6. no. 1. t. 1. f. 1. (D. *Kühn.*)

Eine *weißgrüne Phaläne* zu Ende des Junius, aus einer weissbuschichten Raupe auf den *Linden.* Sie unterscheidet sich besonders durch *zwey schwarze Haken* auf den Oberflügeln, und durch die schwarzgefleckten Füsse.

— XII. p. 56. (*Walch*) *Raupe* t. 1. f. 8. *Puppe* t. 1. f. 9. 10.

29. *Tibialis*, der *neuholländische gelbschenklichte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 578. no. 76. B. *tibialis.*

Alis deflexis niveis; *tibiis anticis flavescentibus*, nigro-punctatis.

30. *Obsoleta*, der *neuholländische verwischte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 579. no. 77. B. *obsoleta.*

Alis deflexis, albidis; costa palpisque ferrugineis.

31. *Corones*, der *neuholländische Blutmund.*
Fabric. S. E. p. 579. no. 78. B. *Corones.*
Alis deflexis; *anticis* cinereis, *posticis* niveis — *ore subsanguineo.*

32. *Festiva*, der *amerikanische Staatsspinner.*
Fabric. S. E. p. 579. no. 79. B. *Festiva.*
Alis deflexis, flavescentibus, basi coeruleo-maculatis, apice nigro-punctatis.

33. *Vidua*, die *englische Wittwe.*
Fabric. S. E. p. 580. no. 84. B. *Vidua.*
Alis deflexis fuscis; *anticis* cinereo-subfasciatis; *posticis* macula baseos fasciaque rufis.

34. *Deflorata*, die *amerikanische Schwarzstirn.*
Fabric. S. E. p. 582. no. 89. B. *deflorata.*
Alis deflexis, albis, nigro-maculatis; *posticis* subtus atris, fasciis albis.

35. *Crotalariae*, der *ostindische Klapperschotenspinner.*
Fabric. S. E. p. 583. no. 90. B. *Crotalariae.*
Alis incumbentibus; *anticis* purpurascentibus, maculis ocellaribus atris; *posticis* rubris, nigro-maculatis.

36. *Ricini*, der *ostindische Wunderbaumspinner.*
Fabric. S. E. p. 583. no. 91. B. *Ricini.*
Alis incumbentibus, obscuris, maculis numerosis subocellaribus, fuscis, posticis rubris, nigro-maculatis.

37. *Credula*, der *amerikanische Blutfleck.*
Fabric. S. E. p. 584. no. 94. B. *Credula.*

Alis

Alis incumbentibus, corporeque atris, albo-punctatis. — *Macula oblonga sanguinea* punctis duobus nigris ad basin alae *anticae* *).

38. *Jesuita*, der *indianische Jesuit.*

Fabric. S. E. p. 586. no. 104. B. *Jesuita.*

Alis incumbentibus atris, stria fulva.

39. *Vestita*, das *sächsische Haarkleid.*

Fabric. S. E. p. 586. no. 105. B. *vestita.*

Alis incumbentibus nigris immaculatis, *abdomine subtus villoso*, albo. In *Saxoniae Corylo.*

Larva grisea, nigro-punctata, degit intra cylindrum e graminibus aridis filo conuexis constructum, quem foliis adfigit.

40. *Gloriosae*, der *ostindische Prachtlilienspinner.*

Fabric. S. E. p. 587. no. 40. B. *Gloriosae.*

Alis incumbentibus atris, rubro-flavoque variegatis; *posticis* nigris, margine flavo.

41. *Crini*, der *ostindische Liliennarcissenspinner.*

Fabric. S. E. p. 587. no. 108. B. *Crini.*

Alis incumbentibus atris, ante marginem subferrugineis; posticis albis.

42. *Rosea*, der *rosenflüglichte Spinner.*

Fabric. S. E. p. 587. no. 109. B. *rosea.*

 Alis

*) Hier folgt im *Fabric.* no. 100. B. *Pylotis*, wobey Drury II. t. 6. f. 3. angeführt, und ihr der Name Phal. *Pylotis* beygelegt ist; allein im *Drury* selbst ist sie Phal. *Noctua Astrea* genannt: mithin scheint es wohl eine Verwechselung zu seyn, da kurz vorher t. 5. f. 3. Phal. *Bomb. Pylotis* stehet, den *Fabric.* aber schon unter seinen Zygaenis p. 554. no. 19. aufgestellet hat. Denn

Alis incumbentibus *roſeis*, ſtrigis tribus fuſcis, ſecunda undata, tertia punctata.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 227. no. 86.

Phalaena minor, alis velut miniaceis, punctis et lineolis nigris in medio notatis.

Geoffr. Inſ. II. p. 121. no. 25.

Phalaena pectinicornis, elinguis, alis deflexis, roſeis; ſuperioribus punctorum arcuumque nigrorum ordine duplici.

La *Roſette*.

Long. 6 lign.

Forſteri Nov. ſpec. Inſ. p. 75. no. 75. Phal. GEOMETRA *) *Miniata*.

Seticornis, alis rotundatis, *omnibus pallide miniatis*, anticis linea undata ad baſin, characteribus in medio et punctis verſus marginem poſticum nigris.

In *Quercetis Angliae*.

Harris Inſ. t. 30. f. p.

Wiener Schmetterl. p. 68. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen*, Ph. *Noct. tineiformes*.

No. 10. Unbekannte *Raupe; fleiſchfarbene rothgerändelte Eule*, Ph. *Noct. Rubicunda*.

43. *Sulphurea*, der *ſchwefelgelbe Spinner*.

Fabric. Gen. Inſ. c. Mant. p. 279. 60·61. B. *Sulphurea*.

Alis deflexis flaviſſimis, ſtrigis duabus obliquis obſcurioribus.

44. *Gno-*

Denn dieſe Phalaena *Aſtrea* iſt offenbar eine Noctua, obgleich die vom Fabricio gegebene Beſchreibung richtig zutrifft.

*) Da die Schriftſteller wegen dieſer Phaläne ſo uneins ſind, und ſie der eine unter die *Bombyces*, der andere unter die *Noctuas*, der dritte unter die *Geometras* rechnet, ſo ſind wir bey dem Fabric. geblieben.

44. *Gnoma*, der *Haubenſpinner.*

Fabric. Mant. p. 279. 64-65. B. *Gnoma. Hamburgi.*
Alis deflexis ſubdentatis cinereô-albis; *vitta marginali atra* macula alba.

45. *Compreſſa*, der *Weiſsmond.*

Fabric. Mant. p. 279. 69-70. B. *compreſſa.*
Alis compreſſo-adſcendentibus niveis, macula communi fuſca, centrali griſea; *lunula alba.*
Naturforſch. XIII. p. 27. t. 3. f. 4. a. f. 4. b. Phal. *Geometra modeſta.*
Seticornis, antrorſum alis ſuperioribus dilute cinereis, macula fuſca nigro-punctata, inferioribus cinereis unicoloribus.
(Dieſe Phal. iſt die Phal. *compreſſa* Fabric. Mant. 1. *Walch.*)

46. *Colon*, der *Kolonſpinner.*

Fabric. Mant. p. 281. 95-96. B. *Colon.*
Alis incumbentibus griſeo-fuſcis, punctis duobus nigris diſtantibus.

47. *Annulata*, der *Weiſsringel.*

Fabric. Mant. p. 281. 106-7. B. *annulata.*
Alis incumbentibus, atris, niveo-maculatis; *tibiis* albo-annulatis.

48. *Fulminea*, die *Braunſchecke.*

Fabric. Mant. p. 282. 106-7. B. *fulminea.*
Alis incumbentibus griſeo-fuſcoque variegatis; thorace antice albo ſtriga nigra.
Naturforſcher XIII. p. 29. t. 3. f. 6. a. b. Phal. *Noctua* nebuloſa.
Antrorſum alis ſuperioribus fuſcis nebuloſe maculatis, inferioribus dilute cinereo-fuſcis, retror-

trorſum alis unicoloribus dilute fuſcis leviſſime viridescentibus, nigro puncto in medio fere notatis.

(Dies Ph. *fulminea* Fabric. Mant. 1. *Walch.*)

49. *Praelata*, der *Prälat.*

Scop. Entom. carn. p. 198. no. 494.

Long. lin. 9½. *Lat.* 4½.

Alba; alis politis; abdominis apice barbato; tibiis fuſcis, albo-annulatis. In *Salice.*

Subelinguis, corpore nigro, ſed albis villis undique tecto. Antennae foeminae ſetaceae, albidae.

Hoc poſui, ut diſtinguatur a *Chryſorrhoea* et *Salicis.*

50. *Pyri*, der *Birnſpinner.*

Scop. Ent. carn. p. 199. no. 498.

Long. lin. 7½. *Lat.* 5.

Cinnamomea; dorſo tomentoſo; alis *anticis* ſupra ſtrigis duabus pallidioribus; *poſticis* ſubtus limbo pallidiore.

In *Pyro* larva reperta et in foliis *Populi albae.*

Larva ſuperne nigra, linea dorſali et laterali glaucis, quibus adjacet linea alia fulva; capite glauco, punctis duobus nigris. Folliculus duplex, albus, tenuis, oblongus.

51. *Eremita*, der *Eremit.*

Scop. Ent. carn. p. 201. no. 501.

Long. lin. 9½. *Lat.* 6.

Alae cinereae; *anticae* atomis faſciisque abruptis fuſcis tribus, dorſo faſciis tribus nigris.

Inveni

Inveni 30 April. in *Sylva Idrienſi*, inſidentem Eccleſiae muro.

52. *Idrienſis*, der *idriſche Waldſpinner.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 113. no. 121.

Alae *anticae* fuſco-flavae, maculis luteis marginalibus 5; *poſticae* luteae maculis nigris 4; ambae ſubtus concolores, flavae nigro-maculatae et faſciatae. Statura *Cajae.*

Diverſa a *Dominula Linn.*

53. *Bicoloria*, der *weiſſe gelbgefleckte Spinner.* — *Unbekannte Raupe.*

Wien. Schmett. p. 49. A. No. 3.

54. *Querna*, *Hageichenſpinner* (Quercus Roboris).
Wiener Schmetterl. p. 49. A. No. 5.

55. *Dodonaea*, *Kahneichenſpinner* (Quercus Roboris).
Wiener Schmetterl. p. 49. A. No. 6.

56. *Chaonia*, *Steineichenſpinner* (Quercus Roboris).
Wien. Schmetterl. p. 49. A. No. 7. *)

57. *Rubea*, *Heckeichenſpinner* (Quercus roboris).
Wien. Schmetterl. p. 51. C. No. 2. **)

58. *Nivoſa*, *Wintereichenſpinner* (Quercus Roboris).
Wien. Schmetterl. p. 52. D. No. 1.

*) Dieſe 4 *mondmaklichte Spinner:* Ph. Bomb. *Lunigerae; Scheinſchwärmerraupen*, Larvae *Sphingiformes.*

**) Zu den *nacktflüglichten Spinnern:* Ph. B. *Subnudae; Knoſpenraupen*, L. *Tuberoſae.*

59. *Auriflua*, *Gartenbirnſpinner* (Pyri communis *Sativae*).
Wien. Schmetterl. p. 52. D. No. 4. *)

60. *Maculoſa*, *Klebekrautſpinner* (Galii Apparines).
Wien. Schmetterl. p. 54. E. No. 10. **)

61. *Menthaſtri*, *Roſsmünzenſpinner* (Menthae Sylveſtris).
Wien. Schmetterl. p. 54. F. No. 2.

62. *Lucifera*, *Spitzwegerichſpinner* (Plantaginis lanceolatae).
Wien. Schmetterl. p. 54. F. No. 4. ***)

63. *Abietis*, *Tannenſpinner* (Pini Abietis. *Cluſ.* Piceae *Linn.*).
Wien. Schmetterl. p. 55. G. No. 2. †)

64. *Anachoreta*, *Korbweidenſpinner* (Salicis Amygdalinae).
Wien. Schmetterl. p. 56. H. No. 3.

65. *Recluſa*, *Rosmarinweidenſpinner* (Salicis Rosmarinifoliae).
Wien. Schmetterl. p. 56. H. No. 4. ††)

66. *Lobulina*, *Kienbaumſpinner* (Pini Sylveſtris).
Wien. Schmetterl. p. 57. K. No. 6.

67. *Tri-*

*) Dieſe beyden zu den *weiſslichten Spinnern*: Phal. B. *Albidae*; *Knöpferaupen*, Larvae *Nodoſae*.

**) Zu den *edlen Sp.* Ph. B. *Nobiles*; *Bärenraupen*, L. *Vrſinae*.

***) Dieſe beyde zu den *gelbfüſsigen* Sp. Ph. B. *Luteopedes*; *Haſenraupen*, L. *Celeripedes*.

†) Zu den *ſtreckfüſsigten* Sp. Ph. B. *Tendipedes*; *Bürſtenraupen*, L. *Faſciculatae*.

††) Dieſe beyde zu den *ſtirnſtreiſichten* Sp. Phal. B. *Signatae*; *Schopfraupen*, L. *criſtatae*.

67. *Trifolii*, *Wiesenkleespinner* (Trifolii pratensis).
Wien. Schmetterl. p. 57. K. No. 4. *)
La Chenille du Gazon *Réaum.* Tom. I. p. 520. t. 2. f. 19.

68. *Rimicola*, *Zerreichenspinner* (Quercus Cerris).
Wien. Schmetterl. p. 57. L. No. 1.

69. *Franconica*, *Queckeneichenspinner* (Tritici repentis).
Wien. Schmetterl. p. 57. L. No. 6.

70. *Taraxaci*, *Butterblumspinner* (Leontodontis Taraxaci).
Wien. Schmetterl. p. 57. L. No. 7.

71. *Pityocampa*, *Fichtenspinner* (Pini Sylvestris et piceae).
Wien. Schmetterl. p. 58. L. No. 11. **)
La Chenille du Pin. *Réaum.* (Πιτυοκάμπη *Dioscor.*)
Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 232. t. 3. f. 1-5. Geschichte des *Fichtenspinners* ***).
— *Neues Magaz.* der Ent. I. p. 44. Nachtr. zur Geschichte des *Fichtenspinners* (vom D. *Amstein*).

Réaum.

*) Diese beyde zu den *weißmaklichten* Sp. Ph. B. *Centropunctae*; *Pelzraupen*, L. *Villosae*.

**) Diese 4 zu den *wollichten* Sp. Ph. B. *Tomentosae*; *Haarraupen*, L. *Pilosae*.

***) 1. Die Raupen leben gesellschaftlich in einem Gespinnste, kommen nur des Nachts heraus und fressen, verspinnen aber am Tage die Oeffnung wieder.

2. Ihre Länge anderthalb Zoll, schwarzleibig, mit grauen Haaren absatzweise auf beyden Seiten, und dergleichen gelben, nebst einer Art Wulst auf jedem Absatz oben auf dem Rücken. 16 rothgelbe Füsse.

3. Ge-

Réaum. Mém. pour ſervir à l'hiſt. des Inſ. Tom. II. p. 149. La Chenille *du Pin.* t. 8. f. 1-12.

72. *Oleagina, Schlehenſpinner* (Pruni ſpinoſae). *Wien. Schmett.* p. 59. M. No. 2.

73. *Trimacula, graulichter Spinner mit drey vereinigten weiſſen Makeln.* *Wien. Schmetterl.* p. 59. M. No. 4. *Unbekannte Raupe* *).

74. *Terebra, Salbenbaumſpinner* (Populi nigrae). *Wiener Schmetterl.* p. 60. N. No. 2. **)

75. *Hamma, zimmetbräunlicher, dunkel- und weiſsgezeichneter Spinner* (Weibchen). *Wien. Schmetterl.* p. 61. O. No. 2. *Unbekannte Raupe.*

76. *Flina, rothbrauner, ſilberweiſs* — das Weibchen, *braungraulichter blaſs-gezeichneter Spinner.* *Wiener Schmetterl.* p. 61. O. No. 3. *Unbekannte Raupe.*

77. *Jo-*

3. Gehen wie die *Prozeſſionsraupen*, eine voran, auf einem mit Seide beſponnenen Wege, vier Zoll tief in die Erde zur Verwandlung.

4. Die Haare verurſachen ein empfindliches Jucken im Geſicht und an den Händen.

6. Nach *Füeſsl.* Abbild. geb' ich folgende Beſchreibung: Ph. B. Corpore aurantiaco, ano cinereo; alis *anticis* cineraſcentibus, binis faſciis transverſis fuſcis undulatis; *poſticis* pallidioribus, macula nigricante marginali.

*) Dieſe beyde zu den *groſsſtirnichten* Sp. Ph. B. *Capitones; Halbhaarraupen*, L. *Subpiloſae.*

**) Zu den *bleichringichten* Sp. Phal. B. *Albocinctae*; *Holzraupen*, L. *Lignivorae.*

77. *Jodutta*, *hellbrauner* — das Weibchen *graubräunlicher*, *weiſsgezeichneter Spinner.*
Wien. Schmetterl. p. 61. O. No. 6. *Unbekannte Raupe.* *)

78. *Caſſinia*, *Graslindenſpinner* (Tiliae Europ.)
Wien. Schmetterl. p. 61. P. No. 1. *Graslindenſpinnerraupe.* La *Caſſini* Valm.

79. *Plumigera*, *Ahornſpinner* (Aceris campeſtris).
Wien. Schmetterl. p. 61. P. No. 2.
Naturforſch III. p. 3. t. 1. f. 2. der *groſse Schnurrbart.* (D. Kühn.)
Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. Ph. B. *Plumigera.* **)

80. *Argentina*, *Eichbuſchſpinner* (Quercus Roboris frutesc.).
Wien. Schmetterl. p. 62. R. No. 2. Tab. I. b. fig. 2.
— — p. 250. §. 5. La *Phalene* à antennes en peigne et à taches argentées; L' *Argentée.*

81. *Tritophus*, *Zitterpappelſpinner* (Populi Tremulae).
Wien. Schmetterl. p. 63. R. No. 6. ***)

82. *Terrifica*, *Truffeichenſpinner* (Quercus Roboris).
Wien. Schmetterl. p. 63. S. No. 1. †)

83. *Si-*

*) Dieſe 3 zu den *ſchmalflüglichten Sp.* Ph. B. *Lanceolatae*; *Wurzelraupen*, L. *Radicivorae.*

**) Dieſe 2 zu den *haarichten* Sp. Ph. B. *Hiſpidae*; *Scheineulenraupen*, L. *Noctuiformes.*

***) Dieſe beyde zu den *rückenzähnichten* Sp. Ph. B. *Dorſo-dentatae*; *Buckelraupen*, L. *Gibboſae.*

†) Dieſer zu den *zackenſtriemichten* Sp. Ph. B. *Flexuoſo-ſtriatae*; *Gabelraupen*, L. *Furcatae.*

83. *Sicula*, *Magenſpinner* (Betulae albae).
Wien. Schmetterl. p. 64. T. No. 1.

84. *Flexula*, *röthlichgrauer Spinner mit doppelt ausgeſchweiftem Unterrande.*
Wiener Schmetterl. p. 64. T. No. 3. *Unbekannte Raupe.*

85. *Hamula*, *Rothbuchenſpinner* (Fagi Sylvaticae).
Wien. Schmetterl. p. 64. T. No. 4.
Le Cheval marin *Réaum.*

86. *Spinula*, *Schlehendornſpinner* (Pruni ſpinoſae).
Wien. Schmetterl. p. 64. T. No. 6. *)
La Chenille *à queue ſimple* de l'aubépine. *Réaum.*

87. *Teſtudo*, *Zwergeichenſpinner* (Quercus Roboris *pumilae*).
Wien. Schmetterl. p. 65. V. No. 1.

88. *Aſella*, *Alberbuſchſpinner* (Populi nigrae *frutic.*).
Wien. Schmetterl. p. 65. V. No. 2.

89. *Auſtera*, *röthlichgrauer braungezeichneter Spinner.*
Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 310. N. 9. (7·8.) Familie A. Unbek. *Raupe.*

90. *Populifolia*, *Weiſsäſpenſpinner.*
Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 310. No. 5. (1·2.) Familie I.

91. *Carna*, *trübgrauer weiſspunktenſtreifiger Spinner.*
Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 310. No. 7. (3. 4.) Familie O. Unbek. *Raupe.*

92. *Cu-*

*) Dieſe drey zu den *ſpannerförmigen* Sp. Ph. B. *Geometriformes*; *Spitzraupen*, L. *Cuſpidatae.*

92. *Cucullina*, *brauner*, *abwärts weiſsgerändelter Spinner.*

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 311. No. 8. (4.5.) Familie R. Unbek. *Raupe.*

93. *Caeſarea*, das *Kaiſervögelein.*

Kleem. Beytr. I. p. 246. t. 30. f. 1-5.

Die ſchnelllaufende ſchwarzhaarichte mit einem gelben Rückenſtreif gezierte *Bärenraupe.*

Alis triſtiſſimis nigris, *poſticurum* margine interiore, abdomineque luteis.

Viel ähnliches mit der Phal. *proceſſionea* L. S. *Naturf.* XIII. t. 2. f. 11.

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 49. no. 133. das *Kaiſervögelein*, et no. 193.

94. *Alpina*, das *Alpenvöglein.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 159. Ph. B. Alpina. t. 21. f. 5. *Mas.*

Silberſarb; auf den Vorderflügeln drey, auf den hintern zween undeutliche bräunliche Queerſtreifen. Fig. 6. das *Weibchen:* ſammetſchwarz, vorn an der Bruſt dicke, ſonſt dünne mit grauen Haaren beſetzt; *kaum Spuren der Flügel.*

95. *Viridi-alata*, der *Grünflügel.*

Geoffr. Inſ. II. p. 120. no. 124.

Phalaena pectinicornis, elinguis, antennis et corpore luteis, alis deflexis viridibus.

La *Phalene jaune à ailes vertes.*

Long. 6 lign.

96. *Gagathes*, der *achatfarbige Spinner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 124. no. 30.

Pha-

Phalaena pectinicornis elinguis, alis superioribus cinereis fuſco-marmoratis, inferioribus cinereis.

La *Phalene agathe.*

Long. 9. *lign.*

97. *Bipunctata*, der *Zweypunkt.*

Geoffr. Inſ. II. p. 124. no. 31.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis cinereis, limbo nigro-punctato, ſuperioribus faſcia duplici nigro-lutea, maculaque duplici alba puncto nigro inſignita.

Le *double point.*

Long. 8 lign.

98. *Vndulata*, der *gewäſſerte Spinner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 130. no. 41.

Phalaena pectinicornis, ſpirilinguis, alis deflexis nigro-fuſcoque undulatis, inferioribus albis.

La *Phalene brune à ailes inférieures blanches.*

Long. 7. Lign.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 337. no. 1. t. 5. f. 8.

Phalène à antennes barbues, à trompe; à corcelet huppé, avec une ligne noire, à ailes rabatues égales, d'un brun griſeatre avec trois cercles ovales d'un brun obſcur, et dont les ailes inférieures ſont blanches.

Phalene brune à ailes inférieures blanches.

— Ueberſ. II Th. 2 B. p. 244. no. 1. t. 5. f. 8.

Eine *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern; einem Saugrüſſel, einem Rückenkamm mit ſchwarzer Linie, und gleich niederhangenden braungraulichen Flügeln, mit drey eyrunden dunkelbraunen Zirkeln, aber weiſſen Unterflügeln.

Die

Die *braune Phaläne mit weissen Unterflügeln.*

99. *Damaretta*, die *Damarette.*

Geoffr. Inſ. II. p. 130. no. 42.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis triangularis, alis deflexis nigro-roſeis, faſciis transverſis nigricantibus.

La *Damarette.*

Long. 4½ lign.

100. *Criſtata*, der *Toupéſpinner.*

Geoffr. Inſ. II. p. 131. no. 43.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, corniculis criſtatis, alis deflexis ochroleucis, linea duplici transverſa ſaturatiore.

Le *toupet tanné.*

Long. 5 lign.

101. *Cuneata*, der *neuyorkiſche Keilſpinner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 15. t. 7. f. 3.

— Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Alis flavicantibus; *anticis cuneo*, faſcia longitudinali, margineque interiore *aterrimis*; *poſticis* binis punctis margineque exteriore fuſceſcentibus: corpore quinis lituris transverſis nigris.

102. *Fulminea*, der *ſmyrniſche Blitzſtrahl.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 31. t. 16. f. 3.

Ses ailes près de *quatre pouces et demi.*

Magna. Alis fuſco-rubeſcentibus; *anticis* binis lineis *obliquo-fulmineis.*

103. *Liturata*, der *neuyorkiſche ſchwarzgeſtrichelte Spinner.*

Drury Illuſtr. of. nat. hiſt. Vol. I. p. 36. t. 18. f. 4.

Ses ailes *un pouce et trois huitiemes.*

Alis albicantibus; maculis numeroſis *nigro-lituratis.*

104. *Rubro-collaris*, das *bengaliſche rothe Halsband.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 11. t. 6. f. 4. Phal. Bomb. *Glaucopis.*

Ses ailes *deux pouces et un quart.*

Alis nigro-glauceſcentibus concoloribus; *anticis* binis faſciis transverſis niveis; *collari hilari-rubro.*

105. *Figurata*, der *virginiſche Bilderſpinner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 22. t. 12. f. 4.

Ses ailes presque *un pouce et demi.*

Alis concoloribus atris; *anticis* flavo-*poſticis* hilari-rubro-*figuratis.*

106. *Virginienſis*, das *virginiſche Weißauge.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 23. t. 13. f. 2.

Ses ailes presque *deux pouces, et cinq huitiemes.*

Alis concoloribus fuſcis; *anticis punčto ocellari* albo, pupilla glauceſcente.

107. *Egle*, die *neuyorkiſche Schwarzader.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 35. t. 20. f. 3.

Ses ailes *un pouce et ſept huitiemes.*

Alis concoloribus fuſcis, nigro-venoſis.

108. *Mar-*

108. *Marginata*, der *jamaische weisse Punktrand.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 38. t. 22. f. 2.

Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus furvis; *posticis* basi albo-fasciatis, disco ovali albo, antice acuminato margine exteriore quinis punctis albicantibus; ano sanguineo.

109. *C nigrum*, das *schwarze C.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 338. no. 3. t. 5. f. 10.

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes rabatues égales grises nuancées de brun, et marquées d'un C noir.

Phalene C noir.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 245. no. 3. t. 5. f. 10.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, und gleich herabhangenden grauen, braunschattirten, und mit einem schwarzen C bezeichneten Flügeln.

Das *schwarze C.*

110. *Vmbratica*, der *Schattenspinner.*

Degeer Inf. II. Part. I. p. 338. no. 2. t. 5. f. 9.

Phalene à antennes barbues, à trompe, à corcelet huppé, à ailes rabatues, égales d'un brun obscur noirâtre, avec des points d'un gris clair le long du bord extérieur.

Phalene Sombre.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 245. no. 2. t. 5. f. 9.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, Rückenkamm, und gleich niederhangenden dunkelbraunschwärzli-

chen Flügeln, längst dem Aussenrande, mit hellgrauen Punkten.

Der *Nachtschatten.*

111. *Cinerea*, der *aschfarbige Spinner mit weissen Flecken.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 339. no. 4. t. 5. f. 11.

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes en toit d'un cendré blancheâtre avec des nuances et des rayes noirâtres et deux taches ovales blancheâtres bordées de noir.

Phalene cendrée à deux taches blancheâtres.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 246. no. 4. t. 5. f. 11.

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und aschgrauweisslichen dachförmigen Flügeln mit schwärzlichen Streifen, Schattirungen, und zween eyrunden weisslichen schwarzgerändelten Flecken.

Die aschgraue Phaläne mit zween weisslichen Flecken.

112. *Dimas*, der *ostindische Dimas.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 92. t. 59. Fig. C.

Alis albo - glaucescentibus, nigro - venosis; *anticis* ochreo - marginatis, fasciaque transversa incurvata ferruginea; *posticis* nigro - bimarginatis.

113. *Dryas*, der *westindische Dryas.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 110. t. 70. Fig. C.

Alis *anticis* furvis; lineis longitudinalibus fuscis lituratis; *posticis* fusco - pallidioribus, basi glaucis.

114. *Eridanus*, der *ſurinamiſche Eridanus.*
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 107. t. 68. Fig. G.
Alis concoloribus niveis, nigro-venoſis; abdomine aurantiaco-annulato.

115. *Ebalus*, der *ſurinamiſche Ebalus.*
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 79. t. 50. Fig. G.
Antennis, thorace, abdominisque margine ochreaceis; alis concoloribus rubicundis, atro-punctatis.

116. *Helops*, der *ſurinamiſche Helops.*
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 113. t. 72. Fig. C. *Foemina.*
Alis fuſcis, aurantiaco-maculatis, *poſticis* ferrugineis; abdomine nigro-annulato.

117. *Ilirias*, der *ſurinamiſche Ilirias.*
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 15. t. 10. Fig. E.
Alis hilare-viridibus, fuſco-marginatis; *anticis* tribus lineis transverſis nigricantibus apice luteis; *poſticis* binis maculis fuſcis marginalibus: ano-flavo-piloſo.
Müllers Suppl. und Reg. B. p. 311. no. 193. b. Phal. *Ilirias*, die *grüne Eule.*

118. *Lincus*, der *ſurinamiſche Linkus.*
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 79. t. 50. Fig. H.
Alis furvis; *anticis* apice, *poſticis* diſco aurantiacis.

119. *Liris*, der *weſtindiſche Liris.*
Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 98. t. 63. Fig. F.
Alis vireſcentibus nigro-venoſis, areis quatuor caneſcentibus.

120. *Meon*, der *ſurinamiſche Meon.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 113. t. 71. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* quatuor lineis totidemque maculis albis; *poſticis* baſi albis, linea flaviſſima marginali incurvata.

121. *Metabus*, der *ſurinamiſche Metabus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 117. t. 74. Fig. D. *Foemina.*

Alis concoloribus brunneis, nigro-venoſis.

122. *Narciſſus*, der *chineſiſche Narziſſus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 116. t. 73. Fig. E F. *Foemina.*

Alis *anticis* furvis, faſcia longitudinali dilute alba, lineola nigra ſerpentina; *poſticis* baſi luteis, margine glauco-fuſcis.

123. *Noëma*, der *ſurinamiſche Noëma.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 27. t. 18. Fig. E.

Alis *anticis* variegato-hieroglyphicis, *C nigro; poſticis* griſeo-albeſcentibus.

124. *Ophis*, der *konſtantinopolitaniſche Ophis.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 20. t. 13. Fig. C.

Antennis flavis; alis *anticis* atris, flavo-hieroglyphicis; *poſticis* ciliatis nigricantibus.

125. *Orſilochus*, der *ſurinamiſche Orſilochus.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 72. t. 46. Fig. D.

Alis niveis, maculis numeroſis rubro-fuſcis.

126. *Pandroſa*, die *ſurinamiſche Pandroſa.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 122. t. 77. Fig. D.

Alis fuſco-teſtaceis; *anticis* faſcia longitudinali alba, nigro-lineata, ſex haemiſphaeriis impoſitis atris, albo-marginatis; *poſticis* lineis transverſis nigris undulatis.

127. *Promula*, die *bataviſche Promula.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 114. t. 72. Fig. D. *Foemina.*

Alis concoloribus furvis; *poſticis* margine interiore luteo.

128. *Rhodope*, die *chineſiſche Rhodope.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 49. t. 30. Fig. E.

Statura Papil. *Heliconii.*

Alis omnibus *foliaceis; anticis* furvis nigro-venoſis; *poſticis* cyaneo-faſciatis.

129. *Tiberina*, die *chineſiſche Tiberina.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 52. t. 32. Fig. C D. *Foemina.*

Alis nigro-luteis, antennisque pulchre *deauratis.*

Edw. hiſt. of Birds, t. 226.

130. *Vmber*, der *ſurinamiſche Nachtſchatten.*

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 24. t. 15. Fig. F.

Fabric. Mantiſſ. p. 281. 99 - 100. Bomb. *Vmber.*

Alis convolutis atris; fronte abdomineque fulvis.

131. *Aconyta*, der *bengaliſche Akonyta.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 51. t. 131. Fig. A. *Foemina.*

Alis concoloribus brunneo-rubeſcentibus; *anticis* faſciis pallidioribus.

132. *Alſas*, der *ſurinamiſche Alſas.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 26. t. 113. Fig. E. *Foemina.*

Alis *anticis* teſtaceis, lineis fuſcis nigrisque undulatis; *poſticis* albidis, flavo-marginatis.

133. *Aſtur*, der *ſurinamiſche Aſtur.* *)

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 35. t. 120. Fig. B.

Alis *anticis* albis variegato-hieroglyphicis; *poſticis* violaceis.

134. *Crocos*, der *ſurinamiſche Krckos.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 44. t. 126. Fig. E.

Alis *anticis* viridi-micantibus, areis fulvo-rubellis, fuſco-punctatis; *poſticis* abdomineque rubicundis.

135. *Encelada*, der *ſurinamiſche Enzelada.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 130. t. 182. Fig. F.

Alis fuſco-maculatis, faſciis lineisque undulatis nigris; *poſticis* baſi glauceſcentibus, apice rubellis.

136. *Hermia*, der *ſurinamiſche Hermia.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 136. t. 185. Fig. F.

Affinis Phal. *Crocos.*

Alis *anticis* viridi-micantibus atro-punctatis, areis fulvis rubro-punctatis; *poſticis* incarnatis, linea marginali obſcure-rubra, incurvata.

137. *Hipparchia*, die *ſurinamiſche Hipparchia.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 135. t. 185. Fig. D. *Foemina.*

Alis

*) Im Texte eine Phal. *Noctua;* im Indice Bombyx, und ſo bey mehreren.

Alis teſtaceis, flavo - maculatis, atroque punctatis.

138. *Hyphinoë*, die *amboiniſche Hyphinoë*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 91. t. 154. Fig. B. *Foemina*.

Magna. Alis omnibus purpuraſcentibus; *anticis* flavo - maculatis.

139. *Icaſia*, die *ſurinamiſche Ikaſia*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 130. t. 181. Fig. E.

Alis pallide - teſtaceis; *anticis* ocellis fuſcis albo - pupillatis; *numerisque* 8 ſolitariis et continuis.

140. *Lactinea*, die *bataviſche Laktinea*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 58. t. 133. Fig. D.

Alis concoloribus albicantibus; *anticis* margine anteriore rubro; *poſticis* binis in diſco punctis, lineisque in margine nigris interruptis.

141. *Mineus*, der *bataviſche Mineus*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 52. t. 131. Fig. D.

Alis concoloribus ochreaceis; areis cyaneis *aureo - punctatis;* toto corpore aureo - liturato et annulato. *Splendida*.

142. *Peripheta*, der *weſtindiſche Peripheta*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 54. t. 131. Fig. G.

Alis concoloribus fuſco - teſtaceis, falcato - dentatis, *foliis* albicantibus, fuſco - ſtriatis.

143. *Rivuloſa*, der *ſurinamiſche Bachſpinner*.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 15. t. 107. Fig. A. *Mas*.

Alis fuſco-caneſcentibus; tribus *anticarum rivulis* longitudinalibus nigris.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. t. 14. f. 5. *Foemina.*

144. *Somniculoſa*, der *ſurinamiſche Schläfer.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 6. t. 100. Fig. A B. *Foemina.*

Magna. Alis concoloribus fuſco-rubellis, albo-ſtriatis.

145. *Tymber*, der *ſurinamiſche Tymber.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 109. t. 167. Fig. D.

Alis concoloribus furvis; *anticis* pallidioribus.

146. *Verago*, der *ſurinamiſche Verago.*

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 102. t. 162. Fig. D E. *Mas. Vol. IV.* p. 34. t. 306. Fig. D E. *Foemina.*

Alis fuſco-variegatis; *anticis* binis ocellis albis atro-pupillatis.

147. *Alope*, die *ſurinamiſche Alope.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 168. t. 286. Fig. E F. *Foemina.*

Alis furvo-gagatheis, nigro-lineatis.

148. *Alphea*, die *koromandelſche Alphea.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 99. t. 250. Fig. E.

Alis incarnatis; *anticis* triangulo recto atro-fuſco, transverſe albo-faſciato.

149. *Amaſis*, der *ſurinamiſche Amaſis.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 33. t. 206. Fig. B. *Foemina.*

Alis

Alis *anticis* albicantibus, lineis curvis transversis atris lituratis, macula fere media rubicunda; *posticis* flavis atro-maculatis.

150. *Amilia*, die *surinamische Amilia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 130. t. 265. Fig. DE. *Mas et Foemina.*

Alis dentatis fusco-cinerascentibus; *anticarum* una *numerus* 18, altera *littera* B.

151. *Bifasciata*, die *surinamische Doppelstreife.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 104. t. 252. Fig. F. *Foemina.*

Alis concoloribus ochreaceis; *anticis* binis fasciis transversis nigris.

152. *Caprotina*, die *virginische Kaprotina.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 170. t. 287. Fig. C. *Foem.*

Alis *anticis* albis, *posticis* luteis, omnibus nigro-maculatis.

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. t. 3. f. 3.

153. *Circe*, die *surinamische Zirze.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 124. t. 263. Fig. D. *Mas.*
— — p. 147. t. 274. Fig. E. *Foem.*

Alis *anticis* viridi-nigricantibus, albo-fasciatis; *posticis* purpurascentibus: *Foemina* alis anticis pallidioribus.

154. *Cocala*, die *surinamische Kokala.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 145. t. 273. Fig. D. *Mas.*

Alis furvis; *anticis* pallidioribus atro-lineatis, binis apice maculis luteis: *antennis pedibusque posterioribus* longissimis.

155. *Do-*

155. *Dominia*, die *koromandelſche Dominia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 123. t. 263. Fig. A B. *Foemina.*

Alis concoloribus niveis; *anticis* viridi-micantibus nigro-venoſis; *poſticis* binis maculis atris *teſſellatis;* antice longis, poſtice brevioribus faſciis longitudinalibus aterrimis.

156. *Erycata*, die *ſurinamiſche Erykata.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 170. t. 287. Fig. D. *Foemina.*

Alis falcato-dentatis rubeſcentibus, variegatis, lineis transverſis atris; margine nigro-punctato.

157. *Famula*, die *guineiſche Magd.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 61. t. 228. Fig. E. *Mas.*

Alis nigerrimis, baſi albicantibus; *anticis* binis maculis ovatis albis incurvatis.

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. t. 11. f. 3.

158. *Hyrtaca*, die *ſurinamiſche Hyrtaka.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 97. t. 249. Fig. F. *Mas.*

Alis concoloribus teſtaceis; *anticis* apice obſcurioribus; binis *cuneis* perforatis atris.

159. *Javana*, die *ſurinamiſche Javana.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 146. t. 274. Fig. C. *Foemina.*

Alis *anticis* diſco furvo-rubris, antice margineque flaveſcentibus, binis punctis albis; *poſticis* obſcurioribus margine ſulphureis.

160. *Ido-*

160. *Idonia*, die *neuyorkische Idonia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 150. t. 275. Fig. H. *Mas.*

Alis fuscis, atro-flavoque variegatis; *posticis* disco albo.

161. *Lanata*, der *surinamische Wollspinner.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 130. t. 265. Fig. F. *Mas;* Fig. G. *Foemina.*

Alis concoloribus incarnatis, nigro-venosis. *Merian.* Surin. t. 19.

162. *Membliaria*, die *ostindische Membliaria.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 139. t. 269. Fig. CD. *Foemina.*

Alis pallide-testaceis, margine albo-lineato.

163. *Micilia*, die *surinamische Mizilia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 62. t. 228. Fig. G.

Alis *anticis* nigerrimis, albo-glaucoque fasciatis; *posticis* coeruleis albo-fasciatis.

164. *Mummia*, die *surinamische Mummia.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 61. t. 228. Fig. C. *Mas.*

Alis concoloribus furvis, margine atro-punctatis; *posticis* basi albis.

165. *Nausica*, die *surinamische Nausika.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 97. t. 249. Fig. DE. *Mas.*

Alis *anticis* testaceis, fasciis pallidioribus; *posticis* canescentibus, atris figuris: fasciis, clavis, cuneisque notatis.

166. *Regina*, die *ſurinamiſche Königinn.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 142. t. 272. Fig. A. *Mas.*

Alis *niveo-argenteis*, ciliatis.

167. *Sanguinolenta*, der *ſurinamiſche Blutſpinner.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 102. t. 252. Fig. A. *Mas.*

Alis concoloribus *ſanguinolentis; anticis* binis maculis albis.

168. *Tomyris*, der *ſurinamiſche Tomyris.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 123. t. 262. Fig. FG.

Alis concoloribus furvis, punctis numeroſis albis, cyaneisque in areis nigris.

169. *Venus*, die *kapenſiſche Venus.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 167. t. 286. Fig. CD.

Splendidiſſima.

Alis *anticis* ochreaceis maculis oblongis ovatisque *argentatis*, nigro-marginatis; *poſticis* rubicundis, baſi pallidioribus.

170. *Vitrea*, der *ſurinamiſche Glasſpinner.*

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 151. t. 276. Fig. C.

Alis concoloribus albeſcentibus, medio-fulvis, atro-ſtriatis, corpore toto ochreaceo.

171. *Equina*, der *isländiſche Pferdeſpinner.*

Olaffens Reiſe durch Island I. p. 320. III. *Lepid.* no. a.

Phalaena (*maxima*) colore obſcure-ſericeo palleſcente; toto corpore plumoſo, ore *ſpirilingui.*

Hroſſe Fidrildr; ſetzt ſich auf die Pferde.

172. ***Molina***, die *ſurinamiſche Molina.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 25. t. 302. Fig. EF.

Alis concoloribus ferrugineis; *anticis* luteo-ſtriatis; *poſticis* baſi rubeſcentibus, macula media nigricante.

173. ***Neſea***, die *ſurinamiſche Neſea.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 31. t. 305. Fig. C.

Alis *anticis* purpuraſcentibus, *littera P* inſignitis; *poſticis* pallide luteis; *pedes anteriores* porrecti, antice rubri.

174. ***Bellatrix***, die *ſurinamiſche Bellatrix.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 32. t. 305. Fig. F.

Alis ſubfalcatis, omnibus ciliatis; *anticis* olivaceo-flavo-nigricantibus; in medio congeries punctorum alborum; baſi quinis punctis luteis; *poſticis* baſi admodum piloſis.

175. ***Amynta***, die *ſurinamiſche Amynta.*

Cramer Pap. exot. III. p. 100. t. 251. Fig. E. *Foem.*

— — IV. p. 33. t. 306. Fig. C. *Mas.*

Alis *anticis* baſi flavis, faſcia transverſa rubra, poſtice incarnatis, margine aurantiaco; atro-maculatis: *tectiformibus.*

176. ***Agreſta***, die *ſurinamiſche Agreſta.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 32. t. 306. Fig. A.

Alis cinnamomeis albo-maculatis.

177. ***Nuda***, der *ſurinamiſche Kahlflügel.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 33. t. 306. Fig. B.

Alis nudis cineraſcentibus flavo-nigroque ſtriatis.

178. *Do-*

178. *Dolabrata*, die *ſurinamiſche Dolabrata.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 34. t. 306. Fig. F.
Alis concoloribus luteis, *anticis* fuſco - lituratis.

179. *Ornata*, die *ſurinamiſche Schöne.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 34. t. 306. Fig. G.
Alis *anticis* albidis, binis lineis undulatis fuſcis, una interrupta; *poſticis* luteſcentibus.

180. *Netrix*, die *ſurinamiſche Netrix.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 35. t. 307. Fig. B.
Alis albidis, faſciis transverſis flavis.

181. *Flavata*, *der javaniſche Gelbling.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. C.
Alis omnibus flavis, *anticis* baſi atro - lituratis; *poſticis* pallidioribus.

182. *Pilumnia*, die — *Pilumnia.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. D.
Alis flaveſcentibus; *anticis* punctis nigris obſoletis, lineisque nigris nigro - punctatis.

183. *Altrix*, die *ſurinamiſche Altrix.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 36. t. 307. Fig. E.
Alis *anticis* fuſceſcentibus, nigro - lineatis.

184. *Punctata*, der *ſurinamiſche Schwarzpunkt.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 37. t. 307. Fig. F.
Alis *anticis* olivaceis, nigro - punctatis; *poſticis* purpuraſcentibus, diſco flavo.

185. *Fuſca*, der *ſurinamiſche Bräunling.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 37. t. 307. Fig. G.

Alis

Alis *anticis* fuſcis, punctis tribus flavis; *poſticis* incarnatis, baſi aurantiacis.

186. *Simois*, die *ſurinamiſche Simois*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 39. t. 308. Fig. F.

Alis fuſcis, nigro-venoſis; *anticis* triangulo furvo; omnibus margine flavo, ciliato.

187. *Tharis*, die *ſurinamiſche Tharis*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 38. t. 308. Fig. D.

Alis *anticis* furvis, variegatis, nigroque punctatis; *poſticis* concoloribus fuſcis.

188. *Eueria*, der *Wollträger*.

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 26. t. 2. f. 3. *Larva*. f. 6. Mas. f. 7. Foem.

Ph. B. elinguis; alis reverſis pallide corticinis; ſuperioribus baſi ſtrigaque poſtica flavis puncto albo.

(Eine *Ringelraupe; auch in den Eyern Ichneumons.*)

189. *Vidua*, die *junge Witwe*.

Knochs Beytr. zur Inſektengeſch. I St. p. 48. no. 9. t. 3. f. 3.

Elinguis, alis albo-cineraſcentibus nigro-variis, faſcia ſublutea inaequali.

III. NACHTEULEN: *Noctuae.*

1. *Ohne sichtbaren Saugrüssel* (Elingues).

82. *Strix*, die *südamerikanische Eule.* *)

Müllers L. N. S. 5 B. 1 Th. p. 679. no. 82. die *Trauereule.*

Fabric. S. E. p. 591. no. 2. NOCTUA *Strix.* Nom. *Linn.*

Sebae Thes. IV. t. 39. f. 12. 14.

— — t. 57. f. 7. 9.

Cramer Pap. exot. II. p. 77. t. 145. Fig. A. Ph. *Strix* — *d'Amboine.* **)

83. *Aesculi*, das *Blausieb.*

Müller l. c. p. 679. no. 83. der *Blausieb.*

Berlin. Magaz. III. p. 290. no. 36.

Phal. *pirina*, der *Lindenbohrer.* Weiss, mit vielen stahlblauen Flecken.

Naturforscher IX. p. 114. no. 36. Ph. *Pirina.* (von *Rottemb.*)

— — XII. p. 73. no. 4. Ph. N. *Aesculi.* t. 2. f. 7. *Weibchen* (*Capieux*).

Beschäf-

*) Die vom Linn. hierbey zitirte *Merian.* Sur. t. 20. gehört nicht hieher, sondern zu *Cramers Agrippina:* Pap. exot. I. p. 136. t. 87. A. t. 88. A.

Linné sagt mit Recht von ihr: *Maxima* omnium notarum Noctuarum.

**) Nach Cramer müsste sie eigentlich zu den *Bombycibus* gerechnet werden.

Der Körper und Hinterleib *spitzspindelförmig*, wie bey den *Schwärmern.*

Beſchäftig. der Berl. Geſellſch. naturf. Fr. III. p. 30. §. 1. Phal. *Aeſculi*, das *Blauſieb.* t. I. f. 1. *Männchen; f. 2. Weibchen.* *)

Die *Puppe* im veſteſten *Büchenholz.* (D. *Kühn.*)

Fiſchers N. G. v. Livl. p. 152. no. 360. Ph. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 688.

Ph. Aeſculi, die *Punkteule.*

Bey *Genf.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 391. no. 10. Phal. *pirina*, der *Lindenbohrer.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 1. no. 2.

Ph. *Aeſculi*, das *Blauſieb.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 276. t. 48. f. 5. 6.

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige ſchöne hochgelbe *Holzraupe* in den Apfelbäumen. **)

Wiener Schmetterl. p. 59. N. *Holzraupen, bleichringichte Spinner* ***).

No. 3. *Pferdekaſtanienſpinnerraupe* (Aeſculi Hippocaſtani); *Pferdekaſtanienſpinner.* Ph. *Aeſculi.* (Noctua Linn.)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 306. no. 1150. Phal. N. *Pyrina.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 83. Ph. *Aeſculi.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 31. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 590. no. 5. HEPIALUS *Aeſculi.*

*) Von der *Capienxſchen* in der Gröſse, Fühlhörnern, und ganzem Bau ſehr verſchieden. Die erſtere hat zwo ganz kurze haarförmige Fühlſpitzen.

**) Die Raupe wird gröſser, als ſie *Röſel* abgebildet hat.

***) Mit Rechte unter die *Bombyces* geſetzt.

Niveus, alis punctis numerosis coeruleo-nigris; thorace senis.

Larva flava, nigro punctata, capite caudaque nigris.

84. *Humuli*, die *Hopfeneule.*

Müller l. c. p. 679. no. 84. die *Hopfeneule.*

Füeßl. schweizer. Inf. p. 36. no. 689. Phal. *Humuli, Hopfeneule.*

Bey uns etwas selten.

Wien. Schmetterl. p. 61. O. *Wurzelraupen*; *schmalflüglichte Spinner.*

No. 1. *Hopfenspinnerraupe* (Humuli Lupuli); *Hopfenspinner.* Ph. *Humuli.*

Sulzers Gesch. p. 160. t. 22. f. 1. die *Hopfeneule*; Ph. *Humuli.*

Kothgelb; die Vorderflügel mit hellbraunen Wolken; unten braun behaart, die Hinterflügel halb federlos, schwärzlich. Kurze Fühlhörner. Bey dem *Männchen* alle Flügel oben weiss, perlenfarb, ohne Flecken, unten gelblichbraun.

Neuer Schaupl. der Nat. IV. p. 104. Phal. nocturna *Humuli.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 11. Phal. *Humuli*, *Hopfeneule.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 12. Ph. *Humuli.*

Raj. Hist. Inf. p. 157. no. 3.

Phalaena media, alis longis, in *foemina* flavis, cum lineis rubentibus, in mare albis.

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 84.

Ph. *Humuli.* Nom. *Linn.*

Onomat. hist. natur. P. 6. p. 377.

Ph. *Humuli*, der *Hopfenvogel.*

Cathol. H. p. 308. Ph. *Humuli.*

Fa-

Fabric. S. E. p. 589. no. 1. HEPIALUS *Humuli.*

Alis flavis, fulvo-ſtriatis; *maris* niveis.

Habitat in Lupuli radicibus, *Eryſiphen* cauſſans.

Ova innumera, minima, nigra.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1380. Ph. N. *Humuli.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 15. p. 487. t. 7. f. 1-6.

Chenille raſe, blanche, à tête d'un brun jaunâtre, qui ronge et mange les racines du *Houblon.*

— — p. 698. t. 7. f. 5. 6.

Phalene à antennes très-courtes, dont le *mâle* eſt blanc, et la femelle d'un jaune d'ocre.

— Tom. II. Part. I. p. 365. no. 1.

Phalene à antennes filiformes très-courtes, ſans trompe, dont le *mâle* eſt blanc, et la *femelle* d'un jaune d'ocre.

Phalene du Houblon.

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. 15te Abh. p. 66. t. 7. f. 1-6.

Die glatte und weiſse *Raupe*, mit gelblichbraunem Kopfe an den *Hopfenwurzeln.*

— — 4 Quart. p. 121. t. 7. f. 5. 6.

Ein *Nachtvogel* mit ſehr kurzen Fühlhörnern; das *Männchen* weiſs; das *Weibchen* okergelb.

— II Th. I B. p. 266. no. 1.

Eine *Phaläne* mit fadenförmigen überaus kurzen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel; das *Männchen* weiſs, das *Weibchen okergelb.*

Die *Hopfeneule.*

85. *Hecta*, das *Punctband.*

Müller l. c. p. 679. no. 85. das *Punktband.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 690.

Phal. *Hecta*, das *Punktband.*
Bey *Genf.*

Wien. Schmetterl. p. 61. O. No. 4. *Unbekannte Raupe.*

Oraniengelber ſilberglänzend—das *Weibchen*, grauer düſtergeſtreifter Spinner. Ph. *Hecta* *).

Cathol. H. p. 94. Phal. *Hecta.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 589. no. 2. HEPIALUS *Hectus.* Nom. *Linn.*

Veſpere in aëre fluctitat motu pendulo, at ſolitarius.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1381. Ph. *Hecta.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 15. p. 495. t. 7. f. 12.

Papillon nocturne à antennes très-courtes, dont les ailes ſupérieures ſont d'un jaune couleur d'ocre, tirant ſur le roux, à taches d'un blanc argenté. (Mâle.)

— — p. 698. t. 7. f. 12.

Phalene à antennes très-courtes, d'un jaune rouſſâtre, à taches blanches et argentées.

— Tom. II. Part. I. p. 366. no. 2.

Phalene à antennes filiformes très-courtes, ſans trompe, d'un jaune rouſſâtre, avec des taches blanches argentées ſur les ailes ſupérieures.

Phalene à pattes en muffe.

— Tom. VII. p. 596. no. 4. t. 44. f. 14. *Foemina*, ſ. Ph. *Vitis Idaeae* L. no. 88.

Phalene ſans trompe; à antennes filiformes très-courtes, à ailes d'un jaune rouſſâtre avec des taches blanches dans le *mâle*, et brunes à rayes fauves dans la *femelle.*

Pha-

*) Dieſe Hecta, ſagen die Wiener: ſey das *Männchen* von Ph. *Vitis Idaeae* Linn. no. 88; dieſe *letztere* alſo das *Weibchen.*

Phalene à pattes en masse.

Phalaena (*Clavipes*) elinguis; antennis filiformibus brevissimis, alis *mari* rufo-fulvis, maculis niveis; *foeminae* fuscis, fasciis fulvis.

Degeer Uebers. I B. 3 Qu. p. 71. t. 7. f. 12.

Ein *Nachtfalter* mit sehr kurzen Fühlhörnern, und okergelben, etwas fuchsröthlichen, silberweissgefleckten Oberflügeln (*Männchen*).

— — 4 Quart. p. 121. t. 7. f. 12.

Ein gelbröthlicher *Nachtvogel*, mit kurzen Fühlhörnern und silberweissen Flecken.

— — II Th. I. B. p. 266. no. 2.

Eine gelb-braunröthliche *Phaläne* mit weissen Silberflecken auf den Oberflügeln, und sehr kurzen fadenförmigen Fühlhörnern ohne Saugrüssel.

Die *keulfüssige Phaläne.*

86. *Lupulina*, die *bogenflüglichte Eule.*

Müller l. c. p. 680. no. 86. der *Bogenflügel.*

Wiener Schmetterl. p. 61. O. No. 5. *Unbekannte Raupe.*

Okergelber, düster- und silberweiss; das *Weibchen* aschgrauer dunkelgestrichter *Spinner*. Ph. *Lupulina.*

Fabric. Syst. Ent. p. 589. no. 2. HEPIALUS *lupulinus.*

Alis cinereis; striga albidiore.

87. *Sylvina*, die *Waldeule.* *).

Müller l. c. p. 680. no. 87. die *Waldeule.*

Füessl. Magaz. der Entom. II. p. 11. Phal. *Sylvina.* (Chorh. *Meyer.*)

 Die

*) *Nicht abgebildet.*

Die buntgeſtreifte *Raupe* mit gelbbraunen Knöpfgen — Nahrung *Eichenlaub.*

— Die Verwandlungshülſe, die Gröſse abgerechnet, gleicht der von der Raupe der Ph. *Quercus*, worinn die Raupe 10 Tage unverwandelt liegt. Der Schmetterling bleibt 5 Wochen in der Puppe.

88. ***Vitis Idaeae***, der ***Stumpfſauger:*** das ***Weibchen*** von Ph. ***Hecta*** no. 85.

Müller l. c. p. 680. no. 88. der ***Stumpfſauger.***
Degeer Inſ. Tom. VII. p. 596. t. 44. f. 14.

2. EULEN ***mit ſichtbarem Saugrüſſel und glattem Rücken, ohne Kamm*** (Spirilingues, dorſo laeves absque criſta).

89. ***Lectrix***, die ***chineſiſche Scheckeule.***

Müller l. c. p. 680. no. 89. die ***Scheckeule.***
Fabric. Syſt. Ent. p. 584. no. 95. BOMBYX ***Lectrix.*** Nom. ***Linn.***
Cramer Pap. exot. II. p. 145. t. 192. Fig. C. Phal. ***Lectrix*** — de la *Chine* (*Foemina*).
Houttuin Hiſt. Nat. I Part. Tom. XI. p. 598. t. 92. f. 5.

90. ***Dominula***, das ***Frauchen.***

Müller l. c. p. 681. no. 90. die ***Jungfer.***
Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 692. Ph. ***Dominula***, die ***Jungfer.***
Bey uns ***ſelten.***
Berlin. Magaz. III. p. 204. no. 2. Phal. ***Dominula***, der ***Specht.***

Die

Die *Oberflügel* ſchwarzblaulichgrau mit weiſſen und gelben Flecken; die *Unterflügel* roth mit ſchwarzen Flecken.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 10. no. 3. p. 20. no. 36. Phal. *Dominula*, die *Jungfer*, der *Specht.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 267. t. 47. die auf den Wollweiden und Eſchen ſich aufhaltende, mit dreyfacher gelber Bordirung ausgezierte ſchwarze *Raupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 342. Ph. N. *Dominula*, das *Frauchen*; der *Specht.*

Das ſchwarze glatte *Nachteulchen* mit blau-, gelb und weiſsgefleckten Oberflügeln, und rothfleckigen Unterflügeln.

— — II. p. 744. no. 36. Ph. N. *Dominula*, der *Specht.*

Wien. Schmetterl. p. 53. E. No. 8. *Hundszungenſpinnerraupe* (Cynogloſſi oleraceae); *Hundszungenſpinner*; Ph. *Dominula.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 355. Ph. *Dominula.*

Bekm. Ep. S. L. p. 165. no. 90. Ph. *Dominula.* Nom. *Linn.*

Scop. Ent. carn. p. 204. no. 506. Ph. *Dominula.*

Long. lin. 11 - vnc. 1. *Lat.* lin. 6-7.

Alae ut ſupra, ita ſubtus coloratae; *anticae* nigrae cum translucente virore; maculis 10, plerisque albis; *poſticae* ſcarlatinae, binis maculis apiceque nigris.

Larva nigra, verrucis haemiſphaericis nitidis piloſis aſpera; pilis caneſcentibus, dorſo lateribusque albo-flavoque punctatis.

Pupa lucida, fuſca. *)

*) Des *Scop.* Phal. *Idrienſis*: Ann. 5. hiſt. nat. p. 113. no. 121. von dieſer *Dominula* verſchieden.

Poda Muſ. graec. p. 89.
Schaeff. Icon. t. 77. f. 3. 4.
Fabric. Syſt. Ent. p. 583. no. 93. BOMB. *Dominula.* Nom. *Linn.*

Larva piloſa, atra; lineis tribus flavis, atromaculatis.

Pupa brunnea intra folliculum communem.

91. *Hera*, der *ruſſiſche Bär.* *)

Müller l. c. p. 681. no. 91. die *ſpaniſche Fahne.* **)
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 36. no. 693. die *Hausfrau.*

Bey *Zürch* ſelten, bey *Genf* gemeiner.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 27. no. 62. Phal. *Hera*, der *ruſſiſche Bär;* die *ſpaniſche Fahne.*
Röſels Inſektenbel. IV. p. 194. t. 28. f. 3.

Ein zur 2 Kl. gehöriger vortrefflicher *Papilion*, mit hochrothen ſchwarzgefleckten *Unterflügeln;* die *Oberflügel* braun geſchillert mit weiſslichgelben Queerſtreifen; der Hinterleib oraniengelb. (*Weibchen.*)

Kleemanns Beytr. I. p. 345. t. 41. f. 1. *Raupe;* f. 2. *Geſpinnſte;* Fig. 3. *Puppe;* F. 4. 5. *Schmetterling.*

Die ſchwarzköpfige, hellgelbbordirte, und mit einem oraniengelben Rückenſtreif, nebſt dergleichen ſteifhaarigen Knöpfen gezierte *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 52. E. *Edle Spinner.*

No. 3. *Beinwellſpinnerraupe* (Symphiti tuberoſi); *Beinwellſpinner.* Ph. *Hera.*

Hot-

*) *Hera*, *Matronula*, *Dominula* und *Fuliginoſa* ſetzen die *Wiener Entomol.* p. 52. unter die *Spinner*, weil ihre Raupen dahin gehören. Es ſind ſolche *Winterſchläfer* und *Vielfräße* (Polyphagae.)

**) Unmöglich Ph. *Plantaginis* L. no. 42. wie der V. meynt.

Hotlaar Inſ. t. 8. f. 3. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Hera.*

Cathol. H. p. 122. Ph. *Hera.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 91. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 29. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 203. no. 505. Phal. *Plantaginis.*

Long. Vnc. 1. lin. ½. *Lat.* 6¾.

Alae *anticae* fuſcae cum obſcuro quodam translucente virore; margine inferiore litura, faſciaque bifida, Y referente, cerei coloris; *poſticae* ſcarlatinae, ſupra maculis 4, ſubtus unica, nigris.

Poda Muſ. graec. *Quadripunctaria.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 583. no. 92. BOMBYX *Hera.*

Alis incumbentibus, vireſcenti-nigris; rivulis flavis; *poſticis* rubicundis, maculis tribus nigris.

Geoffr. Inſ. II. p. 145. no. 74.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; ſuperioribus atris rivulis flavis; inferioribus rubris maculis nigris.

La *Phalene chinée.*

Long. 11 lign.

92. ***Matronula***, der *augsburger Bär.*

Müller l. c. p. 681. no. 92. die *Dame.*

Füeßlins ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 694. die *Matrone* — etwas ſelten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 118. no. 334. Phal. *Matronula*, die *Dame;* der *augsburger Bär.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 235. t. 39. f. 1. 2.

— — IV. t. 4. f. 4. die *braunhaarige Bärenraupe.*

Wien.

Wien. Schmetterl. p. 53. E. No. 5. *Beyfußspinnerraupe* (Artemiſiae vulgaris). *Beyfußſpinner.*
Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 12. *Beyfußeule.*
Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 383. Ph. *Matronula.*
Fabric. S. E. p. 584. no. 97. BOMBYX *Matronula.*
Alis *anticis* fuſcis; exterius flavo-maculatis; *poſticis* flavis, nigro-maculatis.

93. *Ancilla*, die *Magd.* *)

Müller l. c. p. 682. no. 93. die *Kammerjungfer.*
Wien. Schmetterl. p. 69. C. *Spindelraupen*, Larvae *Fuſiformes; ſchabenartige Eulen;* Ph. Noctuae *Tineiformes.*
No. 14. *Wändeflechteneulenraupe* (Lichenis parietini); *Wändeflechteneule*, Ph. *Ancilla.*
Catholicon A. p. 326. Ph. *Ancilla.*

94. *Parthenias*, das *Jungfernkind.* **)

Müller l. c. p. 682. no. 94. das *Jungfernkind.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 695. Ph. *Parthenias.*
Bey uns *ſehr ſelten.*
Wien. Schmetterl. p. 91. X. *Franzenraupen, Larvae cilitatae; geſchmückte Eulen*, Phal. Noct. *Feſtivae.*
3) mit gelben Unterflügeln, faſt ungezähnt.
No. 9. *Hangelbirkeneulenraupe* (Betulae albae); *Hangelbirkeneule.* Ph. N. *Parthenias.*

95. *Fuliginoſa*, der *Rußflügel.*

Müller l. c. p. 682. no. 95. der *Rußflügel.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 696. Ph. *Fuliginoſa*, der *Zartflügel.*

Berl.

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

Berlin. Magaz. III. p. 206. no. 4. Ph. *Fuliginoſa*, die *Frühlingsmotte.*

Die *Oberflügel* koffeebraun; die *Unterflügel* roth mit einigen ſchwarzen Flecken.

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 116. no. 326. Ph. *Fuliginoſa*, der *Rußflügel.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 244. t. 43. Eine ſteifhaarige braune *Raupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 747. no. 50. Phal. GEOMETRA *Fuliginoſa.* Die *Frühlingsmotte.* *)

Wien. Schmetterl. p. 54. E. No. 11. *Ampferſpinnerraupe* (Rumicis acuti); *Ampferſpinner;* Phal. BOMB. *Fuliginoſa.*

Onomat. hiſt nat. P. 6. p. 369. Ph. *Fuliginoſa.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 228. no. 13.

Phalaena minor, alis obſcure-rufis ſeu pullis duabus maculis nigris notatis.

Scop. Entom. carn. p. 206. no. 508.

Long. Lin. $7\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* obſure murinae, punctis 2 fuſcis, mediis, approximatis; *poſticae* cinnaberinae, punctis binis, mediis, maculisque marginalibus nigris.

Fabric. S. E. p. 588. no. III. BOMB. *Fuliginoſa.*

Alis incumbentibus, rubro-fuliginoſis, puncto gemino nigro; abdomine ſanguineo, dorſo nigro.

Larva piloſa, ferruginea, capite pedibusque anticis atris.

Pupa folliculata, atra, poſtice flavo-faſciata.

Fa-

*) So wird ſie hier als ein *Spannmeſſer* angeſehen, weil man vermuthlich die *haarichte Raupe* nicht geſehen oder gekannt hat.

Fabric. Reise durch Norw. p. 334.

Noctua *Fuliginosa.* *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 381. Phal. N. *Fuliginosa.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1382. Ph. N. *Fuliginosa.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 37. f. 7. 8.

96. *Fulvia*, die *indianische löwenfarbige Eule.*

Müller l. c. p. 682. no. 96. die *Löwenhaut.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 29. NOCTUA *Fulvia.* Nom. *Linn.*

Cramer Pap. exot. III. p. 101. t. 251. Fig. F. Ph. N. *Fulvia* (Mas) — à *Suriname.*

Sebae Thes. IV. t. 31. f. 11. 12. t. 43. f. 27. 28.

97. *Batis*, das *Braunauge.*

Müller, l. c. p. 682. no. 97. das *Braunauge.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 37. no. 697. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 204. no. 3. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte.*

Die *Oberflügel* braun mit fünf weissen ins Fleischfarbige vertriebenen Flecken.

Wie-

*) Nach Propst *Ströms* Erfahrungen kömmt die Larve derselben in manchen Jahren häufig des Winters auf dem *Schnee* zum Vorschein, und alsdann folgten kalte nasse Jahre, und ein hieraus entstehender Miswachs.

Das erste geschiehet auch in unsern Gegenden, dass die Larve im Winter, wenn warme Sonnenblicke kommen, als ein *Winterschläfer*, erscheint, und wenn wieder Kälte erfolgt, auch wieder beykriecht.

Wien. Schmetterl. p. 71. F. *Rinderaupen*, Larvae *Corticinae.* *Fleckige Eulen;* Phal. N. *maculatae.*

3) Die *Raupen mit einer stumpfen Erhöhung.*

No. 7. *Brombeereulenraupe* (Rubi fruticosi); *Brombeereule;* Ph. N. *Batis.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 118. no. 335. Phal. *Batis*, die *Brombeermotte*, das *Braunauge.*

Röfels Insektenbel. IV. p. 181. t. 26. f. A B C.

Die zur 2 Kl. der N. V. gehörige hökrichte, braune *Raupe* mit dem getheilten Kopfe, und einem paar in die Höhe stehender Zapfen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 836. no. 1. Ph. *Batis*, der *Brombeervogel.*

— — p. 1019. no. 4. Ph. *Batis*, die *glatte Brombeermotte mit braunen weißpunktirten Oberflügeln, und weissen Unterflügeln.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 320. Ph. *Batis*, der *Hindbeervogel.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 28. NOCTUA *Batis.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, ferruginea, antice posticeque gibba.

Pupa postice attenuata, fusca.

98. *Algira*, die *algirische Eule.* *)

Müller l. c. p. 683. no. 98. der *Graurand.*

99. *Trapezina*, der *Tischfleck.*

Müller l. c. p. 683. no. 99. der *Tischfleck.*

Füeßl. Magaz. der Entomol. II. p. 12. Phal. *Trapezina* —

Ihre Larven fressen gern andere Larven oder *Raupen.* (Chorh. *Meyer.*)

Ber-

*) Nicht abgebildet.

Berlin. Magaz. III. p. 296. no. 44. Ph. *Rhombica*, das *verſchobene Viereck.*

Röthlichgrau, mit einem groſsen verſchobenen *Viereck*, in deſſen Mitte ein ſchwarzer Punkt.

Naturforſcher IX. p. 118. no. 44. Phal. *Rhombica* (von *Rottemb.*).

Wien. Schmetterl. p. 88. T. *Mordraupen*, Larvae *Larvicidae; gewäſſerte Eulen;* Phal. Noct. *Vndatae.*

No. 13. *Ahorneulenraupe* (Aceris campeſtris); *Ahorneule*, N. *Trapezina.*

Fabric. S. E. p. 600. no. 41. *Noctua Trapezina.* Nom. *Linn.*

100. *Ocularis*, das *italiäniſche Weiſsauge.* *)

Müller l. c. p. 683. no. 100. das *Weiſsauge.*

Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 698. Phal. *ocularis*, das *Weiſsauge.*

Die *Raupe* auf den Pappelbäumen; nicht *häufig.*

101. *Sanguinolenta*, der *Blutkörper.* **)

Müller l. c. p. 683. no. 100. der *Blutkörper.*

102. *Lucernea*, der *Lichtflieger.*

Müller l. c. p. 683. no. 101. der *Lichtflieger.*

Wien. Schmetterl. p. 71. ***)

Ph. N. *Lucernaria.*

Fiſchers

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*

***) Zu den *Wellenſtrichraupen*, Larvae *Vnda-toſtriatae, glänzende Eulen*; Ph. N. *familiares.* Die V. aber ſind noch ungewiſs, ob ſie die rechte haben, da die ihrige nur *zwo* oder *fünf* düſtere Linien hat.

Fischers N. G. von Livl. p. 153. no. 361. Ph. *Lucernea*, der *Lichtflieger.*

Den *Bienenstöcken* sehr nachtheilig.

Fabric. (Othon.) Faun. Grönland. p. 194. no. 145. Ph. *Lucernea.* Nom. *Linn. Grönl.* Lios-Fluga. Habitat in *domibus*, minus frequens.

103. *Narbonea*, die *portugiesische Doppelstreife.* *)

Müller l. c. p. 684. no. 103. der *Portugiese.*

Fabric. S. E. p. 595. no. 31. NOCTUA *Narbonea.* Nom. *Linn.*

Strigae duae lineares in medio alae. Ante marginem posticum punctum fuscum, annulo dimidiato luteo cinctum.

104. *Pellex*, der *Queerfleck.*

Müller l. c. p. 684. no. 104. der *Queerfleck.*

Cramer Pap. exot. I. p. 23. t. 15. **) Fig. E. Phal. *Arne* — à *Suriname.*

105. *Glyphica*, der *Bilderflügel.*

Müller l. c. p. 684. no. 105. der *Bilderflügel.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 37. no. 699. Ph. *glyphica.*

In den *Wiesen* nicht selten.

Berlin. Magaz. III. p. 206. no. 5. Ph. *glyphica*, die *Schnellmotte.*

Hellbraun mit dunkelbraunen Flecken; die Unterflügel oraniengelb mit braunen Adern, und zwo braunen Queerstreifen.

Klee-

*) *Nicht abgebildet.*

**) Wenig verschieden. Bey den *Linnéischen* haben die Unterflügel in der Mitte einen weissen Anstrich; diese aber an den Aussenwinkeln derselben einen weissen Fleck.

Bayerische Staatsbibliothek München

Kleemanns Beytr. I. p. 206. t. 25.

Die bräunlichgelbe, braungeſtreifte, mit 14 Füſsen beſetzte glatte *Spannenraupe.* *)

— Raupenkal. p. 25. no. 56. Ph. *glyphica*, der *Bilderflügel.*

— — p. 92. no. 265.

Wien. Schmetterl. p. 94. A. a. *Schlangenraupen*, Larvae *Serpentinae; ſpannerförmige Eulen*, Ph. N. *Geometriformes.*

2) mit braungelben, düſterneblichten Unterflügeln.

No. 5. *Wieſenkleeeulenraupe* (Trifolii pratenſis); *Wieſenkleeeule*, Ph. N. *glyphica.*

Schaeff. Icon. t. 163. f. 4. 5.

Syſtem. Natur. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 38. *Phalene*, qu'on trouve dans les *paturages.*

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, ſupra fuſcis, pone ſubtusque flaveſcentibus.

Fabric. S. E. p. 598. no. 31. NOCTUA *glyphica.*

Alis deflexis, cinereo-fuſcoque variegatis, ſubtus luteis, fuſco-faſciatis.

Geoffr. Inſ. II. p. 136. no. 55.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, ſupra fuſcis, pone ſubtusque flaveſcentibus.

La *doublure jaune.* *Long.* 6. lign.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1385. Ph. *Glyphica.* Nom. *Linn.*

Degeer

*) Die ganze Beſchreibung, inſonderheit die okergelben Unterflügel, kommen mit der Linnéiſchen überein. Die Raupen der Klaſſe, wozu dieſe Eulen gehören, ſind auch, wie die Wiener ſagen, *Schlangenraupen*, und die Eulen *Spannerförmige*; Geometriformes. *Füeßlin* hat den Kleemann ſelbſt bey dieſer Glyphica zitirt, und *letzterer* hat ſich ſelbſt im Raupenkal. p. 25. no. 56. dabey angeführt.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 286. *)
Réaumur Inf. II. Mém. 14. p. 603. ed. 4.

106. *Mi*, das *schwarze M.* **)

Müller l. c. p. 684. no. 106. *das M.*
Füeßl. schweizer. Inf. p. 37. no. 700. Phal. *Mi*, *das M.*

Bey uns nicht selten in den *Wiesen.*

Berlin. Magaz. II. p. 412. no. 27. Phal. *Graminis*, der *Grasvogel.*

Braun, mit hellen weisslich gelben Flecken.

Naturforscher VIII. p. 105. no. 27. Ph. *Graminis.* (von *Rottemb.*)
Wien. Schmetterl. p. 94. A a. No. 4. *Sichelkleeeulenraupe* (Medicaginis falcatae); *Sichelkleeeule*, Ph. N. *Mi.*

107. *Pallens*, der *Bleicher.*

Müller l. c. p. 684. no. 107. der *Bleicher.*
Füeßl. schweiz. Inf. p. 37. no. 701. Ph. *pallens.* Bey uns *selten.*
Maders (Kleem.) Raupenkalend. p. 91. no. 261. die glatte, hellblasse, schlechtbräunliche — *Raupe.*
Rösels Insektenbel. III. p. 431. t. 71. f. e. 11. f. e. 12.

Die auf dem Sauerampfer lebende glatte und fleischfarbige *Raupe*, mit grünen und schwarzen unterbrochenen Linien.

Kleemanns Beytr. I. p. 197 t. 24. die glatte, hellblasse, schlechtbräunliche, mit einem graubrau-

 nen

*) Die Raupen bleiben ohne die mindeste Nahrung 9 Monat im Gespinnste, ehe sie sich verpuppen: vom September bis zum Junius des folgenden Jahres. Zu Ende des Julius erscheint der Vogel.

**) *Nicht abgebildet.*

nen schwarz bezeichneten Kopfe, braungrauen Rücken und Seitenlinien versehene *Raupe*.

Wien. Schmetterl. p. 85. Q. *Vielstrichraupen*, Larvae *Arctostriatae; tagliebende Eulen*, Ph. N. *Heliophilae*.

2) Ohne Queerstriche.

No. 10. *Butterblumeulenraupe* (Leontodontis Tarax.) *Butterblumeule*, Ph. N. *Pallens*. *)

Naturforscher IX. p. 117. no. 42.

Phal. *l. album; Comma; Pallens*, einander sehr ähnlich. (von *Rottemb.*) **)

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1387. Phal. *Pallens*. Nom. *Linn.*

108. *Nivea*, die *Schneeeule*. ***)

Müller l. c. p. 685. no. 108. die *weisse Eule*.

Fabric. S. E. p. 599. no. 39. NOCTUA *nivea*. Nom. *Linn.*

Mül-

*) Mit derjenigen, die *Kleemann* vom *Sauerampfer* (Rumex acetosa) t. 24. erhalten, *einerley*, obschon die Farbe der unsrigen merklich und standhaft unterschieden ist.

**) Die *genaue* Beschreibung der Ph. *Pallens* verdient hergesetzt zu werden:

„Die braunen Adern der Oberflügel sehr fein und blass. Statt des schwarzen Strichs an der Einlenkung nur ein länglicher schwarzer Schatten; der weisse Strich fehlt gänzlich. Nicht weit vom äussern Rande vier *kleine schwarze Punkte*, welche ein ziemlich grosses reguläres Viereck ausmachen, das gegen die Flügel folgende Stellung · ⁚ · hat. Die beyden obersten Punkte sehr klein, kaum sichtbar, die beyden untersten sehr deutlich."

Nach dieser Beschreibung wird es zweifelhaft, ob die *Kleemannische* Eule t. 24. die wahre *Pallens* L. sey.

***) *Nicht abgebildet.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1383. Ph. *nivea.* Nom. *Linn.*

109. *Leporina*, die *Wolleule.*

Müller l. c. p. 685. no. 109. der *Aderpunkt.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 702. Phal. *Leporina*, der *Aderpunkt.*

Etwas ſelten auf *Birken.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 16. t. 1. f. 1. Raupe; f. 2. Puppe; f. 3. *Schmetterling.* (Füeſsl.) *).

Berl. Magaz. III. p. 208. no. 7. Ph. *Leporina*, die *Wollmotte.*

Ganz weiſs, mit verſchiedenen, kurz abgeſetzten irregulären Strichen.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 555. no. 7. Ph. *Leporina*, die *Wollmotte;* das *ganz weiſſe glatte Nachteulchen.*

Naturforſcher XIII. p. 225. no. 2. die *rare gelbe Pudelraupe* — alle Herbſte auf den *Weiden.* (D. *Kühn.*)

Wien. Schmetterl. p. 67. B. *Scheinſpinnerraupen*, Larvae *Bombyciformes; düſtere Eulen*, Ph. N. *Nubilae.*

3) Raupen ſehr lange Haare *ohne Knöpfe.*

No. 8. *Erleneulenraupe* (Betulae Alni); *Erleneule*, Ph. *Leporina.*

 Liſt.

*) Hat daſelbſt, wie auch der Chorherr Meyer, die ganze Verwandlungsgeſchichte dieſer merkwürdigen Phaläne geliefert. Von den Raupen ſagt *Füeſslin:*

„Keiner hat die ſonderbare und ſtandhafte Richtung der *langen Haare* dieſer Raupe bemerkt und angezeigt. Sie laufen nämlich in einem Kreiſe um den Leib der Raupe herum, ſo daſs die der linken Seite vom Kopf bis zum Schwanz mit ihrer Spitze nach dem Hintern, die der rechten Seite aber nach dem Kopfe zu gebogen und gerichtet ſind, t. 1. f. 1.“

Lift. Goed. p. 199. no. 85. f. 85. *)
Degeer Inf. I. Mém. 6. p. 210. t. 12. f. 11-17.

Chenille extrémement velue, d'un jaune de citron ou verdâtre, dont les poils font très-longs, et qui vit fur le *Saule* et fur *l'Aune.*

— — p. 699. t. 12. f. 17.

Phalene à antennes en filets, très-blanche à points et taches noires.

— Tom. II. Part. I. p. 411. no. 3. Phal. *Leporina.*

Phalene à antennes filiformes à trompe, à ailes rabatues en toit evafé blanches avec quelques points et taches noires.

Phalene flocon de laine.

— *Ueberf.* I. 2 Quart. 6 Abh. p. 4. t. 12. f. 11-17.

Die fehr rauche, langhaarichte, zitron- oder grünlichgelbe *Weiden- und Erlenraupe.*

— — 4 Qu. p. 122. t. 12. f. 17.

Ein fehr weifser *Nachtvogel* mit fchwarzen Punkten und Flecken, und fadenförmigen Fühlhörnern.

— — II Th. I B. p. 297. no. 3.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern; einem Saugrüffel, mit flachniederhangenden weiffen Flügeln, die einige fchwarze Punkte und Flecke haben.

Die *Wollflocke.*

110. *Ornatrix*, die *amerikanifche gefchmückte Eule.*

Müller l. c. p. 685. no. 110. das *Feftkleid.*

Fabric.

*) *Goedart* ift der erfte, der diefe Raupe befchrieben und abgebildet hat. *Eruca* haec Alnorum alitur foliis; totum ejus corpus hirfutum, et fetis quafi exiguis ac pilofis obfitum eft.

Fabric. S. E. p. 586. no. 103. BOMB. *Ornatrix.* Nom. *Linn.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. I. p. 51. t. 24. f. 2. — de la *Jamaïque.* — Ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Cramer Pap. exot. II. p. 107. t. 166. Fig. CD. *Foemina.* Fig. F. *Mas* — dans *l'Amérique ſeptentrionale et méridionale.*

Sebae Theſ. IV. t. 39. f. 19. 20.

111. *Jacobaeae*, die *Jakobseule.*

Müller l. c. p. 685. no. 111. die *Jakobäerin.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 703. Ph. *Jacobaeae*, die *Jakobsmotte.* Die Raupe auf dem *Jakobenkraut.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 20. Phal. *Jacobaeae.*

Die jungen *Raupen* mit mehr weiſslichen, zum Theil ſehr langen Haaren beſetzt, als die Erwachſenen (Chorh. *Meyer*).

Berlin. Magaz. III. p. 206. no. 6. Ph. *Jacobaeae*, die *Jakobsmotte.*

Dunkelgrau mit einem rothen Streif am Vorder- und Hinterrande. Die Unterflügel ganz karminroth.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 330. Phal. *Jacobaeae*, *Jakobsmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 268. t. 49. *das ſchöne Jakobsräuplein.*

Linné Reiſe durch Oeland p. 133. Ph. *Jacobaeae.*

Wien. Schmetterl. p. 67. C. *Spindelraupen.* Larvae *Fuſiformes*; *ſchabenartige Eulen*, Ph. N. *Tineiformes.*

No. 12. *Jakobsblumeulenraupe* (Senecionis Jacobaeae); *Jakobsblumeule*, Ph. *Jacobaeae.*

Bekm. Epit. S. L. p. 165. no. 111. Phal. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 378. Ph. *Jacobaeae*, der *Jakobsraupenvogel.*

Cathol. J. p. 12. Ph. *Jacobaeae*, *Jakobsblumeule.*

Syſtem. Natur. du Regn. Anim. II. p. 155. no. 59. *Phalene du Senecon.*

Charlet. Onom. p. 83. *Eruca Jacobaea.*

Petiv. Gazoph. p. 52. t. 33. f. 6.

Phalaena ombrica, linea maculisque ſanguineis.

Derham Phyſico-Theol. l. 8. c. 6. no. 6. *Papilio Jacobea.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 168. no. 26.

Phalaena media, alis exterioribus, colore nigro et ſanguineo variis, extimo duntaxat margine nigro.

— — p. 169. no. 26. *Eruca* glabra ex nigro et flavo annulatim variegata.

Scop. Entom. carn. p. 207. no. 511. Ph. *Jacobeae.*

Long. lin. 8. *Lat.* $4\frac{3}{4}$.

Alae *anticae* canae; linea maculisque binis cinnaberinis. *Poſticae* cinnaberinae, fimbria fuſceſcente, terminali.

Statura *Sphingis Phegeae.*

Fabric. S. E. p. 588. no. 113. BOMBYX *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

Larva ſubpiloſa, atra, flavo-annulata.

Pupa tenuiſſime folliculata, teſtacea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 380. Ph. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1384. Ph. *Jacobaeae.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 146. no. 75.

Pha-

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis ſuperioribus fuſcis, linea punctisque duobus rubris, inferioribus rubris.

La *Phalene Carmin du Senecon.*

Long. 8. lign.

Biblioth. reg. Pariſ. p. 36. f. *omnes.*

112. *Heliconia*, die *Helikonierin.* *)

Müller l. c. p. 685. die *Helikonierin.*

Cathol. H. p. 102. Phal. N. *Heliconia.*

Linn. Muſ. L. V. p. 385. no. 20. Ph. *Heliconia.*

Corpus magnitudine Ph. *Jacobaeae.*

Thorax flavus, a tergo maculatus.

Abdomen flavum trifariam (dorſo et lateribus) fuſco-maculatum.

Antennae et *pedes* fuſci.

Alae primores utrinque ſubfuſcae.

Linea alba, longitudinalis, verſus apicem craſſior, a baſi ad medium alae.

— *poſticae* albae a baſi ad medium, fuſcae a medio ad apicem.

113. *Rubricollis*, der *Purpurhals.*

Müller l. c. p. 685. no. 113. der *Purpurhals.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 704. Phal. *Rubricollis*, der *Rothhals.*

Berlin. Magaz. III. p. 208. no. 8. Ph. *Rubricollis*, der *Rothhals.*

Ganz ſchwarz, mit *einer rothen Halsbinde*, und einer gelben Spitze an dem Hinterleibe.

Wien. Schmetterl. p. 67. C. No. 11. *Aftermooseulenraupe* (Jungermanniae complanatae); *Aftermooseule*, Ph. *Rubricollis.*

 Schaeff.

*) Nicht abgebildet.

Schaeff. Icon. t. 59. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 587. no. 110. BOMBYX *Rubricollis.*

Alis incumbentibus, atra: *collari ſanguineo;* abdomine flavo.

Habitat in Europae *Sylvis.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 42. no. 379. Ph. *Rubricollis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1388. Ph. *Rubricollis.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 148. no. 79. t. 12. f. 6.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis nigricantibus; *collari purpureo*, abdomine flavo.

La *Veuve.*

Long. 8 lign.

114. *Quadra*, der *Vierpunkt.* *)

Müller l. c. p. 686. no. 114. das *Viereck.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 705. der *Vierpunkt.* Phal. *Quadra.*

Bey uns etwas ſelten. Bey *Bern* ſehr häufig auf den Roſskaſtanienbäumen.

Berlin. Magaz. III. p. 208. no. 9. Ph. *Quadra*, die *Stahlmotte.* — p. 420. B.

Das *Weibchen* ſtrohgelb mit zwey ſtahlblauen Flecken; das *Männchen* graugelb mit einem blauen Vorderrande.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 13. no. 13. Phal. *Quadra*, das *Viereck;* der *Würfelvogel;* der *Strohhut.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 110. t. 17. *Weibchen.*

Die graue, gelb- und ſchwarzgeſtreifte haarige *Raupe*, mit rothen Knöpfgen.

Gle-

*) *Linné* hat das *Weibchen* beſchrieben.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 502. no. 3. — p. 647. no. 14. Phal. *Quadra*, die *Stahlmotte.*

Wiener Schmetterl. p. 68. C. No. 1. *Pflaumeneulenraupe* (Pruni domesticae); *Pflaumeneule*, Phal. *Quadra.*

Gladbachs Schmetterl. p. 50. t. 22. f. 5, 6. Ph. *Quadrata foemina;* der *Würfelvogel;* das *Viereck* (Weibchen). *)

Naturforscher III. p. 20. no. 3. das *Männchen* gegen das W. sehr klein, von blassgelbgraulicher Farbe, die nach dem Kopfe und dem Aussenrande der Oberflügel zu ins Schwärzliche oder *Stahlblaue* fällt — hat auch keinen schwarzen Würfelfleck auf den Flügeln (D. *Kühn*).

— IX. p. 111. no. 9. Ph. *Quadra.* (von *Rottemb.*)

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 405. Ph. *Quadra.*

Scop. Entom. carn. p. 210. no. 519. Phal. *Quadra.*

Long. lin. 11½. *Lat.* 4½.

Alae unicolores, anticae lanceolatae, rotundatae, maculis binis cyaneis (*Foemina*).

Variat 1) alis *stramineis*, antennis pedibusque cyaneis.

2) — *cereis.*

3) — *albis.*

— Ann. 5. hist. nat. p. 114. no. 123. Ph. *Quadra.* In *Hungaria* variat margine alarum posticarum

*) *Gladbach* behauptet ohne Grund, *Rösel* l. c. habe das *Männchen*, er aber das *Weibchen* beschrieben und abgebildet. Die Sache ist gerade umgekehrt. Einige Naturforscher behaupten auch, Ph. *complana* L. sey das *Männchen* von Quadra. *Linné* sagt aber von der Complana: der Aussenrand sey weiss.

carum interiore, *macula alae ejusdem*, et *margine exteriore ſubtus*, RUBRIS.

Fabric. S. E. p. 595. no. 19. NOCTUA *Quadra.*

— anticis punctis duobus cyaneis.

Larva piloſa: dorſo punctis rubris maculaque nigro, lateribus lineis nigris.

Pupa folliculata, atra.

Schaeff. Icon. t. 29. f. 9. 10.

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 382. Phal. *Quadra.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 120. no. 1389. Phal. *Quadra.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 154. no. 89.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis flaveſcentibus, ſuperioribus ſingulis punctis duobus fuſcis.

La *Phalene jaune à quatre points.*

Long. 6. lign.

115. *Complana*, der *Flachflügel.* *)

Müller l. c. p. 686. no. 115. der *Flachflügel.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 706. Phal. *Complana*, der *Flachflügel.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 647. no. 15. Phal. *Complana*, die *Randmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 210. no. 10. Ph. *Complana*, die *Randmotte.*

Gelbgrau mit einem *goldgelben Vorderrande*, und dergleichen Unterflügeln.

Wien. Schmetterl. p. 68. C. No. 4. *Pappelbaumeulenraupe* (Populi albae); *Pappelbaumeule.* Ph. *Complana.*

Fabric.

*) Einige halten dies für das *Männchen* von. Ph. *Quadra.*

Fabric. S. E. p. 594. no. 18. NOCTUA *Complana.*

Alis depressis, plumbeis, margine exteriori pallidis —

Varietatem vidi alis *anticis* totis pallidis.

Geoffr. Inſ. II. p. 191. no. 22.

Tinea alis albis, corpori circumvolutis; capite collarique flavis.

Le *Manteau à tête jaune.*

Long. 7 lign. *Larg.* 1⅓ lign.

Réaum. Inſ. I. t. 17. f. 13. 14.

116. *Interrupta*, die *afrikaniſche unterbrochene Schwarzlinie.*

Müller l. c. p. 686. no. 116. der *Fleiſchflügel.*

Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 3. Ph. *interrupta*, die *Unterbrochene.*

Cathol. I. p. 284. Ph. *interrupta.*

Cramer Pap. exot. II. p. 136. t. 185. Fig. E. Ph. *Interrupta.* — *Coromandel.*

3. *Eulen* mit Saugrüſſel, und *Kammrücken* (*Kammſauger*).

117. *Materna*, das *indianiſche Waiſenkind.*

Müller l. c. p. 686. no. 117. das *Waiſenkind.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. II. p. 24. t. 13. f. 4. Ph. *Materna* — de *Bengal.*

— Ses ailes presque quatre pouces.

Cramer Pap. exot. II. p. 118. t. 174. Fig. B. Ph. *Materna* — à *Suriname.*

118. *Sponſa*, die *Braut.*

Müller l. c. p. 687. no. 118. die *Braut.*

Füeßl.

Füeßl. schweiz. Inſ. p. 37. no. 707. Ph. *Sponſa*, die *Braut.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 23. no. 47. Ph. *Sponſa*, die *Braut*, das *Wieskind.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 137. t. 19. *)

Eine zur zweyten Kl. der N. V. gehörige weiſsgrau und braungefleckte, und mit fleiſchernen Spitzen und Warzen ausgezierte *Raupe*, auf dem Eichenlaube.

Wien. Schmetterl. p. 90. X. *geſchmückte Eulen.*

2) mit rothen Unterflügeln.

No. 5. *Rotheicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Rotheicheneule*, Ph. *Sponſa.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 13. Phal. *Sponſa*, *Rotheicheneule.*

Hollar Inſ. t. 8. f. 6. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Sponſa.*

Naturforſcher IX. p. 112. wo der Hr. v. *Rottemb.* auch noch glaubt: *Röſel* I. t. 15. Ph. 2. habe die wahre *Pactam* L.

— *Sponſa* L. *Röſel* IV. t. 19. wird oft mit *Nupta* verwechſelt.

Fabric. S. E. p. 602. no. 51. NOCTUA *Sponſa.* Nom. *Linn.*

Larva nodoſa, dorſo verrucoſo, capite coeruleſcente, corpore variegato.

Pupa folliculata, coeruleſcens.

Geoffr. Inſ. II. p. 150. no. 82.

Pha-

*) Sponſa und Nupta werden häufig verwechſelt; daher hat auch *Scop.* no. 509. bey ſeiner Pacta, welches eigentlich Nupta L. iſt, *Röſels* IV. t. 19. angeführt.

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis; *anticis* cineree-fuſcoque nebuloſis; *inferioribus* rubris, faſcia duplici transverſa, nigra.

La *Likenée rouge.*

Long. 18 lign.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 11. no. 1. 2. 3.

Leche nov. Inſ. ſpec. p. 35. no. 73.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis cinerea; alis inferioribus faſcia purpurea nigraque alterna. f. 10. A. B.

119. *Nupta*, die *junge Frau.* *)

Müller l. c. p. 687. no. 119. die *junge Frau.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 708. Ph. *Pacta*, die *Verlobte.* **)

Bey uns etwas ſelten, *auf Weiden und Linden.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 21.

Phal.

*) Dieſe und die folgende *Pacta* ſind faſt von allen Schriftſtellern verwechſelt, und alle Zitata, welche der erſten gehören, der letzten gegeben worden. Hat doch *Linné* ſelbſt *Röſels* I. N. V. 2 Kl. t. 15. bey beyden angeführt. Die meiſten haben ſich darinn geirrt, daſs ſie die *Röſelſche* Phaläne für die wahre *Pactam* Linn. angeſehen haben, da doch dieſe letztere in Deutſchland entweder gar nicht, oder äuſserſt ſelten anzutreffen iſt. Bey *Petersburg* und in dortigen Gegenden ſoll ſie häufiger ſeyn. Sie iſt der Nupta in allem ſehr ähnlich, hat aber doch einen vom *Linné* ſelbſt richtig angegebenen Unterſcheidungskarakter. Die *Nupta* hat allezeit abdomen canum, ſubtus album, wie beym *Röſel*, *Schäffer*, *Sepp*, und andern, die ſie abgebildet haben; die *Pacta* aber *abdomen ſupra rubrum.* Wer dieſes Merkmal an ſeinem Exemplar findet, der kann ſich rühmen, die wahre *Pactam* L. zu beſitzen. Dieſe iſt auch ein gut Theil *kleiner* als die Nupta, und Herr *Schaller* in Halle ſoll ſie beſitzen.

**) Keine andere, als *Nupta* L. den beygefügten Zitatis zu Folge.

Phal. *Pacta* (Röfels I. N. V. 2. t. 15. Chorh. *Meyer*). (Ebenfalls Nupta.)

Berlin. Magaz. III. p. 210. no. 12. Ph. *Pacta*, die *Schlangenmotte.*

Die *Oberflügel* hellgrau, mit dunkelgrauen Zeichnungen. Die *Unterflügel* roth mit breitem fchwarzen Rande.

Maders (Kleem.) Raupenkalender, p. 12. no. 11. Ph. *Nupta*, die *junge Frau.*

Röfels Infektenbel. I. p. 97. t. 15. die grofse fchlanke erdfarbige *Zapfenraupe.*

Altes Hamb. Magaz. XIIX. p. 116. beygef. K. T. f. 1. 2. 3. Befchr. der *Pappelweidenraupe und ihres Nachtvogels* (*Schulze*).

Der *Hinterleib* mit afch- und dunkelpurpurfarbnen; der ganze Unterleib aber mit *ganz weiffen* wollichten Haaren bedeckt *).

Hollar Inf. t. 4. f. 3. 4. Ph. *Nupta.* (*Naturf.* IX. p. 222.)

Naturforfcher IX. p. 112. no. 10. Phal. *Pacta.* **)

Wien. Schmetterl. p. 90. No. 4. *Bachweideneulenraupe* (Salicis vitellinae); *Bachweideneule*, Ph. *Nupta.*

Fifchers N. G. von Livl. p. 153. no. 362. Ph. *Nupta*, die *Verlobte.*

Allgem. deutfche Biblioth. XXVI. p. 11.

Nach

*) Alfo keine von der *Röfelfchen* verfchiedene Gattung, wie der V. meint, fondern nach Linn. Karakter: Abdomine cano, fubtus albo, oder die wahre *Nupta.*

**) Hierbey fagt Hr. v. *Rottemb.* ganz richtig: dafs *Hufnagel* unter feiner Pacta die *Linnéifche Nupta* befchrieben habe; zugleich verfichert er: dafs die wahre *Pacta* L. aufserordentlich felten fey, und er felbige noch nie gefehen habe; es fey aber die *Röfelfche* I. N. V. 2. t. 15. worinn fich diefer grofse Kenner geirrt hat.

Nach *Bernoullis* Bemerkungen ſoll das Weibchen derſelben Eyer legen, aus welchen ohne Befruchtungen *junge Raupen* kommen *).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 648. no. 16. Phal. *Pacta*, die *Schlangenmotte* (Hufnag. alſo *Nupta*).

Raj. Hiſt. Inſ. p. 152. no. 4.

Phalaena magna pulcherrima, alis longis, exterioribus cinereo et nigro, interioribus nigro et rubro ſeu phoeniceo coloribus variis.

Scop. Entom. carn. p. 206. no. 509.

Phalaena *Pacta.* **)

Long. Unc. 1. et lin. 6. *Lat.* 10½.

Alae crenatae; *anticae* cineraſcentes, faſciis undatis fuſcis; *poſticae* cinnaberinae, faſciis duabus nigricantibus. — *Corpus cinereum.*

Fabric. S. E. p. 602. no. 52. NOCTUA *Nupta.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 151. f. 1. 2.

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 33. t. 7. het *Roode Weeskind.*

Cramer Pap. exot. I. p. 53. t. 33. Fig. BC. Ph. *Ilia* ***) — de la *Jamaïque.*

Merian. Europ. p. m. 71. t. 139.

La Chenille s'eſt nourrie de *Saule*, jusqu'au vingt deuxieme de Juillet; — le troiſieme d'Août il en ſortit un beau Papillon nocturne *gris et rouge.* †)

120. *Pa-*

*) Ihre Raupe iſt den Schlupfweſpen aber ſehr unterworfen. S. *Röſels* I. N. V. 2. p. 99. Note **).

**) Alſo auch keine andere, als die *Nupta.*

***) Die Kramerſche hat viel ähnliches mit der Nupta, obgleich dabey *Pacta* L. zitirt iſt. Das Abdomen iſt völlig *cinereum*, alſo nicht die wahre *Pacta* L.

†) Abermal *Nupta* L.

120. *Pacta*, die *Verlobte.* *)

Müller l. c. p. 687. no. 120. die *Verlobte.*

Wien. Schmetterl. p. 90. No. 3. *Baumweideneulenraupe* (Salicis albae).

La *Chenille lichenée. Réaum. Baumweideneule,* Ph. *Pacta.*

L' *Orpheline rouge. Seba* **).

— — p. 78. (*)

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 13. Phal. *Pacta.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 392. Ph. *Pacta.*

Fabric. S. E. p. 602. no. 53. NOCTUA *Pacta.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 384. Ph. *Pacta.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1392. Ph. *Pacta.* Nom. *Linn.*

121. *Pronuba*, die *Lichteule.* ***)

Müller l. c. p. 687. no. 121. die *Hausmutter.*

Füeßl.

*) S. meine Anmerk. bey *Nupta.*

Gesetzt, daſs die *Linnéiſchen* beyden Zitata mit Abbildungen: *Alb.* Inſ. 80. *Wilk.* Pap. 17. t. 2. b. 1. die wahre *Pactam* L. bezeichneten, ſo wäre ſie denn doch noch von keinem *vaterländiſchen Schriftſteller abgebildet.*

**) Ich vermuthe ganz ſicher, daſs die *Chenille lichenée* des *Réaumur,* und l' *Orpheline rouge* des *Seba* keine andere, als *Nupta* L. ſey, welche *Sepp* auch das *Roode Weeskind* nennt.

***) Fliegt beſonders des Abends gern nach dem Lichte. Der *Flügelſtaub* iſt unter dem Mikroſkop ſehr ſehenswürdig. Sie iſt der Phal. *Domiduca Hufnagels* ſehr ähnlich; ſ. *Berl. Mag.* III. p. 404. no. 81. wie auch deſſen *Orbona* no. 57. nur iſt dieſe letztere viel kleiner. S. *Naturf.* IX. p. 125.

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 709. Ph. *Pronuba*, die *Brautjungfer.*

Die Raupe wohnt gern in *Gärten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 21. Phal. *Pronuba.* Raupe auf dem *Lattich.* (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Magaz. III. p. 210. no. 11. Ph. *Pronuba*, der *Läufer.*

Die *Oberflügel* dunkelbraun, bisweilen grau, mit einem nierenförmigen ſchwarzen Flecke; die *Unterflügel* gelb mit ſchwarzem Rande.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 11. no. 7. Ph. *Pronuba*, die *Hausmutter*; der Läufer.

Friſch Inſ. X. p. 17. no. 15. 3 Pl. t. 15.

Von der koffeebraunen *Erdraupe* mit ſchwarzen Strichen neben auf ſieben Abſätzen.

Röſels Inſektenbel. IV. p. 217. t. 32. die zu der N. V. 2 Kl. gehörige grünlichgelbe *Raupe*, mit abgeſetzten ſchwarzen Strichen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 746. no. 11. Ph. *Pronuba* der *Läufer.*

Wien. Schmetterl. p. 79. M. *Seitenſtreifraupen*, Larvae *Albilateres; ſchwarzgezeichnete Eulen*, Ph. N. *Atroſignatae.*

3) mit *ſchwarzen Punkten* am Auſsenwinkel, und gelben ſchwarzgerändeten *Unterflügeln.*

No. 20. *Sauerampfereulenraupe* (Rumicis acetoſae).

La Chenille de l'Oſeille. *Réaum. Sauerampfereule.* Ph. *Pronuba.*

La *Proſerpine. Seba.*

Der *Dronth. Geſellſch.* Schr. IV. p. 282. no. 38. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 121. Phal. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 60. *Phalene* du Senecon, de l'Oreille d'Ours etc.

Act. Vpsal. 1736. p. 124. no. 60.

Papilio alis depressis griseis, obscure maculatis, inferioribus flavis, margine nigro.

Raj. Hist. Ins. p. 237. no. 18.

Phalaena maior, alis praelongis, *exterioribus* vel rufis, vel ex cinereo-nigricantibus; *interioribus* fulvis cum fascia lata nigra prope imum marginem.

Schaeff. Icon. t. 196. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 210. no. 518. Phal. *Pronuba.*

Long. lin. 11. *Lat.* 5.

Alae *anticae* pallide-cervinae, macula rotunda, media, fusca, punctisque binis didymis atris prope apicem; *posticae* paleaceae, fascia nigra submarginali.

Poda Mus. graec. p. 90.

Fabric. S. E. p. 603. no. 55. NOCTUA *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Larva virescens, lineis dorsalibus duabus nigris, interruptis.

Pupa nuda, rubra.

Imago alarum anticarum colore valde variat.

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 385. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1393. Ph. *Pronuba.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Ins. II. p. 146. no. 76.

Phalaena seticornis spirilinguis, alis incumbentibus, *exterioribus* caesiis nebulosis; *interioribus* luteis, fascia atra marginali.

La *Phalene-hibou.* *Long.* 1 pouce.

Merr. Pin. p. 198. no. 5.

Pha-

Phalaena maior cum exterioribus alis fuſcis, internis aureis, nigra linea fimbriatis.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 37. f. *omnes.*

Degeer Inſ. I. Mém. 3. p. 109. t. 5. f. 17. 18.

Chenille raſe, aſſez groſſe, brune, avec deux petits traits noirs ſur chaque anneau, et à trois rayes jaunâtres, qui vit de pluſieurs eſpeces de plantes.

— II. Part. I. p. 399. no. 1.

Phalene à antennes filiformes à trompe, à ailes croiſées brunes ou griſes, dont les inférieures ſont jaunes bordées d'une bande noire; *la grande eſpece.*

Grande Phalene-hibou.

— *Ueberſ.* I. 3 Abh. I Qu. p. 85. t. 5. f. 17. 18.

Die glatte, braune, ziemlich dicke und auf allerley Kräutern lebende *Raupe*, mit zwo kleinen ſchwarzen Linien auf jedem Ringe, und drey gelblichen Streifen.

— — p. 87. not. †. Phal. *Pronuba*, der *Läufer;* die *Hausmutter.*

— II Th. I B. p. 288. no. 1.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, braunen oder grauen gekreuzten Flügeln, und gelben, mit einer ſchwarzen Binde eingefaſsten Unterflügeln. *)

Die *groſse Nachteule.*

122. *Paranympha*, die *Brautjungfer.*

Müller l. c. p. 687. no. 122. die *Brautjungfer.*

*) Noch eine Merkwürdigkeit von den *Raupen.* Sie kommen nie bey Tage, ſondern nur des *Nachts* hervor, und freſſen die Kräuter ab. Man kann ſie leicht bey der Laterne finden. Eine Regel für die Gärtner. Sie überwintern auch in der Erde.

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 710. Phal. *Paranympha*, die *Brautführerinn.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 21. Phal. *Paranympha.*

Die groſse ſchlanke, graue *Raupe*, mit einem kleinen fleiſchernen Hörnchen auf dem achten Abſatze. — Auf einem *Zwetſchgenbaume.* (Chorh. *Meyer.*)

— — p. 270. t. 3. f. A B. *Raupe* und *Puppe*, (Füeſsl.) auf einem *Weiſsdornſtrauch.*

Berlin. Magaz. II. p. 406 no. 82. Phalaena *Manturna*, die *Spitzmotte.*

Hellgrau, mit Dunkelgrau gezeichnet, ſo zum Theil in auslaufenden Spitzen beſtehet. Die *Unterflügel* oraniengelb mit zwo ſchwarzen Binden.

Naturforſcher IX. p. 136. no. 82. Ph. *Manturna*, iſt Ph. *Paranympha* L. (von *Rottemb.*)

— XIV. p. 88. t. 4. f. 8. 9. Beſchreibung der *Raupe und Puppe* der Ph. *Paranympha* (Capieux).

Röſels Inſektenbel. IV. p. 132. t. 18. f. 1. 2.

Ein zur N. V. 2 Kl. gehöriger *Nachtpapilion*, mit oraniengelben und ſchwarzbezeichneten *Unterflügeln.*

Wien. Schmetterl. p. 91. X. *Geſchmückte Eulen.*

3) mit gelben Unterflügeln, faſt ungezähnt.

No. 7. *Unbekannte Raupe. Zackenfleckichte Eule*, Ph. *Paranympha.*

Gladbachs Schmett. p. 70. §. 2. das *gelbe Ordensband.*

Scop. Entomol. carn. p. 206. no. 510. Phal. *Fulminea.*

Long. lin. 11½. *Lat.* 6½.

Alae

Alae *anticae* pallide cervinae, fascia macula lunata media, lineaque transversa fulminis ad instar propagata, nigris; *posticae* paleaceae, fasciis duabus fuscis.

Fabric. S. E. p. 603. no. 56. NOCTUA *Paranympha.*

Cristata, alis planis; *anticis* fuscis, strigis angulatis, albis nigrisque; *posticis* flavis, fasciis duabus arcuatis, atris.

Drury Illustr. of nat. hist. I. p. 49. t. 23. f. 6. — de la *nouvelle York.* — Ses ailes *deux pouces* *).

123. *Fimbria*, die *besäumte Eule.*

Müller l. c. p. 688. no. 123. der *Saumfleck.*

Füeßl. schweizer. Inf. p. 37. no. 711. Phal. *Fimbria,* der *Saumfleck.*

Naturforscher IX. p. 90. t. 1. f. 3. Von einer *gefräßigen Erdraupe.*

— Mit *olivengrünen* Oberflügeln, und viel *breitere dunkle indigblaue* Binde der *Unterflügel.*

Schriften der Berlin. Gesellsch. Naturf. Freunde I. p. 297. t. 8. f. 1-3.

Etwas von der Naturgeschichte der Ph. *Fimbria Linn.* (*Bergsträßer*).

Phalaena Noctua *Parthenii*, alis deflexis, *anticis* griseo-fusco-viridique undatis, binisque in disco maculis, altera reniformi; *posticis* aurantiacis, fascia nigra submarginali et latiore.

Schreber nov. spec. Inf. p. 13. no. 10. f. 9. Phalaena (*Fimbriata*) seticornis spirilinguis, alis superioribus virente-carneis, inferioribus fulvis, fascia nigra marginali.

Halae *in der Heide* in betula.

*) Ganz der Habitus der *Paranympha* mit allen Karakteren, sogar den beyden Ohrflecken auf den Oberflügeln; nur die Farben derselben dunkelschwärzlich, purpurfarbig.

Wien. Schmetterl. p. 78. M. No. 18. *Schlüsselblumeulenraupe* (Primulae Veris); *Schlüsselblumeule*, Ph. *Fimbria.*

Fabric. S. E. p. 603. no. 57. NOCTUA *Fimbria.* Nom. *Linn.*

124. *Maura*, der *mauritanische Zahnflügel.*

Müller l. c. p. 688. no. 124. der *Zahnflügel.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 37. no. 722. Phal. *Maura.*

Bey uns etwas *selten.*

Wien. Schmetterl. p. 90. X.

1) mit schwärzlichen Unterflügeln.

No. 1. *Unbekannte Raupe; dunkelolivenbraune Eule*, Phal. *Maura.*

Naturforscher VI. p. 112. t. 5. f. 1. Lemur, das *Gespenst* (Meineke) *).

Gladbachs Schmetterl. p. 25. t. 12. f. 3. 4. das *schöne große schwarze Kind;* **) der *Bachvogel;* der *Schiffvogel;* das *Gespenst.*

Gern an den *Wasserbächen* im *Junio und Julio.*

Schaeff. Icon. t. 1. f. 5. 6.

Fabric. S. E. p. 604. no. 61. NOCTUA *Maura.*

Cristata, alis incumbentibus, *dentatis*, cinereo nigroque variis, subtus margine albo.

In *Anglia frequens.*

125. *Fra-*

*) Hr. *Meineke* sagt unter andern p. 114. Ph. *Nupta* kenne er nicht. Es habe zwar *Linné* dabey auf *Rösels* IV. t. 15. verwiesen; der Augenschein aber lehre, dass sie daselbst nicht abgebildet sey. Hr. M. hat sich hier durch einen Druckfehler im *Linné* irre machen lassen. Denn es muss heissen: *Rösel* I. Ph. 2. t. 15. Und das ist nach der *Linnéischen* Beschreibung Ph. *Nupta* ausser allem Streit.

**) Zum Unterschied des *kleinen schwarzen Kindes*, *Rösel* I. N. V. 2 Kl. t. 56. *Typica* L.

125. ***Fraxini***, das *blaue Ordensband.*

Müller l.c. p. 688. no. 125. das *blaue Band.*

Füeßlins ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 713. das *blaue Band. Selten.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 190. t. 28. f. 1. (*Weibchen.*)

Der zur 2 Kl. N. V. gehörige, auſserordentlich groſse *Papilion*, mit grau gewäſſerten *Oberflügeln*, und hellviolettblauen und ſchwarzen *Unterflügeln.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 342. Ph. *Fraxini*, die *eigentliche Eſchenraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 90. No. 2. *Eſchenraupeneule* (Fraxini excelſioris); *Eſcheneule*, Ph. N. *Fraxini.* Auch auf den *ſchwarzen Pappelbäumen.*

L'*orpheline bleue. Seba.*

Naturforſch. XIV. p. 54. t. 2. f. 4. *Raupe.* (D. *Kühn.*)

Gladbachs Schmetterl. p. 69. t. 31. f. 1-5. Ph. *Fraxini* (*Männchen*).

Das *blaue Ordensband* mit ſeiner *Raupe*, *Geſpinnſt und Puppe.*

Eine *Waldraupe.*

Harriſ. t. 31. fig. d. e.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 369. Ph. *Fraxini.**)

Fabric. S. Ent. p. 602. no. 54. NOCTUA *Fraxini.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 151. no. 83.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, ſuperioribus cinereo fuſcoque undulatis, inferioribus nigris, faſcia transverſa coerulea.

La *Likenée bleue.*

Long. 2 pouces.

*) Es iſt falſch, wenn hierbey auf die Abbildung im 18ten B. des alten *Hamb. Magaz.* verwieſen wird. Denn dies iſt *Nupta L.* wie ſchon die *Raupe mit dem Rückenzapfen* beweiſet.

126. *Chryſitis*, die *Goldeule.* *)

Müller l. c. p. 688. no. 126. der *Kupferflügel.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 37. no. 714. die *Goldeule.* Ph. *Chryſitis.*

Etwas *ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 212. no. 13. Phal. *Chryſitis*, der Meſſingglanz.

Iſt auf den *Oberflügeln* ſo glänzend wie Meſſing, mit einer breiten gelbbraunen gewäſſerten Binde.

Wiener Schmetterl. p. 92. Z. *Halbſpannraupen*, Larvae *Semigeometrae; reiche Eulen*, Phal. N. *Metallicae.*

1) von mittlerer Gröſse.

No. 2. *Hanfneſſeleulenraupe* (Galeopſidis Tetrahit.); *Hanfneſſeleule.* Ph. N. *Chryſitis.*

Naturforſcher VI. p. 79. t. 3. f. 5. *Raupe;* f. 6. *Vogel.*

Von der *Raupe des Meſſingvogels.* (D. *Kühn.*)

— — IX. p. 112. no. 13. Ph. *Chryſitis.*

Die *Raupe* hat nur *zwey Paar Bauchfüße*, und gleicht ſehr der *Raupe* von Ph. *Gamma* (von *Rottemb.*).

— — X. p. 93. Ph. *Chryſitis.*

Die *Raupe* ſelten auf Neſſeln; häufiger unter den Blättern der *groſſen Kletten* (von *Scheven*).

Gladbachs Schmett. p. 9. t. 3. f. 5. 6. 7. f. 5. *Männchen;* f. 6. *Weibchen.*

Ph. *Chryſitis*, der *Meſſingglanz;* der *Meſſingvogel.*

Leske

*) *Röſel* hat dieſe Phaläne gar nicht. Daher iſt das Zitatum im *Linné: Röſel* I. Ph. 2. t. 31. oder 32. falſch. Denn erſtere iſt *Atriplicis*, die 2te *oleracea* L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 461. no. 14. die *Goldeule.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 182. no. 45.
Phalaena media; alis exterioribus duplici arcu transverſo, *viridi - aurato*, ſerici inſtar ſplendente, inſignibus.

— — p. 183.
Eruca Geometra maiuscula, coloribus coeruleo - viridi et albicante varia.

Syſt. *Nat.* du Regn. Anim. II. p. 157. no. 65. *Phalene de la Menthe.*

Scop. Ent. carn. p. 210. no. 517. Ph. *Chryſitis.*
Long. $6\frac{1}{3}$. *Lat.* $4\frac{1}{2}$. lin.
Alae murinae; anticis faſciis binis *orichalceis.*

Fabric. S. E. p. 606. no. 69. NOCTUA *Chryſitis.*
Criſtata; alis deflexis, *orichalceis*, margine faſciaque griſeis.
Larva ſolitaria, gibboſa, viridis albo - ſtriata.
Pupa fuſca.

Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 386. Phal. *Chryſitis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1394. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 101. f. 2. 3.

Sepp Nederl. Inſ. V. p. 7. t. 1. f. 7 — 12.
De *Goud - Vlinder;* het *Koper - Kappelletje.*

Geoffr. Inſ. II. p. 149. no. 81.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis ferrugineo - fuſcis, faſcia duplici transverſa viridi-aurea.
Le *verd - doré.*
Long. 8. lign.

Degeer

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 428. no. 2. *)

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun clair griſeâtre, traverſées par *deux bandes dorées verdâtres.*

Phalene à bandes dorées.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 311. no. 2.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und hellbraunen graulichen niederhangenden Flügeln, und *zwo goldgrünlichen Queerbinden.*

Die *Phaläne mit Goldbinden.*

127. *Gamma*, die *Gammaeule.*

Müller l. c. p. 688. no. 127. der *goldne Buchſtabe.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 37. no. 715. das *griechiſche Gamma.*

Bey uns *ſehr häufig.*

Friſch Inſ. V. p. 37. no. 15. 2 Pl. t. 15.

Von dem *grünen Ausſpanner* mit den 6 weiſſen Rückenfäden und dem weiſſen Saum an der Seite, und mit den ſchwarzen Backenſtreifen.

Berlin. Magaz. III. p. 212. no. 14. Ph. *Gamma*, das *Ipſilon.*

Glänzend ſchwarzgrau, gelblich marmorirt mit einem *griechiſchen Gamma* oder *lateiniſchen Ipſilon.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 20. t. 5. Die dicke grasgrüne und weiſsgeſtreifte *Spannenraupe.*

— — p. 24. der *Piſtolenvogel;* der *Gammavogel.*

Na-

*) Der V. hat ſich darinn geirret, daſs er dabey *Geoffr.* II. p. 159. no. 97. Le *volant doré* zitirt hat; denn das iſt nicht *Chryſitis*, ſondern *Atriplicis* L.

Naturforscher VI. p. 79. die *Raupe* sehr gleich der Raupe der Ph. *Chrysitis*.

Wien. Schmetterl. p. 93. No. 5. *Zuckererbseneulenraupe* (Pisi sativi).

La Chenille de Legumes. *Réaum.*

Zuckererbseneule. Ph. N. *Gamma.*

Neueste Mannichfalt. IV. p. 334.

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 371. Ph. *Gamma*, das *weisse griechische Gamma.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 127. Ph. *Gamma.* Nom. *Linn.*

System. Natur. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 63.

Le *Lamda;* le *Gamma doré.*

Raj. Hist. Inf. p. 163. no. 16.

Phalaena e mediis minuscula, alis exterioribus cinereo et nigricante colore variis, media parte linea alba, y litteram aliquatenus referente, notatis.

Scop. Ent. carn. p. 212. no. 523. Ph. *Gamma.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5.

Alae anticae *Gamma graeco* albo inscriptae.

Larva virens villosula: lineis 2 dorsalibus pallidioribus. Pedibus pectoralibus 6; abdominalibus 4; caudalibus 2. *Subgeometra.*

— . Ann. 5. hist. nat. p. 115. no. 125. Phal. *Gamma.*

Vel *Sphinx*, vel media sane inter *Sphinges* et *Phalaenas;* fugit enim Nectar ex floribus *expansis alis*, nec illis insidet.

Fabric. Syst. Ent. p. 607. no. 72. NOCTUA *Gamma.* Nom. *Linn.*

Larva geometra, dodecapoda, viridis; striis dorsalibus albis, laterali flava, capite fusco.

Pupa folliculata, brunnea.

Schaeff. Icon. t. 84. f. 5.

Sepp Nederl. Inf. V. p. 1. t. 1. f. 1-6. De *Gamma-Vlinder.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 388. Phal. *Gamma.* Nom *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1395. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 156. no. 92.

Phalaena feticornis fpirilinguis, alis deflexis; exterioribus *Lambda graeco* infcriptis.

Le *Lambda.* λ.

Long. 9 lign.

Act. Upf. 1763. p. 25. no. 68.

Papilio alis depreffis, littera y aurea infcriptis.

Biblioth. Reg. Parif. p. 31. f. *omnes.*

128. *Circumflexa,* der *Krummftrich.* *)

Müller l. c. p. 689. no. 128. der *Krummftrich.*

Wiener Schmetterl. p. 93. No. 4.

Schafgarbenkrauteulenraupe (Achillaeae Millefolii); *Schafgarbenkrauteule,* Phal. *Circumflexa.*

129. *Interrogationis,* das *Fragezeichen.*

Müller, l. c. p. 689. no. 129. das *Fragezeichen.*

Füeßl. fchweiz. Inf. p. 38. no. 716. Ph. *Interrogationis,* das *Fragezeichen.*

Bey uns *fehr felten.*

Berlin. Magaz. III. p. 212. no. 15. Ph. *Interrogationis,* das *Fragezeichen.*

Ift dem *Gamma* ähnlich, nur dafs der filberfarbige Fleck ein Fragezeichen vorftellt.

Wien.

*) *Nicht abgebildet.*

Wien. Schmetterl. p. 93. No. 3.

Brennnesseleulenraupe (Vrticae urentis); *Brennnesseleule*, Ph. N. *Interrogationis*.

Cathol. I. p. 283. Ph. *Interrogationis*.

Fabric. S. E. p. 607. no. 73. NOCTUA *Interrogationis*. Nom. *Linn.*

130. *Jota*, die *Jotaeule*.

Müller l. c. p. 689. no. 130. das lange J.

Füeßl. schweizer. Ins. p. 38. no. 717. Phal. *Jota*, das *griechische Jota*.

Naturforscher X. p. 94. t. 2. f. 5. 6. Ph. *Jota*. (von *Scheven*.)

Cathol. J. p. 324. Ph. *Jota*.

Fabric. S. E. p. 608. no. 76. NOCTUA *Jota*. Nom. *Linn.*

Larva dodecapoda, nuda, viridis, albomaculata.

Cramer Pap. exot. II. p. 106. t. 165. Fig. C. Ph. *Jota* — en *Virginie*. *)

131. *Festucae*, die *Schwingeleule*.

Müller l. c. p. 689. no. 131. t. 22. f. 7. der *Sumpfschwingel*.

Berlin. Magaz. III. p. 214. no. 16. Phal. *Festucae*, der *Goldglanz*.

Goldglänzend, gelblichbraun mit drey silberglänzenden Flecken auf jedem Oberflügel.

Wien. Schmetterl. p. 92. No. 1. *Schwingeleulenraupe* (Festucae fluitantis); *Schwingeleule*, Phal. *Festucae*.

Klee-

*) Das Jota ist gröſser, und wie ein weiſser Haken; die Flügel buntſcheckiger; ſonſt viel ähnliches mit dem *Linnéiſchen* J.

Kleemanns Beytr. I. p. 251. t. 30. Fig. A.

Der zur 3ten Kl. gehörige prächtige zimmetbraune, mit Gold und Silber gezierte Papilion.

Fabric. S. E. p. 607. no. 71. NOCTUA *Festucae.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 387. Phal. *Festucae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1397. Ph. *Festucae.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 429. no. 3. *Phalene dorée à taches argentées.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues mêlées de brun et de jaune doré avec trois taches argentées.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 312. no. 2. Ph. *Festucae*, die *Goldphaläne mit Silberflecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, Rückenkamm, und niederhangenden, goldgelben, braunmelirten Flügeln, mit drey Silberflecken.

132. *Meticulosa*, die *Scheueule.*

Müller l. c. p. 689. no. 132. der *Achatflügel.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 38. no. 718. Ph. *Meticulosa*, die *Scheueule.*

Bey uns *etwas selten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 23. Ph. *Meticulosa.*

Raupe verwandelt sich ohne einiges Gewebe (Chorh. *Meyer*).

Berlin. Magaz. III. p. 214. no. 17. Ph. *Meticulosa*, das *einfache Dreyeck.*

Die *Oberflügel* theils grünlich, theils röthlich, theils okergelb, mit einem dreyeckigen kupfer-

kupferfarbenen Fleck; die *Unterflügel* weiſs und röthlich glänzend.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 9. no. 1. Ph. *Meticuloſa*, der *Achatflügel*.

Röſels Inſektenbel. IV. p. 65. t. 9.

Die von verſchiedenen Pflanzen ſich nährende, glatte und grüne *Raupe*, mit braunem Kopf, weiſser unterbrochener Rückenlinie, gelben Punkten, und gleichfarbiger Seitenlinie.

Naturforſch. IV. p. 127. wo Hr. *Kleem.* anmerkt, daſs die dem ſ. *Röſel* überſchickte Abbildung der *Raupe* fehlerhaft geweſen ſey.

Wiener Schmetterl. p. 83. P. *Schrägſtrichraupen*, Larvae *Obliquoſtriatae*; *dreyeckmacklichte Eulen*, Ph. N. *Trigonophorae*.

No. 1. *Mangoldeulenraupe* (Betae vulgaris); *Mangoldeule*, Ph. *meticuloſa*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 14. Ph. *Meticuloſa*.

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 383. Ph. *Meticuloſa*.

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 132. Phal. *Meticuloſa*. Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 143. no. 7. Le *Timide*, ou *Craintif*, Ph. *meticuloſa*.

Goed. Belg. I. p. 109. t. 56. *Gall.* Tom. II. t. 56. La *Craintive*.

Liſt. Goed. p. 118. no. 44. t. 44.

Ob ſingularem timiditatem hanc Erucam *Meticuloſam* nominavi.

Scop. Ent. carn. p. 207. no. 512. Ph. *meticuloſa*.

Long. lin. 11. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.

Alae ſubdentatae; *anticae* triangulo intra triangulum; utriusque baſi craſſiori margini impoſita.

Fabric. S. E. p. 608. no. 78. NOCTUA *meticulosa.*
Criſtata, alis deflexis, eroſo-dentatis, pallidis; *anticis* baſi incarnata, *triangulo fuſco.*
Larva nuda, viridis; linea dorſali interrupta lateralibusque albis.
Pupa folliculata, fuſca, poſtice rubra.
Mülleri Faun. Fridr. p. 43. no. 383. Ph. *meticulosa.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1398. Ph. *meticulosa.* Nom. *Linn.*
Geoffr. Inſ. II. p. 151. no. 84.
Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis, margine eroſis, cinereo-fuſcis, ſuperioribus triangulo marginali fuſceſcente incarnatum includente; thorace gibbo.
La *meticuleuſe.*
Long. 10. lign.
Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 3. p. 102. t. 5. f. 12-14.
Chenille raſe aſſez grande, d'un beau verd avec trois raies longitudinales blanches, qui mange les feuilles de différentes plantes cultivées dans les jardins.
— — p. 698. t. 5. f. 14.
Phalene à antennes en filets, d'un gris blanchêatre, à double tache triangulaire d'un verd obſcur.
— Tom. II. Part. I. p. 427. no. 1. Ph. *meticulosa*; Phalene *meticuleuſe.*
Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé; à ailes rabatues découpées griſes à nuances d'un brun verdâtre, et traverſées par une grande tache triangulaire verdâtre, qui renferme un triangle couleur de chair.
— *Ueberſ.* I. 3 Abh. 1 Qu. p. 80. t. 5. f. 12-14.

Die

Die ziemlich groſse, glatte und grüne *Raupe*, mit drey weiſſen längsgehenden Rückenlinien, auf verſchiedenen Pflanzen.

Degeer Ueberſ. 4 Qu. p. 121. t. 5. f. 14.

Ein grauweiſslicher *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und einem doppelten dreyeckigen dunkelgrünen Flecke.

— II Th. I B. p. 310. no. 1. Ph. *meticuloſa*, die *Furchtſame*.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und grauen niederhangenden, braungrünlich ſchattirten, ausgezackten Flügeln, mit einem groſsen weiſſen grünlichen dreyeckigen Queerfleck, der ein fleiſchfarbiges Dreyeck in ſich ſchlieſst.

133. *Abſinthii*, die *Wermutheule.*

Müller l. c. p. 690. no. 133. der *gevierte Punkt.*

Füeßlins ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 719. Ph. *Abſinthii*, die *Wermutheule.*

Berlin. Magaz. III B. p. 416. no. 100. Ph. *Punctigera*, der *punktirte Mönch.*

Aſchgrau, mit vielen kleinen braunen Flecken, Strichen und Punkten, und einem weiſsgraulichen Fleck, woran in jedem zwey kleine braune Vierecke ſtehen.

Naturforſcher IX. p. 142. no. 100. Ph. *Punctigera*, iſt die Ph. *Abſynthii* L. (von *Rottemb.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 77. no. 220. Phal. *Abſynthii*, der *gevierte Punkt.*

Friſch Inſ. VII. p. 19. 2 Pl. t. 12. Von der *Wermuthraupe* und ihrem Papilion.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 303. t. 61. die *buntgefleckte Wermuthraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 73. I. *Tygerraupen*, Larvae *Variegatae; kappenhalſigte Eulen*, Ph. N. *Cucullatae.*

1) Raupen, weiſs mit Rothgrün.

No. 1. *Wermutheulenraupe* (Artemiſiae Abſynthii); *Wermutheule*, Ph. *Abſynthii.*

Goed. La *Graviſante.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 153. no. 363. *Gevierter Punkt*, Ph. *Abſynthii.*

Cathol. G. p. 261. *Graviſante.*

Fabric. S. E. p. 610. no. 86. NOCTUA *Abſinthii.*

Criſtata, alis deflexis, canis, faſciis punctisque in tetragonum poſitis, nigris.

Larva viridis, maculis flavis rufisque lineata.

Pupa folliculata, brunnea, antice viridis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 394. Ph. *Abſynthii.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1399. Ph. *Abſynthii.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 158. no. 95.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis albido-cinereis, lineis longis nigris.

L'*iota.*

Long. 9. lign.

134. *Alni*, die *Rudereule.* *)

Müller l.c. p. 690. no. 134. das *Doppelfeld.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 720. Ph. *Alni*, das *Kolbenhorn.*

Bey uns ſelten auf den *Linden.*

Die

*) Dieſe haben die *Wiener Entomologen* gar nicht. *Degeer* hat zuerſt ihre Raupe bekannt gemacht.

Die *Raupe* ſchwarz mit gelben Rückenſchilden, und langen ſchwarzen *Haaren*, die am Ende ein *Kölbchen* haben.

Füeſſl. Magaz. der Entomol. II. p. 43.

Die *Raupe* wenigen bekannt (Chorh. *Meyer*). t. 1. f. 5. *Raupe* (Füeſsl.) f. 6. der Kopf etwas vergröſsert; f. 7. der fünfte Abſatz etwas vergröſsert; f. 8. die *Phaläne.*

Naturforſcher XII. p. 58. t. 1. f. 14. 15. 16. *Raupe*, *Puppe*, *Vogel*; Ph. *Alni*, das *Kolbenhorn*; der *Ruderfalter* *) (*Capieux*).

— XIV. p. 91. Nachtrag von *Capieux* t. 4. f. 11. Ph. *Alni* noch einmal, *vorzüglich ſchön.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 8. p. 280. t. 11. f. 25-28.**)

Chenille noire, à treize grandes taches ovales jaunes ſur le dos, qui eſt garnie de *poils ſinguliers en forme d'avirons*, et qui mange les feuilles de *l'Aune.*

— — p. 699. t. 11. f. 28.

Phalene à antennes en filets, d'un cendre noirâtre, à deux grandes taches blanchâtres ſur chaque aile ſupérieure.

— Tom. II. Part. I. p. 412. no. 6.

Phalene à avirons.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un cendré noirâtre, avec deux taches d'un blanc ſale, et quelques traits longitudinaux noirs, dont les ailes inférieures ſont blanches.

*) An *Füeſſl.* abgebildeter *Raupe* ſtehen die ruderartigen Haare natürlicher.

**) Fig. 26. ein ſehr vergröſsertes *ruderförmiges Haar* mit Längsſtreifen.

Degeer Uebers. I. 8 Abhandl. 2 Qu. p. 54. t. 11. f. 25 - 28.

Die schwarze *Erlenraupe* mit dreyzehn grossen, gelben, ovalen Rückenflecken, und ganz sonderbaren *ruderförmigen Haaren.*

— — 4 Qu. p. 122. t. 11. f. 28.

Ein aschgrauschwärzlicher *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zween grossen weisslichen Flecken auf jedem Oberflügel.

— II Th. I B. p. 299. no. 6. der *Ruderfalter.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, aschgrauschwärzlichen niederhangenden Flügeln, mit zween weissgraulichen Flecken, und einigen schwärzlichen längst herunterlaufenden Strichen und weissen Unterflügeln.

135. *Psi*, das *griechische Psi.*

Müller l. c. p. 690. no. 135. das *griechische* Ψ.

Füessl. schweiz. Ins. p. 38. no. 721. Phal. *Psi*, das *griechische Psi.*

Nicht selten auf Eichen, *Apfelbäumen* und *Weiden.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 23. Ph. *Psi.*

— Raupen sterben von Würmern bald vor, bald nach der Verwandlung.

— fressen den abgelegten Balg.

— *Rösels* Raupe t. 8 auf den *Weissdornen.*

— verwandeln sich in Hülsen von Seide und Holzspänchen.

— Rösel hält sie beyde für *verschiedene Arten.* (Chorh. *Meyer.*)

Frisch Ins II. p. 13. 1 Pl. t. 2. Von der *Rückzapfenraupe.*

Ber-

Berlin. Magaz. III. p. 214. no. 18. Phal. *Psi*, die *Pfeilmotte.*

Weisslich aschgrau, mit schwarzen Zeichnungen, darunter ein griechisches *Psi* sich ausnimmt.

Naturf. IX. p. 112. no. 18. Ph. *Psi.* Hr. von *Rottemb.* ist noch ungewiss, ob die von *Röseln* I. N. V. 2. t. 7. 8. abgebildete Phalänen zwo wirklich verschiedene Arten, oder nur dem *Geschlecht* nach verschieden sind — t. 7. häufiger; t. 8. seltener.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 30. no. 69. p. 54. no. 147. Ph. *Psi*, die *Pfeilmotte.*

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 49. t. 7. die grosse *Zapfenraupe* mit dem breiten gelben Rückenstreif.

— p. 54. die grossen schwarzen Augen der Phaläne funkeln bey Nachtzeit an dunkeln Orten wie *glüende Kohlen.* (Kleem.)

— p. 54. t. 8. die kleinere buntfarbige Zapfenraupe. *)

Gleditsch Forstwiss. I. p. 554. no. 4. Phal. *Psi*, die *Pfeilmotte.*

Wien. Schmetterl. p. 67. B. *düstre Eulen.*

1) Die Raupen mit einem Auswuchs auf dem Rücken.

No. 2. *Schleheneulenraupe* (Pruni spinosae); *Schleheneule*, Ph. *Psi.*

Fischers N. G. v. Livl. p. 153. no. 364. das *griechische Psi*, Ph. *Psi.*

*) Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die *Röselsche* Phaläne t. 8, als die kleinere und schöner gezeichnete, das *Männchen* zu t. 7. Die Puppe t. 8. hat am Schwanze drey zarte Spitzchen, die t. 7. nicht.

List. Goed. p. 209. no. 92. f. 92.
Eruca formoſa et admirabilis.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 135. Phal. *Pſi.* Nom. *Linn.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158, no. 69. Phal. *Pſi.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 350. no. 23.
Eruca rarius piloſa, *cornu* in medio dorſo erecto.
— *Aurelia* ſpadicea, theca incluſa.
— *Papilio* fuſco-albo-nigroque coloribus varia. Magna *ſtria* nigra ab oculis per alarum medium deorſum vergit; inferius tanquam duae cruces nigrae. *Interiores* alae coloris candicantis.

Fabric. S. E. p. 614. no. 104. NOCTUA *Pſi.*
Criſtata, alis deflexis cinereis; *anticis* lineola baſeos characteribus nigris.
Larva piloſa; dorſo flavo, lateribus nigris, rubro-maculatis; thorace cornu erecto nigro.
Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 393. Phal. *Pſi.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1400. Phal. *Pſi.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 155. no. 91.
Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis canis, maculis *Pſiformibus* nigris.
Le *Pſi*, Ψ.
Long. 9 lign.

Bibl. Reg. Pariſ. p. 33. f. *omnes.*

136. *Chi*, das *griechiſche Chi.*

Müller l. c. p. 690. no. 136. das *griechiſche Chi.*

Füeßl.

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 722. Ph. *Chi*, das *giechiſche Chi.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 280. no. 19. Ph. *Chi*, das *griechiſche Chi.*

Weiſslich, mit ſchwarzgrauen Zeichnungen, darunter ein griechiſches *Chi.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 73. no. 208. Phal. *Chi.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 87. t. 13. die blaſs-grüne glatte *Raupe* mit weiſſen Streifen.

Wien. Schmetterl. p. 72. H. *grauſcheckige Eulen.*

No. 3. *Agleyeulenraupe* (Aquilegiae vulgaris); *Agleyeule*, Ph. N. *Chi.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 339. Ph. *Chi.*

Fabric. S. E. p. 615. no. 105. NOCTUA *Chi.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, viridis; lineis lateralibus duabus albis.

Pupa folliculata, fuſca.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 121. no. 1401. Phal. *Chi* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 162. no. 103.

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis cinereis, ſuperioribus faſcia decuſſata fuſca, puncto nigro, lineisque transverſis albidis.

L'ix. — *Long.* 6. lign.

137. *Aceris*, die *Ahorneule.*

Müller l. c. p. 691. no. 137. der *Eyring.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 723. Ph. *Aceris*, die *Gelbzotte.*

Bey Genf auf den *Roßkaſtanien* häufig.

Friſch Inſ. I. p. 24. 2 Pl. t. 5. von der *gelbzottigen Kaſtanienraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 84. no. 242. Phal. *Aceris*, die *Gelbzotte;* der *Eyring;* der *Ahornvogel.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 40. t. 4. f. 5. Eine beſondere *Raupe.*

Die rothe und gelbe *Bürſtenraupe* mit dem braunen Kopf und rautenförmigen ſchwarzen Rückenzierrathen.

Kleemanns Beytr. I. p. 149. t. 17. f. 1-5.

Die hochgelbe langhaarige, mit 9 Paar, theils gelb- theils rothen pyramidenförmigen Bürſten verſehene *Raupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 374. Ph. *Aceris*, die *Ahornraupe;* der *Widder.*

Wiener Schmetterl. p. 67. B. *düſtere Eulen.*

3) *Raupen* ſehr lange Haare ohne Köpfe.

No. 7. *Roßkaſtanieneulenraupe* (Aeſculi Hippocaſtani).

La Chenille du Marronier d'Inde. *Réaum.*

Roßkaſtanieneule, Ph. *Aceris.*

Aldrovand. de Inſ. Lib. II. t. 3. f. 15. 16. p. 269. ed. Bonon. 1602. fol. die *Raupe;* der *Stern.*

Schaeff. Inſ. t. 66. f. 8. 9.

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 524. Ph. *Aceris.* *)

Long. lin. 7. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae *anticae* caneſcentes, lineis transverſis, dentatis, annuloque ocellari nigris.

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 392. Ph. *Aceris.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1402. Phal. *Aceris*, Nom. *Linn.*

Geoffr.

*) Hierbey hat *Scop.* *Röſels* I. Ph. 2. t. 29. unrichtig angeführt; denn das iſt Ph. *Perſicaria* L. no. 142.

Geoffr. Inſ. II. p. 156. no. 93. *)

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis; *ſuperioribus* cinereo-fuſcoque nebuloſis, lineis undulatis et *Omicro* nigris; inferioribus cinereis.

L'*Omicron nebuleux.*

Long. 11 lign.

138. *Aprilina*, die *Aprileule.* **)

Müller l. c. p. 691. no. 138. der *Pfeilpunkt.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 724. Ph. *Aprilina*, der *Seladon.* ***)

— Magaz. der Entomol. II. p. 24. Phal. *Aprilina.*

Die graue mit weiſſen und ſammtſchwarzen Strichen gezierte *Raupe*, auf einem *Eichenblatte* (Chorh. *Meyer*).

(Die 3 Arten näher beſtimmt p. 25. *Füeßl.*)

Berlin. Magaz. III. p. 422. not. c. Eine gröſsere Art: Aprilina *maior.* (Dies die *Linnéiſche* Aprilina.)

Röſels Inſektenbel. III. p. 238. t. 39. f. 4.

Der blaſsblaulichgrüne, weiſs- und ſchwarzſcheckige *Nachtpapilion* der 2ten Kl. (ohne *Raupe*).

Wien. Schmetterl. p. 70. E. *Scheckichte Eulen.* No. 5. *Eichbaumeulenraupe* (Quercus Roboris); *Eichbaumeule*, Ph. *Aprilina.*

Gladbachs Schmetterl. p. 22. die *groſse Diana.*

Raj.

*) Hierbey iſt *Röſels* I Ph. 2. t. 13. unrichtig angeführt: das iſt Ph. *Chi* L. no. 136.

**) Dieſe wird oft mit *Ludifica* L. no. 143. verwechſelt. Es giebt 3 Arten derſelben: Aprilina die *gröſste.*

***) Beyde Zitata falſch. Das erſte iſt Ludifica, das zweyte die *kleinſte Art.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 158. no. 4.

Phalaena media pulcherrima, alis oblongis; *exterioribus* dilute coeruleo-viridibus, maculis et lineolis nigris perbelle depictis.

Fabric. S. E. p. 614. no. 100. NOCTUA *Aprilina.* Nom. *Linn.*

Larva cinereo-brunneoque variegata; linea dorſali alba, interrupta ſegmentoque ſingulo puncto albo.

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 391. Phal. *Aprilina.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1404. Phal. *Aprilina.* Nom. *Linn.*

139. *Virens*, die *weiſsgrüne Eule.* *)

Müller l. c. p. 691. no. 139. der *weiſſe Mond.*

Berlin. Magaz. III. p. 300. no. 51. Phal. *Tridens*, der *Dreyzack.*

Ganz grün, mit einem weiſſen ſchmalen Vorderrande, und einem weiſſen, mit drey etwas unmerklichen Spitzen verſehenen Fleck in der Mitte der Flügel.

Naturforſcher IX. p. 120. no. 51. Ph. *Tridens*, der weiſſe Fleck mit 3 Spitzen ſtellt eigentlich einen *halben Mond* vor, in dem das *Mittelſpitzchen* beynahe unmerklich iſt. (von *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 746. no. 47. Ph. *Tridens*, der *Dreyzack.*

Wiener Schmetterl. p. 85. Q. *Tagliebende Eulen.* No. 8. *Unbekannte Raupe; weiſsgrüne Eule*, Ph. *Virens.*

140. *Turca*, der *Türke.*

Müller l. c. p. 691. no. 140. der *Türke.*

Ber-

*) *Nicht abgebildet.*

Berlin. Magaz. III. p. 304. no. 55. Phal. *Volupia*, der *Rauchfuß*.

Blaſsroth, mit einem weiſſen Fleck und zwo grauen Queerſtreifen auf den Oberflügeln.

Naturforſcher IX. p. 123. no. 55. Ph. *Volupia*.

Die *Raupe* rothbraun, anderthalb Zoll lang, ziemlich dick. (von *Rottemb.*)

Wien. Schmetterl. p. 84. No. 2. *Binſengraseulenraupe* (Iunci piloſi); *Binſengraseule*, Phal. *Turca*.

Der Dronth. Geſellſch. Schr. IV. p. 282. no. 39. t. 16. f. 15.

Phalaena N. (*Lunula*), ſpirilinguis criſtata, alis deflexis, atro-purpureis, nebuloſis, *lineola arcuata flava*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 406. Phal. *Turca*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1406. Phal. *Turca*. Nom. *Linn*.

141. *Nictitans*, die *Weißniere*. *)

Müller l. c. p. 691. no. 141. die *Weißniere*.

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XXXI. p. 312. t. 10. f. 1. 2. 3.

Beſchreibung der *Frühlingsrockenraupe*. (*Osbeck.*) **)

Raupe ſteckt bey Tage in der Erde, und bey Nacht beiſst ſie die Rockenhalmen dicht über der Erde ab.

Linn.

*) Dieſe vermiſſe ich wieder bey den *Wiener Entomologen*.

**) Es heiſst daſelbſt p. 314 in der Note: *Linné* habe ſelbſt verſichert, es ſey die wahre Ph. *Nictitans*. S. unter den Neuen No. 132. Ph. *Secalis*.

Linn. Faun. Suec. ed, 2. p. 321. no. 1215. Phal. N. *oculea.*)

Habitat in *Lucis.*

Fabric. S. E. p. 616. no. 112. N. *Oculea.*

Criſtata; alis *deflexis* ferrugineo - fuſcoque variis; *ſtigmate reniformi*, pallido.

An?

142. *Perſicariae*, die *Flöhkrauteule.*

Müller l. c. p. 692. no. 142. der *Sägerand.*

Füeſsl. ſchweizer. Inſekt. p. 38. no. 725. Phal. *Perſicariae.*

Etwas *ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 308. no. 61. Ph. *Sambuci*, die *Fliedermotte.*

Schwarz, mit einigen hellern undeutlichern Zeichnungen, und einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturforſcher IX. p. 128. no. 61. Ph. *Sambuci* (von *Rottemb.*).

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 174. t. 30. die glatte mattgrüne geſchuppte *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 71. F. *fleckichte Eulen.*

3) Raupen mit einer ſtumpfen Erhöhung.

No. 8. *Flöhkrauteulenraupe* (Polygoni Perſicariae); *Flöhkrauteule*, Ph. *Perſicariae.*

Fabric. S. E. p. 615. no. 106. NOCTUA *Perſicariae.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, viridis; linea dorſali alba; ſecundo ſegmento macula quadrata atra, cauda conica.

Pupa brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 157. no. 94.

Pha-

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, ſuperioribus fuſcis, lineis undulatis, et *Omicro* albis; inferioribus cinereis.

L'*Omicron géographique.*

Long. 7. lign.

143. α. *Ludifica*, das *Naturſpiel.*

Müller, l. c. p. 692. no. 143. das *Naturſpiel.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 726. Ph. *Ludifica.*

Bey uns *ſelten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 24. Ph. *Ludifica.*

Berlin. Magaz. III. p. 280. no. 20. Phal. *Aprilina*, der *Seladon.*

Meergrün mit weiſſen Streifen, und irregulären ſchwarzen Zeichnungen, wie chineſiſche Buchſtaben.

— p. 555. mit *Kupfer*. f. 1. *Raupe;* f. 2. *Puppe;* f. 3. *Vogel.*

Beſchreibung einer ſehr bunten *Raupe* auf den Eichen, und der *Phaläne;* Ph. *Aprilina minor* (*Hufnagel*).

Naturforſcher IX. p. 113. no. 20. Ph. *Aprilina* iſt Linn. *Ludifica* (von *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 649. no. 19. Ph. *Aprilina maior* *), der *kleine Seladon*, et no. 20. Ph. *Aprilina*, der *Seladon.*

Sulzers Geſch. der Inſ. p. 161. t. 22. f. 8. Ph. *Ludifica*, das *Naturſpiel.*

Die *Vorderflügel* iſabellfarb, gezähnt, mit vielen ſchwarzen Zügen; die *hintern* ſchwarzgrau

*) Hieraus ſind zwo beſondere Arten gemacht, da es doch nur eine, nämlich *Ludifica* L. iſt. Statt minor ſtehet durch einen Druckfehler maior, wie die deutſche Benennung, der *kleine* Seladon, beweiſet.

grau und weiſs. Die Schenkel der Vorderfüſse sehr dicke, alle grau; das übrige der Füſse weiſs und ſchwarz.

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 311. zur Famil. E. no. 6. (4. 5.) *unbekannte Raupe* *); *grünweiſslichte ſchwarzgezeichnete Eule*, Ph. *Ludifica.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 614. no. 101. NOCTUA *Ludifica.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 44. no. 390. Ph. *Ludifica.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1405. Ph. *Ludifica.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. I. Mém. 3. p. 113. t. 5. f. 19-24.

Chenille verte, à trois lignes longitudinales jaunâtres, dont le corps eſt garni de quelques peu de poils longs et noirs.

— — p. 699. t. 5. f. 22. 23.

Phalene à antennes en filets, d'un brun presque noir à nuances blanchâtres, et à tache ovale d'un verd-brun, entourée de blanc et de noir.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. p. 88. t. 5. f. 19-24. **)

Eine grüne mit einigen langen ſchwarzen Haaren bewachſene *Raupe*, mit drey langen gelblichen Streifen.

— — 4 Qu. p. 122. t. 5. f. 22. 23.

Ein brauner, beynahe ſchwarzer *Nachtvogel* mit weiſslichen Schattirungen, fadenförmigen Fühlhörnern, und einem eyförmigen braungrünen Fleck, mit weiſs- und ſchwarzem Rande.

Degeer

*) Die Raupe iſt vom *Hufnagel* l. c. abgebildet; alſo nicht mehr unbekannt.

**) Ich nehme das hier zurück, was ich damals in der Anmerk. ſagte, es ſey *Aprilina* L. S. *Füeſsl.* Entomol. Magaz. II. p. 25.

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 434. no. 6. *Phalene d'Avril.*

Phalene à antennes filiformes; à trompe et à corcelet huppé; à ailes rabatues d'un brun presque noir à nuances blanchâtres et brun-verdâtres avec une tache ovale d'un verd-brun à cercle blanc et noir.

— *Ueberſ.* II Th. 1 B. p. 317. no. 6. die *Aprilphaläne.* *)

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden braunen, beynahe ſchwarzen, weiſslich und braungrünlich ſchattirten Flügeln, mit einem eyförmigen grünbraunen Fleck, in einem weiſs- und ſchwarzen Zirkel.

β. *Minor*, die *kleinſte Art der Aprileule.* **)

Füeſl. Magaz. der Entomol. II. p. 26. *Schäffers und Sepps* Eule, — ſcheint mir noch eine *dritte beſondere Art* zu ſeyn. (Füeſsl.)

Gladbachs neue Schmetterl. p. 22. t. 11. f. 1. 2. die *kleine Diana.*

Schaeff. Icon. t. 92. f. 3.

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 41. t. 9. f. 1-8. Vom *Ey bis zur Phaläne.*

De Vlinder de *Orion.*

144. *Af-*

*) Nachher hab ich eingeſehen, daſs die Hufnagelſche Aprilina die eigentliche *Ludifica* L. ſey, und *Sepp* die dritte kleinſte Art abgebildet habe.

**) Wenn die *Runica* der Wiener p. 70. F. No. 1. nicht aus einer glatten Raupe käme, ſo würde ich ſie für dieſe halten. An *Fabric.* Lichenis? S. unter den neuen Noct. no. 300.

144. *Affinis*, der *Italiänische Anverwandte.* *)

Müller l. c. p. 692. no. 144. der *Anverwandte.*
Wien. Schmetterl. p. 88. T. *Mordraupen; gewässerte Eulen.*
4) *Rothbraun.*
No. 11. *Aespenraupeneule* (Populi Tremulae); *Aespeneule.* Ph. *Affinis.*
Fabric. S. E. p. 609. no. 83. NOCTUA *Affinis.* Nom. *Linn.*

145. *Triptera*, der *portugiesische Dreyfleck.* **)

Müller l. c. p. 692. no. 145. der *Flügelfleck.*
Fabric. S. E. p. 609. no. 84. NOCTUA *Triptera.* Nom. *Linn.*

146. *Diffinis*, der *portugiesische Landsmann.* ***)

Müller l. c. p. 692. no. 146. der *Landsmann.*
Wiener Schmetterl. p. 88. T.
No. 10. *Feldulmeneulenraupe* (Vlmi campestris); *Feldulmeneule*, Ph. *Diffinis.*
Geoffr. Inf. II. p. 164. no. 108.
Phalaena seticornis spirilinguis, albis roseo-purpureoque variegatis, superioribus macula duplici marginali alba.
Le *Nacarat.*
Long. 6 lign.

147. *Occulta*, der *kurze Unterflügel.*

Müller l. c. p. 693. no. 147. der *Deckflügel.*
Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 318. no. 1203. Phal. *Occulta.*
Inter Phalaenas *rusticas* maxima.

Clerk

*) *Nicht abgebildet.* **) *Nicht abgebildet.*
***) *Nicht abgebildet.*

Clerk Icon. t. 1. f. 6.

148. *Perſpicillaris*, die *Brilleneule.*

Müller l. c. p. 693. no. 148. die *Brille.*
Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 38. no. 727. Ph. *Perſpicillaris*, die *Brille.*

Nicht ſelten auf den *Pappelbäumen.*

Wien. Schmetterl. p. 76. K. *Rieſelraupen*, Larvae *alboſparſae; holzfarbige Eulen*, Ph. N. *Lignicolores.*

No. 11. *Konradskrauteulenraupe* (Hyperici hirſuti); *Konradskrauteule*, Ph. *Perſpicillaris.*

Clerk Icon. t. 2. f. 3. Ph. *Polyodon.*

149. *Conſpicillaris*, der *Brillenbogen.*

Müller l. c. p. 693. no. 149. t. 22. f. 8. der *Brillenbogen.*
Wiener Schmetterl. p. 75. K. No. 5. *Wirbelkrauteulenraupe* (Aſtragali Onobrych.); *Wirbelkrauteule*, Ph. *Conſpicillaris.*

150. *Vmbratica*, die *Kappeneule.*

Müller l. c. p. 693. no. 150. der *Kappenträger.*
Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 728. Ph. *Vmbratica*, der *Kappenträger.*

Nicht ſelten in den Gärten unter *Sallat* und anderem Gemüſe.

Berlin. Magaz. III. p. 280. no. 21. Ph. *Vmbratica*, der *weiſſe Mönch.*

Weiſsgrau, mit ſchmalen langen und ſpitzigen Flügeln, und einer Mönchskappe.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 56. no. 153. et p. 74. no. 211. Ph. *Vmbratica*, der *Kappenträger;* der *graue Mönch.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 153. t. 25. die glatte, ſchwarzbraune und mit pomeranzengelben Flecken geſprenkelte *Raupe.*

Wiener Schmetterl. p. 74. I. *kappenhalſigte Eulen.* 3) Braun mit Röthlichgelb die *Raupen.* No. 8. *Haſenkohleulenraupe* (Sonchi oleracei *laevis*); *Haſenkohleule*, Ph. *Vmbratica.*

Fabric. S. E. p. 618. no. 118. NOCTUA *Vmbratica.*

Larva nuda, nigricans, trifariam rubro-punctata.

Pupa brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 45. no. 395. Ph. *Vmbratica.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1408. Phal. *Vmbratica.* Nom. *Linn.*

151. *Exſoleta*, die *Aſpekteneule.*

Müller l. c. p. 693. no. 151. das *Moderholz.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 729. Ph. *Exſoleta*, das *Moderholz.*

Auf der Melde; *Erbſenfeldern* etwas ſelten.

— Magaz. der Entomol. II. p. p. 27. Phal. *Exſoleta.*

Die Nahrung der *Raupe* gemeines *Gras* (Chorh. *Meyer*).

Friſch Inſ. V. p. 30. no. 11. 1 Pl. t. 11. Von der grünen *Meldenraupe* mit ſchwarz eingefaſsten weiſſen Spiegelpunkten auf jedem Gelenke auf dem Rücken — die *Aſpektenraupe.*

Berlin. Magaz. III. p. 282. no. 22. Phal. *Exſoleta*, die *Aſpektenmotte.*

Mauſefarbig, ſchwarzgrau gezeichnet, und ſchattirt.

Maders

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 78. p. 56. no. 152. Phal. *Exſoleta*, *Aſpektenmotte*; *Moderholz.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 145. t. 24. die groſse, glatte, grüne und auf unterſchiedliche Arten gezeichnete *Meldenraupe.*

Martini allgem. Geſch. der Nat. III. p. 398. t. 104. Ph. *Exſoleta*, die *Aſpektenmotte*; *Moderholz.*

Wien. Schmetterl. p. 75. K. No. 1. *Scharteeulenraupe* (Serratulae tinct. et arv.); *Scharteeule*, Ph. *exſoleta.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 360. Ph. *Exſoleta.*

Fabric. S. E. p. 617. no. 116. NOCTUA *exſoleta.* Criſtata, alis lanceolatis, convolutis, fuſco-cinereoque nebuloſis, punctis quatuor marginalibus albis.

Larva nuda, viridis, punctata: linea laterali albida.

Pupa nuda, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 45. no. 396. Phal. *exſoleta.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1409. Phal. *exſoleta.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 401. no. 2. t. 7. f. 1-4. *Phalene bois ſec.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes allongées croiſées d'un gris couleur du bois, mais d'un brun de caffé le long du dos; à corcelet huppé avec trois pointes en devant.

— *Ueberſ.* II. Th. I B. p. 290. no. 2. t. 7. f. 1-4. das *dürre Holz.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, länglicht-ovalen, gekreuzten, holzgrauen, längſt dem Rücken aber koffeebraunen

Flügeln, und einem Rückenkamm vorne mit drey Spitzen. *)

Merian. Eur. t. 108.

152. *Putris*, das *Faulholz.* **)

Müller l. c. p. 694. no. 152. das *Faulholz.*

Wien. Schmetterl. p. 75. K. No. 4. *Unbek. Raupe; weißlichte braungerändelte Eule*, Ph. *Putris.*

Fabric. S. E. p. 618. no. 119. NOCTUA *Putris.* Nom. *Linn.*

Statura N. *Verbasci*, at multo brevior. *Thorax* antice pallide testaceus.

153. *Verbasci*, die *Wollkrauteule.*

Müller l. c. p. 694. no. 153. die *Wollkrautseule.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 38. no. 730. Ph. *Verbasci*, die *Wollkrautseule.*

Auf dem *Wollkraut* häufig.

— Magaz. der Entomol. II. p. 28. Phal. *Verbasci.*

1) Die jungen *Raupen* bedienen sich im Gehen der 2 vordern Paar Bauchfüsse nicht, den *Spannmessern* ähnlich.

2) In der Jugend und Alter rollen sie sich stark zusammen, und so, auf dem Rücken liegend, bewegen sie sich in die Höhe und Ferne, *sprungweise.*

3) Ein Paar Jahr nach einander sind viele durch eine ungeheure *Brut kleiner Würmer* verdorben, die nach ihrem Tode einen unerträg-

*) P. 292. erzählet der V. eine sonderbare Begebenheit; daſs diese *Aspektenraupe* die Raupe vom Pap. *Ramni* (Zitronvogel) in der Schachtel aufgefressen habe.

**) *Nicht abgebildet.*

träglichen Geruch von ſich gegeben haben (Chorh. *Meyer*).

Friſch Inſ. VI. p. 22. no. 9. 2 Pl. t. 9. von der *Wullkrautraupe.*

Berlin. Magaz. III. p. 282. no. 23. Ph. *Verbaſci*, der *braune Mönch.*

Hellbraun, mit einem dunkelbraunen Rande und einer *Mönchskappe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 14. no. 14. Ph. *Verbaſci*, der *braune Mönch;* die *Wollkrauteule.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 142. t. 23. die grünlichweiſſe ſchwarzgefleckte *Wollkrautraupe.*

Wiener Schmetterl. p. 73. I.

2) *Raupen* mit Schwarz und Gelb.

No. 4. *Wollkrauteulenraupe* (Verbaſci Thapſi); *Wollkrauteule*, Ph. *Verbaſci.*

La Chenille du bouillon blanc. *Réaum.*

Bonnets und anderer etc. Abhandl. aus der Inſektologie p. 97. no. 17.

Die ſchöne *Raupe* auf dem *Wollkraut* — hat den beſondern Theil, nämlich das *Fleiſchhorn*, unter dem erſten Ringe zwiſchen der Unterlippe und dem erſten Paar Füſsen.

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 153. Ph. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 414. Ph. *Verbaſci*, der *Wollkrautvogel.*

Schaeff. Icon. t. 24. f. 6. 7.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 168. no. 25.

Phalaena media; alis exterioribus cinereis, lineis et maculis nigris, varie depictis.

— p. 352. no. 31.

Eruca Verbaſcum depaſcens cinerea, pulchre variegata.

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 521. Phalaena *Verbaſci.*
Long. lin. 9. Lat. 3³.
Lingua corporis longitudine; *thorax* criſta duplici; *alae* ſubdentatae, albo-cervinae, margine fuſco.

Fabric. S. E. p. 618. no. 117. NOCTUA *Verbaſci.*
Criſtata, alis deflexis, dentato-eroſis, margine laterali fuſco, immaculato.
Larva nuda, cinerea, flavo-nigroque punctata.
Pupa folliculata, lutea; ſtigmatibus nigris.

Mülleri Faun. Fridr. p. 45. no. 397. Phal. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1409. Phal. *Verbaſci.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 158. no. 96.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis fuſco-cinereis, *ſuperioribus* fuſcis longitudinaliter ſtriatis.

Biblioth. Reg. Pariſ. p. 32. f. *omnes.*

154. *l album*, das *weiſſe l.*

Müller l. c. p. 694. no. 154. das *weiſſe L.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 731. Ph. *l album*, das *weiſſe L.*
Bey uns *ſelten.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 42. Ph. *Comma*, der *weiſſe Haken.*
Hellgelblichgrau, mit etwas Dunkelgrau ſchattirt; die *Oberflügel* der Länge nach ſehr fein gefurcht, in deren Mitte ein weiſſer Strich mit einem Haken.

Naturforſcher IX. p. 117. no. 42. Ph. *Comma* iſt des *Linn. l album* (von *Rottemb.*).

Gle-

Gleditsch Forstwiss. II. p. 745. no. 44. Ph. *Comma*, der *weisse Haken*.

Wien. Schmetterl. p. 85.

2) Ohne Queerstriche.

No. 9. *Hundsribbeneulenraupe* (Plantaginis lanceolatae); *Hundsribbeneule*, Ph. *l album*.

Fabric. S. E. p. 606. no. 66. NOCTUA *l album*.

Cristata, grisea, alis incumbentibus; anticis *l albo* notatis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 120. no. 1390. Ph. *l album*.

Elinguis? cristata, alis pallide luteis, superioribus nebulosis: disco *linea nivea uncinata*.

Schaeff. Icon. t. 92. f. 4.

155. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.

Müller, l. c. p. 695. no. 155. das *Verwunderungszeichen*.

Füeßl. schweizer. Insekt. p. 38. no. 732. Ph. *Exclamationis*, das *Verwunderungszeichen*.

Berlin. Magaz. III. p. 298. no. 48. Ph. *Clavus*, das *Schlüsselloch*.

Braun, grau, mit einem dunkelbraunen *nierenförmigen* und einem *nagelförmigen* Fleck, so zusammen ein *Schlüsselloch* vorstellt.

Naturf. VIII. p. 109. und IX. p. 119. no. 48. Ph. *Exclamationis* (von *Rottemb.*).

Wien. Schmetterl. p. 80. N. *Erderaupen*, Larvae *Terricolae*; *gemeine Eulen*, Ph. N. *Rusticae*.

1) mit *schwarzem Halskragen*.

No. 2. *Kreuzwurzeulenraupe* (Senecionis vulgaris); *Kreuzwurzeule*, Phalaena *Exclamationis*.

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 220. no. 32. Ph. *exclamationis* t. 17.

Oben auf dem Flügel einen schwarzen Strich mit einem Punkt darunter, wovon es den Namen hat.

Fabric. S. E. p. 605. no. 65. NOCTUA *Exclamationis.* Nom. *Linn.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1403. Phal. *Exclamationis.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 161. no. 101.

Phalaena seticornis spirilinguis; alis deflexis, superioribus ferrugineo-cinereis; macula duplici longa rotundaque nigra; inferioribus albidis.

La *double tache.*

Long. 8. lign.

156. *Comma*, das *weisse Häklein.* *)

Müller l. c. p. 695. no. 156. das *Häklein.*

Füeßl. schweizer. Inf. p. 38. no. 733. Ph. *Comma*, das *Häklein.*

Wiener Schmetterl. p. 76. K. *Rieselraupen, holzfarbige Eulen.*

No. 9. *Unbekannte Raupe. Graustriemigte schwarzgezeichnete Eule.* Ph. *Comma.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 196. Ph. *Comma.*

Naturforscher IX. p. 117. no. 42. Ph. *Comma* Hufnag. L *album* et Ph. *pallens* L. viel ähnliches (von *Rottemb.*).

Mülleri Faun. Fridr. p. 45. no. 399. Ph. *Comma.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1411. Ph. *Comma.* Nom. *Linn.*

157. *Plecta*, der *weisse Dickrand.*

Müller l. c. p. 695. no. 157. der *Dickrand.*

Füeß-

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßlins ſchweizer. Inſekt. p. 38. no. 734. Phal. *Plecta.*

Bey uns etwas ſelten auf *Linden.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 48. no. 131. Phal. *Plecta*, der *Dickrand.*

Kleemanns Beytr. I. p. 189. t. 23.

Die einſame, glatte, ſchlechtgrüne und auf dem Tobackskraut ſich aufhaltende *Raupe* — vom *Ey* an.

Naturforſcher IX. p. 120. no. 49. Phal. *Ignobilis* Hufnag. (von *Rottemb.*)

Berlin. Magaz. III. p. 300. no. 49. Ph. *Ignobilis*, der *Springer.*

Dunkelbraun, mit vielen hellbraunen Zeichnungen, und einem *nierenförmigen Fleck.*

Wien. Schmetterl. p. 77. M.

2) mit ſchwarzen Fleckchen im Mittelraume.

No. 6. *Blindlatticheulenraupe* (Lactucae ſativae); *Blindlatticheule*, Ph. *Plecta.*

Fabric. S. E. p. 605. no. 63. NOCTUA *Plecta.*

Alis incumbentibus, fuſcis; *margine* craſſiori albo.

Larva viridis, capite brunneo.

Pupa folliculata, atra.

158. *Deraſa*, der *Wiſchflügel.*

Müller l. c. p. 695. no. 158. der *Wiſchflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 38. no. 735. Ph. *Deraſa*, der *Achatflügel.*

Bey Zürch und Bern; aber *ſelten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 85. §. IV. no. 2. Ph. *Deraſa*, der *Achatvogel.*

Berlin. Magaz. III. p. 400. no. 74. Ph. *Pyritoïdes*, der *Feuerſtein.*

Die

Die Grundfarbe olivenfarbig, grau, wie ein durchsichtiger Feuerstein, mit rostfarbigen weissen und dunkeln Flecken und Zeichnungen.

Berlin. Magaz. p. 424. K. Ausserordentlich selten.

— — p. 560. Beschr. einer seltenen und besonders schönen *Phaläne*. Ph. *Pyritoïdes.* (*Hufnagel.*) Beygef. Kupfert. f. 4. *Vogel.*

— *Naturforsch.* II. p. 16. V. t. 1. f. 7. (*Kühn.*)

— IX. p. 133. no. 74. Ph. *Pyritoïdes* ist *Derasa* L. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmetterl. p. 87. T. *Mordraupen; gewässerte Eulen.*

1) die Oberflügel gelblicht.

No. 2. *Himbeereulenraupe* (Rubi Idaei); *Himbeereule*, Ph. N. *Derasa.*

Fabric. Syst. E. p. 609. no. 80. NOCTUA *Derasa.* Nom. *Linn.*

159. *Gothica*, die *gothische Schrifteule.*

Müller l. c. p. 696. no. 159. die *gothische Schrift.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 38. no. 736. Ph. *Gothica.* Bey uns etwas *selten.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 122. no. 1412. Phal. *Gothica.* Nom. *Linn.*

Clerk Icon. t. 1. f. 1.

160. *Pinastri*, die *Fichteneule.*

Müller l. c. p. 696. no. 160. der *Buckel.*

Wien. Schmetterl. p. 82. O. *Jaspisfarbige Eulen.*

1) Die Oberflügel schwärzlich mit gelber Zackenlinie.

No. 1. *Föhreneulenraupe* (Pini Sylvestris); *Föhreneule*, Ph. *Pinastri.*

Fischers N. G. von Livl. p. 153. no. 365. Ph. *Pinastri*, der *Buckel.*

Ber-

Berlin. Magaz. III. p. 300. no. 50. Phal. *Dypterigia*, die *Flügelmotte.*

Kohlschwarz, mit einer grauen Figur auf jedem Oberflügel, so dem Flügel von einem Vogel ähnlich ist.

Naturforscher IX. p. 120. no. 50. Ph. *Dypterigia* ist Ph. *Pinastri* L.

Das beste *Unterscheidungszeichen* die vom *Hufnagel* auf den Oberflügeln am Unterrande in angulo ani angegebene *graue flügelförmige Figur.* (von *Rottemb.*)

Linn. Syst. Nat. ed. 10. p. 516. no. 108. Ph. *Scabriuscula.*

Clerk Icon. t. 1. f. 8.

161. *Strigilis*, der *Dreyring.*

Müller l. c. p. 696. no. 161. der *Dreyring.*
Clerk Icon. t. 9. f. 6.

162. *C nigrum*, das *schwarze C.*

Müller l. c. p. 696. no. 162. das *schwarze C.*
Wiener Schmetterl. p. 77. M.

2) mit schwarzen Fleckchen im Mittelraume.

No. 7. *Spinateulenraupe* (Spinaciae oleraceae); *Spinateule*, Ph. *C nigrum.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 2. Ph. *C nigrum.*
Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 157. Le *C.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 122. no. 1413. Phal. *C nigrum.* Nom. *Linn.*
Clerk Icon. t. 1. f. 3.

163. *Brassicae*, die *Kohleule.*

Müller l. c. p. 696. no. 163. die *Kohleule.*
Füeßl. schweiz. Inf. p. 38. no. 737. Ph. *Brassicae*, die *Kohleule.*

Füeßl.

Füeßl. Magaz. der Entom. II. p. 29. Ph. *Brassicae.*

Die *Raupen* kommen mit verschiedenen Farben, weiss und grau, aus den Eyern — sehen nach jeder Häutung anders aus — häuten sich fünfmal — gehen fast wie *Spannraupen* — keine frisst bey Tage — die *Puppen* arbeiten sich aus der Erde heraus. (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Magaz. III. p. 282. no. 24. Ph. *Brassicae*, die *Kohlmotte.*

Glänzend, blass, gelblich, grau marmorirt, mit weisslichgrauen Flecken, und schwarzen Haken auf den Oberflügeln.

Frisch Ins. X. p. 19. no. 16. 3 Pl. t. 16. von der erdfarbnen *Erdraupe* mit drey gelben Strichen auf dem Halskragen oder Nackenschild.

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 169. t. 29. die schädliche, glatte, braune *Krautraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 81. N. *Gemeine Eulen.* 4) mit zweydeutiger Zeichnung.

No. 21. *Kohleulenraupe* (Brassicae oleraceae); *Kohleule*, Ph. *Brassicae.*

Fischers N. G. von Livl. p. 153. no. 365. Phal. *Brassicae*, die *Kohleule.*

Onomat. hist. nat. P. 6. p. 321. Phal. *Brassicae*, der *Krautvogel*, der *Herzwurm.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 403. Phal. *Brassicae.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1414. Phal. *Brassicae.* Nom. *Linn.*

Othon. Fabric. Faun. Groenl. p. 194. no. 146. Phal. *Brassicae.* Nom. *Linn.*

Mea *puncta 4 alba marginalia* habebat.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 438. no. 9. Ph. *Brassicae; Phalene brune-griseâtre du Chou.*

Pha-

Phalene à antennes filiformes; à trompe et à corcelet huppé; à ailes rabatues d'un brun - grisêatre obscur à rayes ondées noirâtres avec une tache grise, une tache mêlée de blanc et une raye blanchêatre.

Degeer Uebers. II Th. I B. p. 320. no. 9. die *braungrauliche Kohlphaläne*, der *Ohrvogel.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und Rückenkamm, und niederhangenden dunkelbraungraulichen Flügeln, mit gewässerten schwärzlichen Streifen, einem grauen und einem weissmelirten Fleck, nebst einer weisslichen Streife. *)

Goed. Belg. Tom. III. t. F.

List. Goed. p. 79. f. 29.

Merian. Eur. t. 81.

Albin. Inf. t. 78. 79. no. 45. e f g h.

Réaum. Inf. I. t. 40. f. 16. 17. t. 41. f. 1. 2. 3.

164. *Rumicis*, die *Sauerampfereule.*

Müller l. c. p. 697. no. 164. die *Sauerampfereule.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 39. no. 738. Ph. *Rumicis.*

— Mag. der Entomol. II. p. 31. Ph. *Rumicis.*

Raupen fressen *Boretsch* (Borrago) und *Weidenblätter* (Chorh. *Meyer*).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 57. no. 155. Phal. *Rumicis*, die *Sauerampfermotte.*

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 161. t. 27. die schwarzbraune, buntgesprengte, rothhaarige *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 67. B.

2) Bey den Raupen die Haare auf Knöpfchen.

No.

*) Mittel dagegen p. 321. 322. *Anmerk. Preuß. Samml.* I. p. 560. II. p. 1180. 1187. *Berlin. Magaz.* III. p. 3. 19.

No. 3. *Ampfreulenraupe* (Rumicis Crispi etc.); *Ampfereule*, Ph. *Rumicis*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 45. no. 401. Phal. *Rumicis*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1415. Phal. *Rumicis*. Nom. *Linn*.

Degeer Inſ. I. Mém. 5. p. 185. t. 9. f. 14-22.

Chenille velue, noire, à dix tubercules, garnie ſur le dos de taches rougeâtres et blanches, et vers les côtés d'une raye blanche ou couleur d'orange. Elle ſe trouve ſur l'*Aune*, le *Bouleau* et le *Saule*.

— — p. 699. t. 9. f. 22.

Phalene à antennes en filets; cendrée, à taches et nuances noires et blanchâtres, et à jambes picotées de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 411. no. 4.

Phalene cendrée noirâtre à deux taches blanches.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un cendré noirâtre avec des rayes ondées noires, et deux taches blanches au bord intérieur.

— (*Ueberſ.* I. 1 Quart. 5te Abh. p. 137. t. 9. f. 14-22.

Die rauche, ſchwarze, auf dem Rücken röthlich und weiſsgefleckte und an den Seiten weiſs oder orangegelb geſtreifte, auf den *Erlen*, *Birken* und *Weiden* lebende *Raupe*, mit zehn Buckeln.

— — 4 Qu. p. 122. t. 9. f. 22.

Ein aſchgrauer *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, ſchwarz und weiſsgefleckt, und ſchattirt, und ſchwarz geſprenkelten Füſsen.

Degeer Inſ. II Th. I B. p. 298. no. 4.

Die ſchwärzlich aſchgraue *Phaläne* mit zween weiſſen Flecken.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und ſchwärzlich aſchgrauen niederhangenden Flügeln, mit zwo ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und zween weiſſen Flecken am Innenrande.

Réaumur Inſ. I. t. 15. f. 6. t. 37. f. 11. Tom. II. t. 34. f. 8. La *Chenille.*

165. *Oxyacanthae*, die *Weißdorneule.*

Müller l. c. p. 697. no. 165 die *Hochſchwanzeule.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 739. Phal. *Oxyacanthae.*

Auf dem *Schlee-* und *Weißdorn*, etwas ſelten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 14. no. 15. Phal. *Oxyacanthae*, die *Hochſchwanzeule;* der *Buchfink.*

Berlin. Magaz. III. p. 284. no. 25. Ph. *Oxyacanthae*, der *Buchfink.*

Theils hell, theils dunkelgrau, theils blaſsgrau, mit einem groſsen weiſslichen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 185. t. 33. die glatte, hellgraue und braun gerautete *Baumraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 820. no. 13. Ph. *Oxyacanthae*, der *Buchfink.*

Wien. Schmetterl. p. 70. F.

2) Raupen mit Spitzen am Hinterleibe.

No. 3. *Weiſsdorneulenraupe* (Crataegi Oxyacanthae); *Weiſsdorneule*, Ph. *Oxyacanthae.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 391. Ph. *Oxyacanthae.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 90. NOCTUA *Oxyacanthae.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, albo-nigroque varia, cauda gibba.

Pupa folliculata, flava.

166. *Vaccinii*, die *Heidelbeereule.* *)

Müller l. c. p. 697. no. 166. die *Heidelbeereule.*

Wien. Schmetterl. p. 85. R. *Halsſchildraupen*, Larvae *Scutellatae; röthlichbraune Eulen*, Phal. N. *Badiae.*

No. 2. *Preuſelbeereulenraupe* (Vaccinii Vitis Idaeae); *Preuſelbeereule*, Ph. *Vaccinii.*

167. *Myrtilli*, die *Sumpfheideeule.*

Müller l. c. p. 698. no. 167. die *Sumpfheideeule.*

Berlin. Magaz. III. p. 492. no. 37. Ph. *Ericae*, die *Waldmotte.*

Die *Oberflügel* braunroth mit weiſſen geſchlängelten Queerlinien; die *Unterflügel* an der Einlenkung oraniengelb, am Rande ſchwarz.

Naturforſcher IX. p. 114. no. 37. Ph. *Ericae* iſt Ph. *Myrtilli* L. (v. *Rottemb.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 65. no. 185. Phal. *Myrtilli*, die *Sumpfheideneule.*

Röſels Inſektenbel. IV. p. 85. t. 11. f. A B C.

Das ausnehmend zierliche, grün und weiſsgeſcheckte *Räuplein* der Waldheyde.

Wien. Schmetterl. p. 79. M.

3) mit ſchwarzen Punkten am Auſsenwinkel, und gelben ſchwarz geränderten Unterflügeln.

No. 23. *Heidelbeereulenraupe* (Vaccinii Myrtilli); *Heidelbeereule*, Ph. *Myrtilli.*

Gle-

*) Nicht abgebildet.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 411. no. 1. Ph. *Ericae*, die *Waldmotte.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 385. Ph. *Myrtilli.*

Fabric. S. E. p. 619. no. 121. NOCTUA *Myrtilli.*

Criſtata; alis deflexis, ferrugineis, albo-maculatis; poſticis luteis; faſcia lata nigra, ſubmarginali.

Larva nuda, viridis, dorſo quinque tuberculato, capite coeruleo.

Pupa brunnea, ſtigmatibus albis.

Othon. Fabric. Faun. Grönl. p. 194. no. 147. Phal. *Myrtilli.* Nom. *Linn.*

Paucas vidi in *Vaccinio uliginoſo.*

168. *Plebeja*, die *Pöbeleule.* *)

Müller l. c. p. 698. no. 168. die *graue Eule.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1210. Ph. *Plebeja* (*genaue Beſchreibung*).

169. *Hepatica*, die *leberfarbige Eule.*

Müller l. c. p. 698. no. 169. die *Leberfarbe.*

Wien. Schmetterl. p. 83. O.

4) Rothbraun.

No. 16. *Unbekannte Raupe. Leberbraune, düſter- und gelbgemiſchte Eule*, Ph. *Hepatica.*

Cathol. H. p. 120. Ph. *Hepatica.*

Clerk Icon. t. 8. f. 3.

170. *Polyodon*, die *vielzähnigte Eule.* **)

Müller l. c. p. 698. no. 170. der *Vielzahn.*

Wien. Schmetterl. p. 72. H. No. 1. *Birkeneulenraupe* (Betulae albae); *Birkeneule*, Ph. *Polyodon.*

Fabric. Syſt. E. p. 616. no. 109. NOCTUA *Polyodon.*

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Cristata, alis deflexis, dentatis, nebulosis; striga postica dentata alba.

Alae *subtus* cinereae, arcu punctoque fuscis.

171. *Oleracea*, die *Krauteule.*

Müller l. c. p. 698. no. 171. der *Wurzelnager.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 39. no. 740. Phal. *Oleracea*, die *Krauteule.*

Berlin. Magaz. III. p. 284. no. 26. Ph. *Oleracea*, die *Krautmotte.* Rothbraun, mit einem *pomeranzengelben Fleck* in den Oberflügeln, und einem weissen Streif.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 31. no. 76. Ph. *Oleracea.* *)

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 183. t. 32. die *kleinere Wasserpfefferraupe.* **) p. 75. no. 214. die *kleinere Wasserpfefferraupe*, Ph. *Oleracea.*

Frisch Ins. VII. p. 29. no. 21. 3 Pl. t. 21. von der schwarzen *Meldenraupe* mit dem gelben Seitenstreif.

Wien. Schmetterl. p. 83. Θ.

4) Rothbraun.

No. 19. *Kopflatticheulenraupe* (Lactucae sativae capitatae); *Kopflatticheule*, Ph. *Oleracea.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 15. Phal. *Oleracea*, *Krauteule.*

Naturforsch. VII. p. 124. Ph. *Oleracea.*

Bekm.

*) Hier wird die *Raupe* die hellgraue und braungerautete *Baumraupe* genannt. Eine Verwechselung mit der folgenden Oxyacanthae im *Rösel.*

**) Nach der *Linnéischen* Beschr. besonders in der Faun. Suec. ed. 2. no. 1197. trifft alles aufs genaueste zu, besonders die beyden pommeranzengelben Flecke auf den Oberflügeln, und die beyden weissen Zickzacklinien am Hinterrande.

Bekm. Epit. Syst. L. p. 166. no. 171. Phal. *Oleracea.* Nom. *Linn.*

Onomat hist. nat. P. 6 p. 391. Ph. *Oleracea.*

Raj. Hist. Inf. p 166. no. 21.

Phalaena alis exterioribus atro - rubentibus, cum lineola alba prope imum marginem transversa, duos cuspides ad ipsum marginem emittente.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 157. no. 67. *Phalene de laitue.*

Fabric. Syst. E. p. 613. no. 97. NOCTUA *oleracea.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, livida, nigro-punctata; linea dorsali fusca, laterali alba.

Pupa nuda, nigricans.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1416. Ph. *Oleracea.* Nom. *Linn.*

β. *Barbata*, der *Haarafter* *).

Linn. Faun. Suec. ed. 2 p. 549. no. 2290.

Phalaena seticornis spirilinguis alis deflexis ferrugineo-cinereis; *maculis alba flavaque;* ano barbato ferrugineo.

Smolandis *Askepiesk.*

In *Urtica*, *Spinacia*, *Atriplice*, frequens aestate in domibus, lucentibus candelis se ipsam cremans.

L 3 *Descr.*

*) Ohnerachtet diese *Eule* mit der Oleracea viel ähnliches hat, so ist es doch nicht die nämliche, obgleich Hr. Degeer l. c dabey den *Frisch* und *Rösel* angeführt hat. *Linné* hat sie durch seine genaue Beschreibungen in der Faun. Suec. ed. 2. standhaft unterschieden. Dahin gehöret besonders das: maculis *alba flavaque ano barbato ferrugineo* Ich habe sie daher gleich als eine Abänderung der Oleraceae unterordnen wollen.

Descr. Alae *posticae* lineola alba: maculae duae obsoletae; *anterior alba*, *posterior flava.* *Anus* amplissimus, 3 valvis, *monstrosissimus*, barba rufa tectus. Alae *superiores* ferrugineo-nigrae, maculis et lineolis obsoletis albidis. Alae *subtus* pallidae puncto nigricante in medio. *)

Raj. Hist. Inf. p. 165. no. 20.

Phalaena media, corpore brevi crasso, alis exterioribus e pulvereo rubentibus, maculis nigris variis.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 420. no. 12. t. 7. f. 17. *Chenille* rase verte ou brune avec des points noirs et blancs, et une bande jaune de chaque côté.

Phalene rouffe *à ligne ondée blanche.*

Phalene à antennes filiformes à trompe; à ailes rabatues d'un brun rouffâtre avec deux taches, l'une blanche et l'autre jaune, et une ligne ondée blanche.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 305. t. 7. f. 17.

Die glatte grüne, oder braune *Raupe*, mit schwar-

*) Dies alles trifft von der *Röselschen* und wahren *oleracea* L. nicht zu. Von dieser heisst es Faun. Suec. ed. 2. p. 317. no. 1197. *Descr.* Fasciculus duplex thoracis a tergo: altero ad basin thoracis gibbo, altero ad apicem. *Phalaena tota fusca* est, sed in medio *alae superioris* versus marginem crassiorem *duae maculae pallidae*, quarum prior rotunda, posterior reniformis. Linea alba intra marginem posticum duplici dente exiens. Alae *inferiores* cinereae. *Anus* barbatus.

Das vom *Linné* bey Phal. *Oleracea* gesetzte Zitatum: *Frisch* VII. p. 29. t. 21 stehet auch bey dieser zwoten Abänderung in der Faun. Suec. ist aber richtiger jene, als diese. Wir haben diese letztere *Barbatam* wegen des ausserordentlich bebärteten Afters genennet.

schwarzen und weissen Punkten, und einer gelben Binde auf jeder Seite.

No. 12. die *braunröthliche Phaläne mit der geflammten weissen Linie.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüssel, und braunröthlichen, niederhangenden Flügeln, mit zween Flecken, einem weissen und gelben, und einer weissen gewässerten Linie.

172. *Pisi*, die *Erbseneule.*

Müller l. c. p. 699. no. 172. der *Hülsenfresser.*

Füeßl. schweizer. Insekt. p. 39. no. 741. Ph. *Pisi*, die *Hülsenmotte.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 32. Ph. *Pisi.*
Raupen fressen auch andere Gewächse —
— haben viele *Zwirnwürmer*. (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. III. p. 284. no. 27. Ph. *Pisi*, die *Erbsmotte.*
Rothbraun, bisweilen rostfarbig grau, mit einigen blassschwefelgelben Flecken und schmalen Queerstreifen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1011. no. 3. Ph. *Pisi*, die *Erbsmotte.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 76. no. 217. Phal. *Pisi;* die *Erbsmotte*, der *Hülsenfresser.*

Rösels Insektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 275. t. 52. Die schöne rothbraune, mit vier gelben bandförmigen Streifen, einem fleischfarbigen Kopf und dergleichen Füssen gezierte *Rittersspornraupe.*

Wiener Schmetterl. p. 83. O.
4) Rothbraun.
No. 14. *Erbseneulenraupe* (Pisi sativi); *Erbseneule*, Ph. *Pisi.*

Fischers N. G. von Livl. p. 154. no. 367. Ph. *Pisi*, der *Hülsenfresser.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 397. Ph. *Piſi*, der *Erbſenvogel.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 160. no. 10.

Phalaena mediae magnitudinis, alis oblongis, e fuſco rubentibus, nigro et albo variegatis.

Fabric. S. E. p. 610. no. 88. NOCTUA *Piſi.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, ferruginea; lineis quatuor flavis; capite incarnato.

Pupa fuſca, inciſuris ſanguineis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 404. Ph. *Piſi.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1417. Phal. *Piſi.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 440. no. 10. *Phalene rouſſe à raye blanche en Ziczac.*

Phalene à antennes filiformes à trompe et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun rouſſâtre à taches et rayes brunes, noirâtres et griſes, avec une raye ondée blanche proche du bord poſtérieur.

— *Chenille* raſe brune ou verdâtre avec quatre rayes longitudinales jaunes de Citron.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 322. no. 10. die *braunröthliche Phaläne mit der weiſſen Zikzakſtreife.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden braunröthlichen Flügeln, mit braunen, ſchwärzlichen und grauen Flecken und Streifen, nebſt einer weiſſen gewäſſerten Streife dicht am Hinterrande.

Die *Raupe* glatt, braun oder grünlich, mit vier längſt herunterlaufenden zitrongelben Streifen.

173. *Atriplicis*, die *Meldeneule.*

Müller l. c. p. 699. no. 173. der *Meldensauger.*

Berlin. Magaz. III. p. 286. no. 29. Ph. *Atriplicis*, die *Meldenmotte.*

Braun, mit gelbgrünen Flecken, in den *Oberflügeln* ein hellokergelber Fleck.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 58. no. 157. Phal. *Atriplicis*, die *Meldenmotte.*

Röfels Infektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 177. t. 31. die glatte, hellbraune, dunkelgeftreifte und weifsgefprenkelte *Raupe*, auf dem *Flöhkraut* oder *Wafferpfeffer.**)

Wiener Schmetterl. p. 82. O.

3) Grüngemifcht.

No. 10. *Meldeneulenraupe* (Atriplicis patulae); *Meldeneule*, Ph. *Atriplicis.*

Onomat. hift. nat. P. 6. p. 318. Ph. *Atriplicis*, der *Meldenvogel.*

Cathol. A. p. 586. Phal. *Atriplicis.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 91. NOCTUA *Atriplicis.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, rufefcens, albo-punctata lineaque dorfali fufca.

Pupa brunnea.

Geoffr. Inf. II. p. 159. no. 97.**)

Le *Volant doré.*

Long. 9. lign.

174. *Praecox*, die *rothgefäumte Eule.*

Müller l. c. p. 699. no. 174. der *Rothfaum.*

*) Den *Linneifchen* Karakter der Oberflügel: Lituram flavam *bifidam*, hat *Röfel* fehr gut ausgedrückt.

**) Die Befchreibung im *Geoffr.* aus der Faun. Suec. ed. 1. no. 875. gehöret zu *Chryfitis* L. ingleichen das Citatum *Raj.* p. 182. no. 45.

Berlin. Magaz. III. p. 286. no. 30. Phal. ***Praecox***, die *Parallelmotte.*

Seladongrün, mit ſchwarzen abgebrochenen Strichen und weiſslichen Flecken; der *Hinterrand roſtfarbig.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 20. Phal. *Praecox*, der *Rothſaum;* die *Parallelmotte.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 273. t. 51. die grünliche, grau- und oraniengelb gefärbte *Raupe.*

Wien. Schmetterl. p. 82. O.

3) Grüngemiſcht.

No. 12. *Unbekannte Raupe*; *Blaſsgrüne braungeränderte Eule*, Ph. *Praeceps.* *)

Fabric. S. E. p. 612. no. 94. NOCTUA *Praecox.*

Criſtata, alis deflexis, cinereis, bimaculatis; *poſtice faſcia rufa*, *abbreviata.*

Larva nuda, griſea; linea dorſali alba.

Pupa brunnea.

175. *Triplacia*, die *dreyhöckrichte Eule.* **)

Müller l. c. p. 699. no. 175. der *Dreyhöcker.*

Füeſsl. ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 742. Ph. *Triplacia.* der *Dreyhöcker.*

Auf *Neſſeln* nicht ſelten.

Berlin. Magaz. III. p. 288. no. 31. Ph. *Triplaſia*, die *Neſſelmotte.*

Bräun-

*) Wir tragen kein Bedenken, dieſe für L. *Praecox* zu halten, dazu die W. Entomologen ſelbſt geneigt ſind, da *Hufnagel* ſelbſt von der ſeinigen ſagt: *Seladongrün.* Vielleicht nur eine Verſchiedenheit des Geſchlechts.

**) Die *Raupe* hat drey *Höcker* auf dem Rücken. Die *Tripartita* Hufnag. *Berl. Magaz.* III. p. 414 no. 95. eine bloſse Varietät der Triplacia L. S. *Naturf.* IX. p. 139. no. 95.

Bräunlichgrau, an der Einlenkung der Flügel bräunlichgelb; an dem Innenrande dergleichen Fleck mit einem krummen Strich darüber.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 76. no. 214. Phal. *Triplacia*, der *Dreyhöcker*.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 190. t. 34. Die grüne, buckelichte *Mooßdiſtelraupe*.

Wien. Schmetterl. p. 91. Y. *Afterſpannraupen*, Larvae *Pſeudogeometrae; blendende Eulen*, Ph. N. *Submetallicae*.

No. 1. *Neſſeleulenraupe* (Vrticae dioicae); *Neſſeleule*, Ph. N. *Triplaſia*.

Fabric. S. E. p. 617. no. 114. NOCTUA *Triplacia*. Nom. *Linn*.

Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 402. Ph. *Triplacia*. Nom. *Linn*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1420. Phal. *Triplacia*. Nom. *Linn*.

Geoffr. Inſ. II. p. 152. no. 85.

Phalaena ſeticornis, ſpirilinguis, alis deflexis fuſcis; *ſuperioribus* lineis rufis, baſique macula fulva. — L'*aile brune à baſe fauve*.

Long. 7 lign.

Degeer Inſ. I. Mém. 3. p. 123. t. 6. f. 13-21.

Chenille raſe, verte, rayée de blanc, à trois taches obſcures ſur le dos, qui mange les feuilles de l'Ortie et qui marche en quelque ſorte à la maniere des *Arpenteuſes*, bien qu'elle a ſeize jambes complettes.

— — p. 699. t. 6. f. 20. 21.

Phalene à antennes en filets, d'un brun d'agathe, à deux rayes noires, qui renferment une petite tache triangulaire noire.

Degeer

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 442. no. 12. *Phalene à lunettes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues d'un brun d'agathe, avec deux rayes courbées, et une tache triangulaire noire.

— *Ueberſ.* I. 1 Qu. p. 93. t. 6. f. 13-21.

Die glatte, grüne, weiſsgeſtreifte *Neſſelraupe*, mit drey dunklen Rückenflecken, und ſechzehn vollſtändigen Füſsen, welche aber doch gewiſſermaſsen wie die Spannmeſſer zu gehen pflegt.

— — 4 Qu. p. 122. t. 6. f. 20. 21. Ein achatbrauner *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, und zwo ſchwarzen Streifen, zwiſchen welchen ein kleiner ſchwarzer dreyeckiger Fleck liegt.

— II Th. I B. p. 323. no. 12.*) *Phalene à lunettes*, die *Brillenphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm und niederhangenden achatbraunen Flügeln, mit zwo ſchwarzen gekrümmten Streifen, und einem dreyeckigen Fleck von gleicher Farbe.

Réaum. Inſ. I. t. 37. f. 1. 2. 3.

176. *Satellitia*, die *Trabanteneule.*

Müller l. c. p. 700. no. 176. der *Trabant.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 743. Ph. *Satellitia.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Ber-

*) Hierbey iſt zu erinnern, daſs in der Ueberſ. die vom *Degeer* angeführten Zitata des Linné, Geoffr. und Réaum. aus Verſehen ausgelaſſen ſind.

Berlin. Magaz. III. p. 418. no. 102. Ph. *Transversa*, die *Queermotte.*

Rothbraun, mit vielen dunklern Queerstreifen, und einem weissgelben Fleck in der Mitte der Flügel, unter welchem noch zween ganz kleine stehen.

Naturforscher IX. p. 143. no. 102. Ph. *Transversa* ist L. *Satellitia* (von *Rottemb.*).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 20. no. 38. Ph. *Satellitia*, der *Trabant.*

Rösels Insektenbel. III. p. 287. t. 50.

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige *schwarze Raupe* mit dem braunen Kopfe und einer abgesetzten hellen Seitenlinie — auf den Stachelbeeren.

Wiener Schmetterl. p. 86. R No. 5. *Frühebirnraupeneule* (Pyri communis); *Frühebirneule*, Phal. *Satellitia.*

Fabric. S. E. p. 609. no. 81. NOCTUA *Satellitia.* Nom. *Linn.*

Larva nigra, linea laterali alba.

Pupa brunnea, postice obtuse tridentata.

177. *Tragoponis*, die *Bocksbarteule.*

Müller l. c. p. 700. no. 177. der *Bocksbart.*

Füessl. schweiz. Ins. p. 39. no. 744. Ph. *Tragoponis.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 40. Phal. *Luciola*, der *Einsiedler.*

Glänzendgraubraun mit 3 kleinen schwärzlichen Flecken auf jedem Oberflügel.

Naturforscher IX. p. 115. no. 40. Ph. *Luciola* ist L. *Tragoponis* (von *Rottemb.*).

Frisch Ins. XI. p. 33. 2 Pl. t. 9. von der grünen *Rittersspornraupe* mit schwarzen Strichen.*)

Wie-

*) Unrichtig, dass die Seitenlinien schwarz sind; sie sind alle weiss.

Wiener Schmetterl. p. 85. Q.

1) Ohne Queerſtriche.

No. 14. *Bocksbarteulenraupe* (Tragoponis pratenſis); *Bocksbarteule*, Ph. *Tragoponis.*

Fabric. S. E. p. 615. no. 107. NOCTUA *Tragoponis.* Nom. *Linn.*

— poſticis *lividis.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 45. no. 398. Ph. *Tragoponis.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 123. no. 1421. Ph. *Tragoponis.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 418. t. 7. f. 15.

Phalene griſe tête-jaune.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues d'un gris cendré très-luiſant, avec trois points noirs au milieu; à tête jaune.

Chenille raſe d'un verd clair à cinq lignes fines blanches tout le long du corps.

— *Ueberſ.* II. Th. I B. p. 303. no. 10. t. 7. f. 15. die *graue Phalene mit gelbem Kopfe.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und ſehr glänzend-aſchgrauen niederhangenden Flügeln, mit drey ſchwarzen Mittelpunkten und gelbem Kopfe.

Die *Raupe* glatt, hellgrün, mit fünf feinen weiſſen Linien längſt dem Körper.

178. *Nigricans*, der *Schwärzling.* *)

Müller l. c. p. 700. no. 178. der *Schwärzling.*

Wien. Schmetterl. p. 81. N.

3) Mit verfinſterten Makeln.

No. 19. *Wegewarteulenraupe* (Cichorii Intybi); *Wegewarteule*, Ph. *Nigricans.*

Fa-

*) *Nicht abgebildet.*

Fabric. S. E. p. 616. no. III. NOCTUA *Nigricans.* Nom. *Linn.*

Puncta aliquot minutissima ad marginem crassiorem.

179. *Tritici*, die *Weizeneule.*

Müller l. c. p. 700. no. 179. die *Kornähre.*

Frisch Inſ. X. p. 21. no. 19. 3 Pl. t. 19. von der *Halmraupe.*

Wien. Schmetterl. p. 81. N.

2) Mit hellen oder deutlichen Ring- und Nierenmakeln.

No. 10. *Weizeneulenraupe* (Tritici hiberni *Spicis*); *Weizeneule*, Ph. *Tritici.*

180. *Polymita*, die *Rettigeule.*

Müller l. c. p. 700. no. 180. der *Rettigbeisser.*

Wiener Schmetterl. p. 72. H.

No. 4. *Rettigeulenraupe* (Raphani Sativi); *Rettigeule*, Ph. *Polymita.*

Merian. Eur. t. 35?

181. *Pyramidea*, die *Pyramideneule.*

Müller l. c. p. 701. no. 181. der *Flammenflügel.*

Füeßl. schweiz. Inſ. p. 39. no. 745. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 33. Phal. *Pyramidea.*

1) Zwo Raupen dieser Art mit andern *Strichen und Punkten* als die *Röselschen.*

2) Weder *Reaumür* noch *Rösel* haben die *sonderbare Stellung* dieser Raupe bemerkt, die der von der Ph. *Camelina* L. n. 80. ähnlich ist, und worinn sie oft *länger* als diese bleibt.

3) Bey-

3) Beyde haben ſich in einem zuſammengezogenen *Blatte* — *eine* in einem eyförmigen Gewebe, die *andere* ohne anderes Geſpinnſte, verwandelt — hat ſie mit *Haſelnuſsblättern* gefüttert. (Chorh. *Meyer.*)

Berlin. Magaz. III. p. 288. no. 32. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

Dunkelbraun, mit theils ſchwarzbraunen, theils gelblichen Zeichnungen, die Unterflügel rothbraun.

— — p. 422. not. E. Bey dieſer Phaläne hat *Röſel* eine *ganz falſche Raupe* angegeben. *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 12. no. 11. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramidenmotte*, der *Flammflügel.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 73. t. 11. die glatte, blaſsgrüne *Pyramidenraupe*, die eine pyramidenähnliche Erhöhung auf den zwey hinterſten Abſätzen führt.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 648. no. 18. et p. 745. 820. Ph. *Pyramidea*, die *Pyramide.*

Wien. Schmetterl. p. 71. G.

1) Mit kupferbraunen Flügeln.

2) Raupen mit erhabenem geſpitzten Hinterleibe.

No. 1. *Nuſsbaumeulenraupe* (Juglandis regiae); *Nuſsbaumeule*, Ph. *Pyramidea.*

Fi-

*) Die vom *Röſel* angegebene *Raupe* hat hinten die pyramidenförmige Erhöhung, und ſtimmt mit der *Linnéiſchen* Beſchreibung und *Réaumurs* Abbildung derſelben vollkommen überein. Ich möchte denn wohl wiſſen, wenn die *Röſelſche* angegebene Raupe ganz falſch ſey, welches die wahre *Raupe* der Ph. *Pyramidea* wäre. Hr. *Hufnagel* hat ſich alſo geirret. Denn ich habe den Vogel aus eben dergleichen Raupen, wie Röſel abgebildet hat, oft gezogen. Man findet ſie häufig in den Gärten.

Fischers N. G. von Livl. p. 154. no. 368. Ph. *Pyramidea*, der *Flammenflügel.*

Raj. Hist. Inf. p. 159. no. 9.

Phalaena media, alis longis, angustis; *exterioribus* lineis et areolis nigris, albis, atro-rubentibus, transversis pulchre depictis; *interioribus* obscure rubris..

— Ib.

Eruca viridis, glabra, lineis albis secundum longitudinem ductis varia, angulosa in extremo dorso eminentia seu spina dotata.

Fabric. S.E. p. 612. no. 95. NOCTUA *Pyramidea.*

Cristata, alis fuscis; strigis tribus undatis, flavescentibus repandis; *posticis* ferrugineis.

Larva nuda, viridis, linea dorsali lateralibusque albis, postice *conico-gibba.*

Pupa brunnea.

Geoffr. Inf. II. p. 160. no. 99.

Phalaena seticornis spirilinguis, alis deflexis; *superioribus* fuscis, lineis transversis undulatis nigris, *inferioribus* ferrugineis.

La *Brunette à ailes inférieures rougeâtres.*

Long. 11. lign.

Chenille verte, et à sa partie postérieure relevée en pointe, comme *le bout d'un bateau.*

182. *Flavicornis*, das *Gelbhorn.*

Müller l. c. p. 701. no. 182. das *Gelbhorn.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 38. no. 746. Ph. *Flavicornis*, das *Gelbhorn.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 163. die glänzende blaſsgrüne und ſchlanke *Raupe* mit gelben Strichen. *)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 271. t. 50. die glänzende blaſsgrüne und ſchlanke *Eichenraupe* mit gelben Streifen.

Wiener Schmetterl. p. 72. H. No. 6. *Hageicheneulenraupe* (Quercus Roboris); *Hageicheneule*, Ph. *Flavicornis* — et p. 151. wo eine Berichtigung wegen *Schäffers* Zitati.

Fabric. S. E. p. 617. no. 113. NOCTUA *Flavicornis.* Nom. *Linn.*

Larva nigra, albo - punctata, capite brunneo.

— Mantiſſ. p. 283. — 33-34.

Noctua laevis, alis deflexis cinereis, ſtrigis duabus undatis albis; macula centrali nivea: *lunula nigra.* **)

Habitat in Germaniae *Quercu.*

Larva glabra *viridis*, utrinque lineis duabus longitudinalibus flavis.

183. *Leu-*

*) Wir trugen anfänglich Bedenken, *Röſels* t. 50. und *Fabric.* Mant. hierbey anzuführen; allein, auſserdem, daſs die *Röſelſche* Phaläne das weſentliche Kennzeichen des Linné: Flavicornis hat, und mit der übrigen Beſchreibung ziemlich übereinſtimmt, ſo ſagen die *Wien. Entomologen*: „Bergmann hat zwar ſeine Flavicornis vom Pappelbaume; wir erhalten ſolche Eulen immer nur häufig von der Eiche. Es ſtimmen freylich nur wenige davon mit der Beſchr. des Ritters L. überein: allein *dieſe Art ſpielt in ihren einzelen Eulen ſo verſchieden, daſs ſich ſelten zwo recht ähnlich ſehen.*"

Fabric. ſagt: habitat in *Pomonae arboribus*, und giebt die *Raupe* für ganz *ſchwarz* aus, welches der einzige Zweifel iſt, der uns übrig bleibt.

**) Dieſe Beſchreibung trifft genau bey der *Röſelſchen* zu.

183. *Leucomelas*, die *weiß- und schwarze Eule.* *)
Müller l. c. p. 701. no. 183. die *Weißwolke.*
Füeßl. schweiz. Inf. p. 39. no. 747. Ph. *Leucomelas*, die *Elster.*
Berl.Mag. III. p. 288. no. 12. Ph. *Leucomelas*, die *Elster.*
Die *Oberflügel* schwarz, mit Grau schattirt; die *Unterflügel* schneeweiss mit einem breiten schwarzen Rande.
Wien. Schmetterl. p. 90. W. *Bogenstrichraupen;* Larvae *Curvilineatae; zweydeutige Eulen*, Ph. N. *Aequivocae.*
2) Schwarz, oder schwarzfleckicht.
No. 6. *Unbekannte Raupe. Schwarze weißmackelichte Eule*, Ph. *Leucomelas.*
Naturforscher XIV. p. 90. t. 4. f. 10. Beschr. der Ph. *Leucomelas* L. (*Capieux.*)
Fabric. Syst. E. p. 613. no. 98. NOCTUA *Leucomelas.* Nom. *Linn.*

184. *Bimaculosa*, der *Doppelfleck.* **)
Müller l. c. p. 701. no. 184. der *Schwarzfleck.*

185. *Dipsacea*, die *Karteneule.*
Müller l. c. p. 702. no. 185. der *Kartenvogel.*
Berlin. Magaz. III. p. 406. no. 84. Ph. *Viriplaca*, der *Grünzling.*
Grünlich, blassgelb, mit zwo dunklern Binden, und einem braungeränderten Fleck. Die *Unterflügel* blassgelb mit schwarzem Rande.

*) Diese *Leucom.* L. ist weder die *Schäfferſche* Icon. t. 51. f. 11. 12. noch des *Geoffr.* II. p. 149. n. 80. *Alchymiste.* S. *Wien. Schmett.* p. 150.

**) *Nicht abgebildet.* Diese verdiente es vor andern. Wenn sie Herr *Schaller* in Halle besitzt, so schlage ich den Naturforscher und *Capieux's* Meisterhand vor.

Naturforscher IX. p. 136. no. 84. Ph. *Viriplaca* ift L. *Dipſacea* (v. *Rottemb.*).

Wiener Schmetterl. p. 89. W.

1) Die Oberflügel oliv- oder buntfarbig.

No. 3. *Mengelwurzeulenraupe* (Rumicis acuti); *Mengelwurzeule*, Ph. *Dipſacea.*

Fabric. S. E. p. 598. no. 52. NOCTUA *Dipſacea.* Nom. *Linn.*

186. *Typica*, der *Splitterſtrich.*

Müller l. c. p. 702. no. 186. der *Splitterſtrich.*

Füeßl. ſchweizer. Inſ. p. 39. no. 748. Phal. *Typica*, das *Netz.*

Auf den *Weiden:* ſelten.

Berlin. Magaz. III. p. 290. no. 34. Ph. *Typica*, das *Netz.*

Graubraun, mit einem nierenförmigen dunkeln Fleck, und netzförmigen blaſsgelben Strichen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 22. Ph. *Typica*, der *Splitterſtrich.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 286. t. 56. die erdbraune *Raupe* mit hellen Seitenſtreifen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 744. no. 39. Ph. *Typica*, das *Netz.*

Wien. Schmetterl. p. 82. O.

2) Graulich mit weiſſen Linien die Oberflügel.

No. 4. *Flechtweideneulenraupe* (Salicis Pentandrae); *Flechtweideneule*, Ph. *Typica.*

Fabric. Syſt. E. p. 613. no. 96. NOCTUA *Typica.* Nom. *Linn.*

Larva nuda griſea, lateribus albis, linea nigra.

Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1422. Ph. *Typica.* Nom. *Linn.*

187.

187. *Lucipara*, der *Purpurglanz.* *)

Müller l. c. p. 702. no. 187. der *Purpurglanz.*
Berlin. Magaz. III. p. 404. no. 80. Ph. *Dubia*, der *Leberfleck.*

Hellgelbbraun, mit einer ſchwarzbraunen breiten Binde, und einem hellgelben nierenförmigen Fleck.

Naturforſch. IX. p. 135. no. 80. Ph. *Dubia* iſt L. Ph. *Lucipara.* (v. *Rottemb.*)
Wiener Schmetterl. p. 84. P.

No. 3. *Brombeerſtraucheulenraupe* (Rubi fruticoſi); *Brombeerſtraucheule*, Ph. *Lucipara.*

188. *Delphinii*, der *Purpurflügel.*

Müller l. c. p. 702. no. 189. der *Ritterſporn.*
Berlin. Magaz. III. p. 290. no. 35. Phal. *Delphinii*, die *Roſenmotte.*

Purpurroth; theils heller, theils dunkler; die *Unterflügel* gelblich braun.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 81. t. 12. die veilblaue, gelbgeſtreifte und ſchwarzgeſprengte *Raupe* auf dem Ritterſporn.
Wien. Schmetterl. p. 87. T.

3) Purpurfarben.

No. 8. *Ritterſporneulenraupe* (Delphinii Conſolidae); *Ritterſporneule*, Ph. *Delphinii.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 384. Ph. *Delphinii*, der *Ritterſpornvogel.*
Fabric. S. E. p. 610. no. 87. NOCTUA *Delphinii.* Nom. *Linn.*

Larva laevis, nuda, flaveſcens, nigro-punctata lineisque duabus flavicantibus.

Pupa brunnea.

*) *Nicht abgebildet.*

Geoffr. Inſ. II. p. 164. no. 109.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis roſeis ſuperioribus faſcia duplici limboque albidis.

L'*Incarnat.*

Long. 7. lign.

189. *Citrago*, die *Zitroneule.*

Müller l. c. p. 702. p. 189. der *Zitronvogel.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 41. Ph. *Umbra*, die *Zimmetmotte.*

Pomeranzengelb, mit breiten braungelblichen Binden an dem Hinterrande; die *Unterflügel* blaſsgelb mit einem ſchwärzlichen Rande.

Naturf. IX. p. 115. no. 41. Ph. *Umbra.* (Umſtändlich beſchrieben. Zuletzt: ich bin noch ungewiſs, ob es nicht die Ph. *Citrago* L. iſt. von *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 745. no. 43. Ph. *Citrago.*

Die gelbe *Nachteule* mit drey roſtfarbigen ſchrägen Queerbinden.

Wien. Schmetterl. p. 86. S. *Bleichkopfraupen*, Larvae *Ochrocephalae; goldgelbe Eulen*, Ph. N. *Aureolae.*

No. 3. *Steinlindeneulenraupe* (Tiliae Europaeae); *Steinlindeneule*, Ph. *Citrago.*

Neuer Schaupl. der Nat. II. p. 157. Ph. *Citrago, Zitronvogel.*

Fabric. Syſt. Ent. p. 606. no. 67. NOCTUA *Citrago.*

Criſtata, alis incumbentibus, luteis, ferrugineo-ſubfaſciatis.

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 429. no. 4. t. 7. f. 25.

Phalene à antennes filiformes à trompe, et à corcelet huppé; à ailes rabatues jaunes à quatre rayes transverſes, et deux cercles ovales roux.

Pha-

Phalene jaune à rayes rousses.

Chenille rase brune ou griseâtre marquée de plusieurs taches noirâtres, et à seize pattes.

Degeer Uebers. II Th. II B. p. 313. no. 4. t. 7. f. 25.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, Rückenkamm, und gelben niederhangenden Flügeln, mit vier braunrothen Queerstreifen, und zween dergleichen eyförmigen Zirkeln.

Die gelbe braunrothgestreifte Phaläne.

Die *Raupe* glatt, braun oder graulich mit verschiedenen schwärzlichen Flecken, und sechzehn Füssen.

190. ***Fulvago***, der ***Rostpunkt.***

Müller l. c. p. 703. no. 190. der ***Rostpunkt.***
Wien. Schmetterl. p. 86. S. No. 1. ***Weißbirkeneulenraupe*** (Betulae albae); ***Weißbirkeneule***, Phalaena ***Fulvago.***
Clerk Icon. t. 6. f. 15.

191. ***Depuncta***, der ***Punktstrich.****)

Müller l. c. p. 703. no. 191. der *Punktstrich.*
Othon. Fabric. Faun. Grönl. p. 195. no. 148. Phal. *Depuncta.* Nom. *Linn.*

192. ***Litura***, der *Dreystrich.* **)

Müller l. c. p. 703. no. 192. der *Dreystrich.*
Wien. Schmett. p. 77. M.
1) mit schwärzlichen Punkten am Aussenrande. No. 2. *Korbweideneulenraupe* (Salicis amygdalinae); *Korbweideneule*, Ph. *Litura.*

*) *Nicht abgebildet.*
**) *Nicht abgebildet.*

193. *Retusa*, der *Stumpfflügel.* *)

Müller l. c. p. 703. no. 193. der *Oblatenflügel.*
Wien. Schmetterl. p. 88. T.
5) Olivenbraun und wicklerförmig.
No. 18. *Bandweideneulenraupe* (Salicis viminalis); *Bandweideneule*, Ph. *Retusa.*

Unabgebildete Linnéische Eulen.

(Ph. *Noctuae.*)

1. *Sylvina.* No. 87.
2. *Ancilla.* No. 93.
3. *Parthenias.* No. 94.
4. *Algira.* No. 98.
5. *Ocularis.* No. 100.
6. *Sanguinolenta.* No. 101.
7. *Narbonea.* No. 103.
8. *Mi.* No. 106.
9. *Nivea.* No. 108.
10. *Heliconia.* No. 111.
11. *Pacta.* No. 120.
12. *Circumflexa.* No. 128.
13. *Virens.* No. 139.
14. *Affinis.* No. 144.
15. *Triptera.* No. 145.
16. *Diffinis.* No. 146.
17. *Putris.* No. 152.
18. *Comma.* No. 156.
19. *Vaccinii.* No. 166.
20. *Plebeja.* No 168.
21. *Polyodon.* No. 170.
22. *Nigricans.* No. 178.
23. *Bimaculosa.* No. 184.
24. *Lucipara.* No. 187.

25. *De-*

*) *Nicht abgebildet.*

25. *Depuncta.* No. 191.
26. *Litura.* No. 192.
27. *Retusa.* No. 193.

NEUE EULEN.

(Phal. *Noctuae.*)

1. *Allica*, der *ostindianische Blaufleck.*

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. Anim. p. 225.
Phalaena N. spirilinguis laevis, flava; alis superioribus maculis duabus coeruleis connexis, margine coeruleo.

Müllers Suppl. u. Reg. B. p. 309. no. 116. a. Phal. *Allica*, der *Blaufleck.*

2. *Decora*, die *kapensische Schöne.*

Linn. S. N. ed. 12. App. p. 1064. no. 14.
Phalaena subspirilinguis; alis *superioribus* albo-nigroque variegatis; *inferioribus* rubris margine nigro.

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 11. t. 7. Fig. E F. (Mas), Ph. Hibou *Julie.* (v. p. 155. *Addit.* Ph. *Decora* Linn.)

— — Vol. III. p. 44. t. 219. Fig. F G. Phal. *Decora* — du *Cap. de B. E.*

Houttuin Hist. Nat. Tom. I. p. XII. p. 676. t. 92. f. 6. (*Femina.*)

Petiv. Gazoph. t. 58. f. 7.

Müllers Suppl. u. Reg. B. p. 311. no. 193. c. Ph. *Decora*, die *Docke.*

3. *Deplana*, der *Flachflügel.*

Linn. Mantiss. p. 539.

Phalaena ſpirilinguis, laevis, alis depreſſis; *ſuperioribus* lividis, margine baſeos nigris.
Statura et ſimilitudo ſumma Ph. *Complanatae*, ſed *paulo maior.*

Fabric. S. E. p. 595. no. 20. NOCTUA *Deplana.*
Laevis, alis incumbentibus, cinereis, thorace flavo.
In *Europae hortis.*

Müllers Suppl. u. Reg. B. p. 309. no. 116. b. Ph. *Deplana*, der *Hangflügel.*

4. *Argentea*, der *ſilberfleckige Mönch.*

Berl. Mag. I. p. 648. c. fig. 1-4.
Beſchreibung einer ſeltenen bisher unbekannten *Raupe*, und der daraus entſtehenden *Phaläne* (*Hufnagel*).

— III. p. 286. no. 28. Ph. *argentea.*
Die *Oberflügel* gelblichgrün, *mit 7 ſilberglänzenden Flecken* und weiſſem Rande; die *Unterflügel* ganz weiſs.

Naturforſcher IX. p. 113. no. 29. Ph. *argentea.*
Einer der *ſchönſten und ſeltenſten* europäiſchen Nachtvögel (v. *Rottemb.*).*)

Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 45. no. 8. t. 3. f. 2. Ph. *argentea*, der *ſilberfleckichte Mönch.* (*illumin.*)

Füeſſl. Archiv der Entomol. I Heft, 4 Bogen, t. 5. f. 1-7. Naturgeſchichte des *Silbermönchs.* Phal. N. *argentea.*

(P. *Herbſt:*

*) Die *Hufnagelſche* Abbildung, ſagt Hr. v. *Rottemb.* ſey etwas ſchlecht gerathen; er verſpricht daher eine getreuere und beſſere Abbildung dieſes ſeltnen Vogels.

(*P. Herbst: vortrefflich abgebildet und illuminirt.*)

Ph. N. cristata, seticornis, spirilinguis, alis deflexis, superioribus viridibus, maculis septem argenteis; posticis albidis, margine dilutiore cinereo.

(Die Larve mit Fliegenmaden behaftet.)

5. *Artemisiae*, der *bunte Mönch.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 38.

Dunkelaschgrau, so an einigen Orten ins Helle fällt, mit einem nierenförmigen Fleck und andern Zeichnungen.

Naturforsch. IX. p. 114. no. 38. Ph. *Artemisiae* — Der Ph. *Absinthii* L. sehr gleich. *Unterscheidungszeichen* lassen sich nicht beschreiben, sondern am besten durch den Augenschein erkennen (v. *Rottemb.*).

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 81. no. 232. die schöne grüne *Kamillenraupe* mit rothen dornenähnlichen Spitzen, der N. V. 2 Kl. *Artemisia.*

Rösels Insektenbelustig. III. p. 289. t. 51. f. 1-4. — die schöne grüne *Kamillenraupe* etc. (*ohne Vogel.*)

Wien. Schmetterl. p. 73. I. *Tigerraupen; kappenhalsigte Eulen.*

1) Weiss mit Roth und grün: *die Raupen.*

No. 2. *Stabwurzeulenraupe* (Artemisiae Abrotani et campestris); *Stabwurzeule*, Ph. N. *Abrotani.*

— — *Nachtrag* p. 312. q. (1) *Beyfußeule.* Anmerk. (*Hufnagel.*)

6. *W latinum*, das *lateinische W.*

Berlin. Magaz. III. p. 294. no. 39.

Grau-

Graubraun, mit einem unmerklichen nierenförmigen Fleck; in der blaſsgelben Randlinie ein lateiniſches W.

Naturf. IX. p. 114. no. 39. Ph. *W*. (v. *Rottemb.*) — Die Gröſse wie Ph. *Oleracea* L.

7. *Icteritia*, die *Sommerſproſſe*.

Berlin. Magaz. III. p. 296. no. 43.

Blaſsſchwefelgelb, mit röthlichen zerſtreuten Flecken und Punkten; die Unterflügel weiſs.

— — p. 423. G. eine *durchaus blaſsgelbe*, nur in der Mitte der Oberflügel ein bräunlichrother kleiner Fleck.

Naturf. IX. p. 117. no. 43. Phal. *Icteritia*. Der in der Anm. G. eine bloſse Varietät der Icteritia (v. *Rottemb.*). die Gröſse wie Ph. *Oo* L.

8. *Munda*, die *Dachmotte*. *)

Berlin. Magaz. III. p. 296. no. 45.

Ganz blaſsgelb, mit einem braunen Hinterrande und 2 ſchwarzen Punkten in der Mitte der Flügel.

Naturf. IX. p. 118. no. 45. Ph. *Munda*. — Zu den kleinſten dieſer Art, viel ähnliches mit den *Blattwicklern*.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 650. no. 22. Ph. *Munda*, die *Dachmotte*.

9. *Tha-*

*) Faſt ſollt ich dieſe mit L. *Mundana* no. 17. für einerley halten, zumal da Hr. von *Rottemb.* ſagt: ſie habe viel ähnliches mit den *Blattwicklern*. Daher hab ich auch bey der Mundana L. den Gleditſch bereits angeführt. Noch kann ichs nicht mit Gewiſsheit entſcheiden.

9. *Thalassina*, der *Rothglanz*.

Berlin. Magaz. III. p. 298. no. 46.

Glänzend, bräunlichgelb, dunkelschattirt, mit einem blaſsgelben nierenförmigen Fleck.

Naturforsch. IX. p. 119. no. 46. Ph. *Thalassina*. In der Gröſse der Ph. *Pisi* (v. *Rottemb.*).

10. *Incerta*, der *Chamäleon*.

Berl. Magaz. III. p. 298. no. 47.

Bald gelbroth, bald aschgrau, bald rothbraun, mit einem dunklen nierenförmigen weiſs eingefaſsten Fleck.

— — p. 424. H. weichen sehr in ihren Zeichnungen ab.

Naturf. IX. p. 119. no. 47. Ph. *Incerta*. (von *Rottemburg.*)

Rösels Insektenbel. I. V. N. 2 Kl. p. 278. t. 53. die gelblichgrüne mit 3 gelben Streifen gezierte glatte *Raupe* auf den Kirschbäumen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 16. no. 21.*) p. 33. no. 81. Ph. *Incerta*; Ph. *Cerasi*, die *Kirschmotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 555. no. 6. et II. p. 746. no. 45. Ph. *Incerta*, der *Chamäleon*.

Im *Junio* häufig auf Erlen und Weiden.

Füeſsl. Magaz. der Entom. II. p. 15. Ph. N. *Cerasi*.

1) *Raupe* friſst die Blätter vom *Schlehendorn*.

2) hat *Zwirnwürmer*.

3) der Vogel kömmt im warmen Zimmer schon den 23ten *Jänner* aus (Chorh. *Meyer*).

Fabric. S. E. p. 600. no. 42. NOCTUA *Cerasi*.

Lae-

*) Hier ist die Ueberschrift zu t. 55. aus Versehen zu t. 53. gesetzt, und das Zitatum am Rande LV muſs LIII heiſsen, wie p. 33. n. 81.

Laevis, alis deflexis, griſeo - ferrugineis; maculis ſtrigaque poſtica flaveſcentibus, margine nigro punctato.

In *Caraſo* Angliae, Germaniae.

Alae poſticae cinereae, nitidae, ſubtus puncto magno centrali, fuſco.

Larva flaveſcens, ſtriis tribus ſulphureis; capite coeruleo.

Pupa nuda, brunnea, poſtice bidentata.

11. *Morpheus*, der *Schmuz.*

Berlin. Magaz. III. p. 302. no. 52.

Schmuzgelb mit 2 grauen Binden; und einem dergleichen Fleck auf den Oberflügeln.

Naturforſcher IX. p. 121. no. 52. Ph. *Morpheus*: in der Gröſse der Ph. *Brunnea.* (von *Rottemb.*)

12. *Bicruris*, die *Winkelmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 302. no. 53.

Braun, mit Grau ſchattirt, und eine weiſſe Zeichnung in Form eines Winkels.

Naturf. IX. p. 121. no. 53. Ph. *Bicruris* (von *Rottemb.*).

Friſch Inſ. X. p. 14. no. 11. 3 Pl. t. 11. von der *Bilſenraupe.*

13. *Lucida*, die *Tagemotte.*

Berl. Magaz. III. p. 302. no. 52.

Schwarzbraun mit weiſſen Flecken, die Unterflügel weiſs mit breitem ſchwarzem Rande.

— — p. 424. I. die *Raupe* ſoll zu den *Spannmeſſern* gehören.

Naturf. IX. p. 122. no. 52. Ph. *Lucida.* Der Vogel gehört

gehört doch mit Recht zu den Noctuis. (v. *Rottemb.*)

— Etwas kleiner als Ph. *Fuliginosa.*

14. *Ornitopus*, die *Strichmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 304. no. 56.

Weiſs und grau marmorirt mit feinen grauen Zeichnungen, und gelben nierenförmigen Fleck.

Naturf. IX. p. 124. no. 56. Ph. *Ornitopus.* In der Gröſse der Ph. *Psi.* (von *Rottemb.*)

15. *Orbona*, die *Trauerbinde.* *)

Berl. Magaz. p. 304. no. 57.

Die *Oberflügel* rothbraun mit einem nierenförmigen braunen Fleck. Die *Unterflügel* oraniengelb mit ſchwarzem Rande und ſchwarzen Flecken.

Naturf. IX. p. 125. no. 57. Ph. *Orbona.* Nie gröſser als Ph. *Braſſicae.*

Vielleicht das *Männchen* von Phal. *Pronuba* — (von *Rottemb.*).

Unbekannte Raupe.

Degeer Inſ. II. Part. I. p. 401.

— Une autre eſpece, qui leur (Ph. *Pronuba*) reſſemble beaucoup, mais qui eſt conſtamment plus petite — en quantité en *Hollande.*

Merian. Eur. t. 63.

16. *Triangulum*, das *doppelte Dreyeck.*

Berl. Magaz. III. p. 306. no. 58.

Rothgelb oder braun, mit einem groſsen dun-

*) Viel ähnliches mit *Pronuba* L. n. 122. aber nur halb ſo groſs.

dunkelbraunen Fleck, ſo zwey mit ihren Spizen zuſammenſtoſsende Triangel vorſtellt.

Naturf. IX. p. 125. no. 58. Ph. *Triangulum.* In der Gröſse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*) *)

17. *Sordens*, der *Eſel.*

Berl. Magaz. III. p. 306. no. 59.

Bräunlichgrau mit einem ſchwärzlichen nierenförmigen, und einem länglicht runden Fleck.

Naturf. IX. p. 126. no. 59. Ph. *Sordens.* In der Gröſse der vorigen Ph. *Triangulum.* (v. *Rottemburg.*)

18. *Lateritia*, die *Ziegelmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 306. no. 60.

Ziegelfarbig, mit einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturf. IX. p. 127. no. 60. Ph. *Lateritia.*

Rothbraun. In der Mitte der Oberflügel ein dunkelbrauner nierenförmiger Fleck mit einer weiſslichen Einfaſſung.

Beynahe in der Gröſse der Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

19. *Monoglypha*, der *Treiber.*

Berl. Magaz. III. p. 307. no. 62.

Theils blaulich, theils hell, theils dunkelgrau mit einem lateiniſchen W an dem hintern Rande.

Na-

*) Noch eine beſondere Art, dieſem ſehr ähnlich. Die *Oberflügel* ganz ſchwarzbraun; in dieſem Grunde nahe am Oberrande zwey *kohlſchwarze Triangel*, die mit den Spitzen zuſammenſtoſsen. Der dazwiſchen befindliche Raum weiſslich, und ſtellt den dritten weiſsen Triangel vor. Die *Unterflügel* weiſsgrau. Eine *wirklich verſchiedene Art.* (v. *Rottemb.*)

Naturf. IX. p. 128. no. 62. Ph. *Monoglypha.* Vier helle gezackte Queerlinien auf den Oberflügeln, deren vierte zunächst am Aussenrande am meisten gezackt ist, und in der Mitte ein lateinisches W formirt. — Etwas kleiner als Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

20. *Subcorticalis*, die *Rindenmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 307. no. 63.

Schmuziggelb, mit einer Reihe schwarzer Punkte und braunem Vorderrande.

Naturf. IX. p. 128. no. 63. Ph. *Subcorticalis.* In der Mitte der Oberflügel ein nierenförmiger Fleck, der in der Mitte schwarzgrau, am Rande hellbraun, und mit einer braunen Linie eingefasst ist. (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 747. no. 49. Ph. *Subcorticalis*, die *Rindenmotte.*

21. *Velitaris*, die *Segelmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 394. no. 64.

Schmuziggelb, mit 2 braunen Queerstreifen, daran die hinterste unterbrochen ist.

Naturf. IX. p. 129. no. 64. Ph. *Velitaris.* Etwas kleiner als Ph. *Camelina* — steht mit Unrecht unter den Noctuis; das *Männchen* hat haarichte Fühlhörner (Antennas pectiniformes); also ein *Bombyx.* (v. *Rottemb.*)

Knochs Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 66. no. 14. t. 4. f. 8. Ph. *Bombyx* velitaris, die *Segelmotte.*

Elinguis, cristata; alis pallide moschatinis; superioribus strigis duabus albis undatis lineola intra apicem fusca.

22. *Irregularis*, der *Buntſcheck.*

Berlin. Magaz. III. p. 394. no. 65.

Schmuziggelb mit weiſſen Flecken, und ausgezackten braunen Queerſtreifen.

Naturforſch. IX. p. 130. no. 65. Phal. *Irregularis.* Zu den kleinern Arten: kaum ſo groſs, als Ph. Fuliginoſa — doch mit ſehr abwechſelnden Farben, und ſehr feinen Zeichnungen. (v. *Rottemb.*)

23. *Lunula*, das *Möndchen.*

Berlin. Magaz. III. p. 394. no. 66.

Graubraun, mit einigen dunkelbraunen Flecken, und einem kleinen ganz weiſſen mondförmigen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturforſcher IX. p. 130. no. 66. Ph. *Lunula.*

Noch kleiner als der vorige. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 29. Phal. *Lunula*, das *Möndchen.*

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 282. no. 39.*) t. 16. f. 15.

Ph. N. *Lunula*, ſpirilinguis criſtata, alis deflexis atro-purpureis, nebuloſis, lineola arcuata *flava.*

24. *Singularis*, der *Sonderling.* **)

Berlin. Magaz. III. p. 396. no. 67.

Röth-

*) Ich halte dieſen und die beyden *Röſelſchen* I. N. V. 2 Kl. t. 44. et 45. (*Müll.* Zool. Dan. Pr. no. 1430.) nebſt *Hufnagels* Lunula für lauter nahe verwandte Arten, oder auch wohl nur für bloſse Abänderungen. S. no. 55. 56.

**) Dieſe ſcheint der Hr. v. *Rottemb.* in ſeinem ſchönen *Erläuterungsregiſter* überſehen zu haben.

Röthlichbraun, theils heller, theils dunkler, mit einem blaſsfleiſchfarbenen ſehr gebogenen Haken.

25. *Simulans*, der *Heuchler.*

Berl. Magaz. III. p. 396. no. 68.

Graulichbraun, mit abgeſetzten, theils runden, theils eckichten Queerſtreifen.

Natürf. IX. p. 131. no. 68. Ph. *Simulans.*

Sehr undeutliche Zeichnungen. — In der Gröſse der Ph. *Atriplicis* — hat beſonders die Eigenſchaft, daſs er des Abends in die Stuben fliegt, und man des andern Tages öfters 10 bis 12 Stück in den Falten der Fenſtergardinen findet. — Seine Raupe iſt unbekannt. (von *Rottemburg.*)

26. *Brunnea*, der *Weiſsfleck.*

Berlin. Magaz. III. p. 396. no. 69.

Mattbraun mit Dunkelbraun ſchattirt, und einem weiſſen Fleck in der Mitte der Oberflügel.

Naturforſch. IX. p. 131. no. 69. Ph. *Brunnea.*

Kleem. Beytr. I. p. 155. §. 8.

Raupe Röſel III. t. 68. f. 6. die unanſehnliche braune *Erdraupe.*

Puppe und Vogel Kleem. l. c. t. 17. f. A B.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 21. no. 39. p. 41. no. 110. Ph. *Brunnea.*

27. *Trifolii*, das *Dreyblatt.*

Berl. Magaz. III. p. 398. no. 70.

Schmuziggelb und grau mit einigen blaſsgelben ſchmalen Queerſtreifen.

Naturf. IX. p. 131. no. 70. Ph. *Trifolii.* *Röſels* Vogel nicht völlig getroffen. (v. *Rottemb.*)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 265. t. 48. die *Spargelraupe* mit dem rothen Seitenſtreif.

Kleem. Beytr. I. p. 191. Anm. — die Raupe des *Röſels* t. 48. hat auch *Tobakskraut* gefreſſen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 329. Phal. *Trifolii.*

28. *Nana*, der *Zwerg.*

Berl. Magaz. III. p. 398. no. 71.

Weiſsgrau, ins Dunkelgraue vertrieben, mit einem weiſsgrauen zackichten Flecke in der Mitte der Oberflügel.

Naturf. IX. p. 132. no. 71. Ph. *Nana.*

In der Gröſse der Ph. *Triplaſia.* (v. *Rottemb.*)

29. *Sororcula*, die *Strohmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 398. no. 72.

Durchaus okergelb mit ſchmalen Flügeln.

Naturf. IX. p. 132. no. 72 Ph. *Sororcula.*

In der Gröſse der Ph. *Padella*, nach ſeinem Bau den Tineis ſehr ähnlich. (v. *Rottemb.*)

30. *Muſcerda*, der *Fliegenquark.*

Berlin. Magaz. III. p. 600. no. 73.

Mauſefarbig, mit 5 ſchwarzen Punkten auf jedem Oberflügel.

Naturf. IX. p. 133. no. 73. Ph. *Muſcerda.*

Gehört auch zu den *Schmalflüglichen.* (von *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 28. Ph. *Muſcerda*, der *Fliegenquark.*

31. *Crenata*, die *Spaltmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 402. no. 76.

Röth-

Röthlichbraun, mit einem nierenförmigen und einigen andern Flecken im braunen Grunde.

Naturf. IX. p. 133. no. 76. Ph. *Crenata.*

In der Gröſse der Ph. *Trifolii.* (von *Rottemb.*)

32. *Furcifera*, die *Gabelmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 402. no. 77.

Blaulichgrau, mit einigen braunen Zeichnungen, darunter die Figur einer *zweyzackichten Gabel.*

Naturforſcher IX. p. 134. no. 77. Ph. *Furcifera.*

In der Gröſse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

33. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 402. no. 78. et. p. 425. L.

Bräunlichgelb mit 2 braunen Queerſtreifen; die Unterflügel etwas brauner.

Die *Raupe* hat die Figur eines *Schildes.*

Naturf. IX. p. 134. no. 78. Ph. *Limacodes.*

Kleem. Beytr. I. p. 321. t. 38.

Das zur N. V. 2 Kl. gehörige einſame dicke, gelblichgrüne, gelbbordirte *Schildräuplein* ohne Bauchfüſse.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 68. no. 195. p. 85. no. 245. p. 92. no. 267. et p. 95. no. 276. Ph. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 600. no. 3. Ph. *Limacodes*, die *Schildmotte.*

34. *Circellaris*, die *Zirkelmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 404. no. 79.

Braungelb, mit einem kleinen ſchwarzgrauen Fleck in der Mitte der Flügel, und einer *zirkelförmigen Figur.*

Naturforsch. IX. p. 134. no. 79. Ph. *Circellaris.*
In der Gröſse der Ph. *Piſi.* (von *Rottemb.*)

35. *Domiduca*, die *Sturmhaube.*

Berlin. Magaz. III. p. 404. no. 81.
Mit abwechſelnden, hell- und dunkelbraunen ſchwarzgezogenen Queerbinden; die *Unterflügel* oraniengelb mit einem breiten ſchwarzen Rande.

Naturforſcher IX. p. 135. no. 81. Ph. *Domiduca.*
Ungemein viel ähnliches mit Ph. *Pronuba:* auch ſo groſs, aber doch 2 verſchiedene Arten. (v. *Rottemb.*)

Knochs Beytr. zur Inſektengeſch. I St. p. 63. no. 13. t. 4. f. 5.
N. ſpirilinguis criſtata, alis incumbentibus violaceis, faſciis ſaturatioribus; poſticis dilucide aurantiis ad baſin et faſcia ſubmarginali nigris.

Wien. Schmett. p. 78. no. 19. *veilblaulichte braunfleckichte Eule*, N. *Janthina.*

36. *Domeſtica*, der *Tieger.*

Berl. Mag. III p. 406. no. 83.
Grünlichgrau und blaſsgelb, mit verſchiedenen grünlichgrauen ſchwarzgeränderten Flecken.

Naturf. IX. p. 136. no. 83. Ph. *Domeſtica.*
1) die Hufnag. Beſchr. nicht recht paſſend.
2) die angegebene Gröſse unrichtig; nicht gröſſer als Ph. *Viridana* (v. *Rottemb.*).

37. *Pyrarga*, die *Meiſe.*

Berl. Magaz. III. p. 408. no. 85.
Weiſs und braun marmorirt, mit ſchwarzen Flecken; die Gegend des äuſsern Randes ganz weiſs.

Na-

Naturf. IX. p. 136. no. 85. Ph. *Pyrarga.*

Etwas gröſser als Phal. *Domeſtica.* (von *Rottemb.*)

38. *Trigrammica*, die *Bandmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 408. no. 86.

Blaſsgelb mit drey ſchmalen braunen Queerſtreifen.

Naturforſcher IX. p. 137. no. 86. Ph. *Trigrammica.*

In der Gröſse der Ph. *Oleracea.* (v. *Rottemb.*)

39. *Tricomma*, die *Lebermotte.*

Berl. Magaz. III. p. 408. no. 87.

Graubraun, bald heller, bald dunkler, mit gezackten Queerſtreifen, und 3 kleinen ſchwarzen und 3 weiſſen Strichen. *)

40. *Sagittigera*, der *Pfeilträger.*

Berlin. Magaz. III. p. 410. no. 88.

Bräunlichgrau mit verſchiedenen ſchwarzbraunen Zeichnungen, darunter einige die Figur einer *Pfeilſpitze* vorſtellen.

41. *Bicolorata*, die *Mausmotte.*

Berl. Mag. III. p. 410. no. 89.

Weiſslichgrau, mit einer dunklen braunen Binde, in welcher einige braune ausgebogene abgeſetzte Linien befindlich.

Naturf. IX. p. 137. no. 89. Ph. *Bicolor.*

In der Gröſse der Ph. *Fuliginoſa.* (von *Rottemburg.*)

*) Dieſe nebſt no. 40. und no. 42. vermiſſe ich bey dem Hrn. v. *Rottemburg.*

42. *Bombycina*, die *Wachtel.*

Berlin. Magaz. III. p. 410. no. 90.

Grau mit braunen Zeichnungen, einer weiſslichen Zirkelfläche; und weiſſem nierenförmigen Fleck.

43. *Griſea*, die *Graumotte.*

Berl. Magaz. III. p. 411. no. 91.

Ganz gelblich grau mit vielen zerſtreuten grauen und braunen Flecken.

Naturf. IX. p. 138. no. 91. Ph. *Griſea.*

In der Gröſse der Ph. *Fuliginoſa.* (von *Rottemburg.*)

44. *Tineodes*, die *Graſemücke.*

Berlin. Magaz. III. p. 412. no. 92.

Weiſslich, mit braunen ziemlich groſsen Flecken.

Naturf. IX. p. 138. no. 92. Ph. *Tineodes.*

Etwas gröſser als Ph. *Viridana.* (v. *Rottemb.*)

45. *Arabica*, der *Reuter.*

Berlin. Magaz. III. p. 412. no. 93.

Olivenbraun, mit untermiſchten hell ſchwefelgelben Streifen und Flecken.

Naturf. IX. p. 139. no. 93. Ph. *Arabica.*

In der Gröſse der Ph. *Viridana.*

Die *Raupe* ein Spannmeſſer mit 2 Paar Bauchfüſsen — verwandelt ſich in der Erde. (v. *Rottemb.*)

46. *Confuſa*, der *Tänzer.* *)

Berl. Magaz. III. p. 414. no. 94.

Schwarz-

*) Steht beym Hrn. v. *Rottemburg.*

Schwarzgrau, mit weiſslichen Flecken von verſchiedener Gröſse, und einem kleinen grauen halben Mond in weiſſem Felde.

47. *Matura*, die *Glanzmotte.*

Berlin. Magaz. III. p. 414. no. 96.

Braungrau, mit weiſſen und blaſsgelben Zeichnungen, die meiſtens braun gerändert ſind. Die *Unterflügel* blaſsgelb mit einem breiten braunen Rande.

Naturf. IX. p. 140. no. 96. Ph. *Matura.*

Am Innenrande der Oberflügel ein kleines *lateiniſches* v — wegen ſeines Glanzes und feinen Zeichnungen ein ſchönes Anſehen — in der Gröſse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 651. no. 27. Ph. *Matura*, die *Glanzmotte.*

48. *Curſoria*, der *Rothbart.*

Berl. Magaz. III. p. 416. no. 97.

Gelblichgrau, mit 2 braunen ausgeſchweiften und ausgezackten, und 2 grauen geſchlängelten Queerſtreifen.

Naturf. IX. p. 140. no. 97. Ph. *Curſoria.*

In der Gröſse der Ph. *Trifolii.* (v. *Rottemb.*)

49. *Cinerea*, die *Aſchmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 416. no. 98.

Ganz aſchgrau, mit einigen unmerklichen weiſslichen und einem gelbbraunen Flecken.

Naturf. IX. p. 141. no. 98. Ph. *Cinerea.*

Etwas kleiner als Ph. *Trifolii.* (v. *Rottemb.*)

50. *Ipſilon*, der *Zweyzack.*

Berlin. Magaz. III. p. 416. no. 99.

 Hell-

Hellbraun, mit einem nierenförmigen Fleck, und einem dunkelbraunen lateinischen *Ipsilon*, oder zweyzackichter Gabel auf jedem Oberflügel.

Naturf. IX. p. 141. no. 99. Ph. *Ipsilon.*

— Gehört unter die *Bombyces* — die Fühlhörner des *Männchens* nicht ganz haarig, sondern an der Spitze glatt. In der Grösse der Ph. *Atriplicis.* (v. *Rottemb.*)

51. *Socia*, der *gestreifte Mönch.*

Berlin. Magaz. III. p. 418. no. 101.

Gelblich, weissgrau, mit einigen braunen Streifen und Punkten.

Naturf. IX. p. 142. no. 101. Ph. *Socia.*

In der Grösse der Ph. *Verbasci.*

Raupe lebt auf den *Linden:* grün mit einigen weissen Linien und Punkten. Gehört nicht unter die *Mönche.* (v. *Rottemb.*)

52. *Nebulosa*, die *Nebelmotte.*

Berl. Magaz. III. p. 418. no. 103.

Weissgrau, mit braungerändeten Flecken, darunter ein nierenförmiger; oder braungrau mit weissgrauen Flecken.

Naturf. IX. p. 143. no. 103. Ph. *Nebulosa.*

In der Grösse der Ph. *Pronuba.* (v. *Rottemb.*)

53. *Variegata*, die *Scheckeule.*

Schriften der Dronth. Gesellsch. IV. p. 183. no. 40. t. 15. f. 16.

Phalaena (*Variegata*), spirilinguis cristata, alis deflexis, canis lineolis undulatis transversalibus confluentibus.

Auf *Fichtenstöcken.*

54. *Ani-*

54. *Anifurca*, die *Schwanzgabel.*

Röſels Inſektenbel. I. V. N. 2 Kl. p. 241. t. 42. die glatte ſchwarz und gelbgefleckte *Salatraupe.*

Cinerea, criſtata, alis deflexis cinereis nigro-venoſis; *poſticis* fuſceſcentibus, albo-marginatis; *ano furcato.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 160. p. 76. no. 215. die glatte ſchwarz und gelbgefleckte *Salatraupe.*

55. *Lunulata*, die *Mondeule.* *)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 249. t. 44. die ſchwarze *Raupe* mit gelbrothen Haaren und Knöpfen auf der *Schwarzbeerſtaude.*

Maders (Kleem.) Raupenkalend. p. 59. no. 161. die ſchwarze *Raupe* etc. et no. 216.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 104. no. 1430.

Phalaena *Lunulata*, ſpirilinguis, criſtata; alis murinis; *ſuperioribus* ſtrigis transverſis dentatis *circulo lunulaque nigris.*

Schaeff. Icon. t. 28. f. 7. 8.

56. *Lunulata minor*, die *kleine Mondeule.* **)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 252. t. 45. die ſchwarze mit weiſſen *kleeblätterförmigen Flecken* gezierte haarige *Raupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 59. no. 162.

Wien.

*) S. No. 23.

**) Die Raupe iſt ganz von der vorigen verſchieden. Der Vogel kleiner Alle Flügel mauſefahl; die obern mit wellenförmigen ſchwärzlichen Linien, einem kleinen grauen ſchwarz eingefaſsten Zirkel, und zwey ſehr kleinen ſchwarzen *Möndchen.*

Wien. Schmetterl. p. 67. Anm. B. zu den Scheinſpinnerraupen; *düſtere Eulen.*

Albin Inſ. t. 88. fig. f.

57. *Aurantio-maculata*, die *orangegelbgefleckte Eule.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 281. t. 54. die punktirte blaulichgrüne *Raupe*, mit dem blaſsgelben Seitenſtreif.

Criſtata, alis deflexis cinereis; *anticis* nigro-punctatis, *aurantiaco-maculatis.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 33. no. 82.

58. *Undulata*, die *Wellenlinie.**)

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 2 Kl. p. 283. t. 55. die ſchlanke, glatte, grasgrüne *Raupe* mit dem gelben Seitenſtreif.

Criſtata, alis deflexis, *anticis* cinereis *nigro-aurantiacoque* ſtriatis; *poſticis* luteſcentibus, margine nigro undulato.

Maders (Kleem.) Raupenkalend. p. 33. no. 83.

59. *Purpuraſcens*, der *Purpurfleck.* **)

Röſels Inſektenbel. IV. p. 145. t. 21.

Die hellbraune, glatte Grasraupe mit dunkelbraunen geſchuppten Queerflecken, und hellen unterbrochenen Streifen.

Criſtata, alis purpuraſcentibus nigro-lineatis; anticarum media macula oblonga rubra; poſticis luteſcentibus; *abdomine* aurantiaco-barbato.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 45. no. 123.

60. *Cin-*

*) Der vorigen ſehr ähnlich, etwas gröſser und mehr geſcheckt.

**) Eine der ſchönſten Eulen mit ſehr ſanften Farben.

60. *Cinnamomea*, die *zimmetfarbige Ilmeneule.*

Kleemanns Beytr. I. p. 157. t. 18. f. 1-6.

Die ſchöne gelblichgrüne, mit einem ſchmalen hellgelben Rücken - und Seitenſtreif auch verſchiedenen weiſslichen Strich - und Pünktlein gezierte *Raupe.*

Alis incumbentibus; *anticis* fuſco - *poſticis* hilare cinnamomeis.

Wiener Schmetterl. p. 71. Anm. G. zu den *Wellenſtrichraupen. Glänzende Eulen.*

1) Mit kupferbraunen Flügeln.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 67. no. 190.

61. *Atropos minor*, der *kleine Todtenkopf.*

Kleem. Beytr. I. p. 185. t. 22.

Die blaulichgrüne, mit einer gelben Halsborte gezierte *Raupe.* Der *Nachtvogel* mit einem *Todtenkopf.*

— Auf dem *Gartenſalat* (Lactuca hort.). Alis complanis; *anticis* olivaceis, nigro - variegatis, circulo griſeo; *poſticis* luteſcentibus; in thorace *caput mortuum.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 97. no. 278. der *kleine Todtenkopf.*

62. *Deaurata*, die *Goldeule.*

Kleem. Beytr. I. p. 237. t. 29. f. 1-10.

Die *Raupe* in *Röſels* III B. p. 401. t. 68. f. 8.

Die glänzende glatte braune Raupe mit hellem Kopfe, und fünf ebenfalls hellen bandförmigen Streifen.

Criſtata, alis incumbentibus; *anticis* furvis, *figuris lineisque* irregularibus aureo - flavis; *poſticis* flavo - nigricantibus.

63. *Glau-*

63. *Glaucescens*, der *Blaufleck.*

Kleem. Beytr. I. p. 338. t. 40.

Die halbſpannende, grasgrüne gelbgeſtreifte *Raupe* mit ungleichen Bauchfüſsen.

Alis incumbentibus anguſtis, flavo-fuſco-nigroque maculatis: *anticis* macula transverſa glauceſcente.

(Conf. *Degeer* Tom. I. Mém. 12. p. 377. t. 21. f. 10. 11. 12. eben dergleichen *Raupe.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 137.

64. *Hiſtrio*, der *Harlekin.*

Kleem. Beytr. I. p. 353. t. 42.

Die glatte, gelblich, zimmetbraune, und mit dunklen Rückenſtreifen und einer gelben Seitenborte gezierte, aber anfänglich grüne Raupe.

Alis anticis diverſimode coloratis; *anticis* binis maculis maioribus ferrugineis; *poſticis* pallide flavis.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 69. no. 196. p. 85. no. 247. p. 93. no. 269.

65. *Bi-ren*, der *doppelte Nierenfleck.*

Kleem. Beytr. I. p. 361. t. 43.

Die glatte, gelblichgrüne, und mit braunrothen Rückenzeichnungen gezierte *Raupe.*

Alis *anticis* murinis, lineis undulatis, binisque maculis pallide griſeis reniformibus; *poſticis* luteſcentibus.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 86. no. 248. p. 93. no. 270.

66. *An-*

66. *Anceps*, die *zweydeutige Eule.* *)

Kleem. Beytr. I. p. 115. t. 13. f. A B.

Die ungemein ſchön gezeichnete grün- und weiſsgeſtreifte *Eichenraupe* mit gelben und rothen Seitenſtrichen.

Alis umbroſis cineraſcentibus, lineis transverſis undulatis griſeis; in thorace figura M.

Die *ſchöne Raupe* in *Röſels* III B. p. 272. t. 48. f. 3.

67. *Triceſima*, der *Dreyſsiger.*

Naturf. III. p. 2. t. 1. f. 1. (D. *Kühn.*)

Alis *anticis* fuſco-rubris, numero 30 notatis; *poſticis* fuſco-luteſcentibus.

68. *Viridana*, die *braungrüne Ohreule.*

Naturf. XIII. p. 28. t. 3. f. 5. a. f. 5. b.

Phalaena N. antrorſum alis *ſuperioribus* e fuſco ſubvireſcens, annulis, maculis et lineis flexis albis, margine albo, punctis nigris maculato; alis *inferioribus* ex albo ſubcoeruleis, retrorſum alis omnibus coeruleſcentibus. (*Walch.*)

69. *Hermelina*, der *gelbe Hermelinvogel.*

Naturf. XIV. p. 65. t. 3. f. A. der *gelbe Hermelinvogel.* (D. *Kühn.*)

Alis

*) Dieſer Phaläne gebe ich den Namen *Anceps*, weil ſie von den Bombycibus und Noctuis, von beyden etwas hat: von den erſtern den dicken Hinterleib; von den letztern die Fühlhörner, und den Habitus der Flügel. Nach der ſchönen glatten *Raupe* zu urtheilen, könnte man ihr unter den Eulen kaum die Stelle verſagen.

Alis pallide sulphureis; *anticis* multis lineis transversis nigris undulatis, binisque strigis atris dentatis; *posticis* basi fuscis.

70. *Agathina*, das *Achatvöglein.*

Sulzers Gesch. p. 160. t. 22. f. 4.

Dunkelgrau mit abwechselnden braunrothen und grauen Feldern, und grauem Saum oben; unten bräunlichgrau mit wellenförmigen kaum deutlichen Queerlinien.

Cramer Pap. exot. III. p. 145. t. 273. Fig. E. *Foem.* p. 171. t. 288. Fig. A. *Mas.*

71. *Tricolora*, die *amerikanische dreyfarbige Eule.*

Sulzers Gesch. p. 160. t. 22. f. 5.

Die *Vorderflügel* dunkelbraun, unten schwarzbraun, mit einem strohgelben Fleck in der Mitte, und einem kleinern von dem Federstaub entblößten näher gegen dem Ende; die Hinterflügel braunschwarz, fast gezähnt, mit drey rothen und einem gelben durchgehenden Fleck.

Cramer Pap. exot. Vol. III. p. 125. t. 263. Fig. E. Ph. *Tricolora.*

72. *Bicolora*, die *indianische zweyfarbige Eule.*

Sulzers Gesch. p. 161. t. 22. f. 6.

Blauschwarzspielend, in den Vorderflügeln zwey Queerbänder von weissen Flecken, gegen den Leib blaue Streifen, mehrere auf den Hinterflügeln bläulich weiss, davon die gegen den Leib ganz, die andern in der Mitte getheilt sind. Die Fühlhörner und das Bruststück schwarz und weiss punktirt, der Hinterleib oben grün und blau spielend, unten weiss.

Cra-

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 74. t. 143. Fig. A. Ph. *Bicolora.*

73. *Vlmi*, die *Rüſtereule.*
Wien. Schmetterl. p. 66. A. no. 1.

74. *Tridens*, die *Aprikoſeneule*
Wien. Schmetterl. p. 67. B. 1) mit einem Auswuchſe auf dem Rücken.
Réaum. La Chenille *demi-velue* de l'Abricotier.

75. *Euphorbiae*, die *Wolfsmilcheule.*
Wien. Schmetterl. p. 67. B. 2) die Haare auf Knöpfgen. no. 4.

76. *Megacephala*, die *Weideneule.*
Wien. Schmetterl. p. 67. B. no. 5.

77. *Auricoma*, die *Bocksbeereule.*
Wiener Schmetterl. p. 67. B. no. 6.

78. *Vnita*, die *Tanneneule.*
Wien. Schmetterl. p. 68. C. no. 2.
Geoffr. Inſ. II. p. 192. no. 24.
Tinea alis corpori circumvolutis croceis, oculis pedibusque nigris.
Le *Manteau jaune.*
Long. 7. lign.

79. *Eborina*, die *weiſſe gelbgerändete Eule.*
Wiener Schmetterl. p. 68. D. no. 5. *Unbekannte Raupe.*

80. *Roſcida*, die *gelbe ſchwarzpunktirte Eule.*
Wien. Schmetterl. p. 68. D. no. 7. *Unbekannte Raupe.*

81. *Marginea*, die *schwarzgrüne gelbgesäumte Eule.* *Wiener Schmetterl.* p. 69. D. no. 13. *Unbekannte Raupe.*

82. *Palliola*, die *Birneule.* *Wien. Schmetterl.* p. 69. E. no. 1.

83. *Strigula*, die *Eicheneule.* *Wien. Schmetterl.* p. 69. E. no. 2.

84. *Albula*, die *Bachmünzeneule.* *Wien. Schmetterl.* p. 69. E. no. 3.

85. *Ligustri*, die *Hartriegeleule.* *Wiener Schmetterl.* p. 70. E. no. 1.

86. *Glandifera*, die *blaßscheckichte Eule.* *Wien. Schmett.* p. 70. E. no. 2. *Unbekannte Raupe.*

87. *Perla*, die *perlenfarbene Eule.* *Wien. Schmett.* p. 70. E. no. 3. *Unbekannte Raupe.*

88. *Degener*, die *Aepfeleule.* *Wien. Schmett.* p. 70. E. no. 4.

89. *Runica*, die *Kahneicheneule.* *Wien. Schmett.* p. 70. F. no. 1.

1) Raupe ohne Spitzen auf dem Hinterleibe.

90. *Culta*, die *Holzbirneule.* *Wien. Schmett.* p. 70. F. no. 4.

2) *Raupen* mit Spitzen auf dem Hinterleibe.

91. *Comta*, die *schwarzgraue weißmakelichte Eule.* *Wien. Schmett.* p. 70. F. no. 5. *Unbekannte Raupe.*

92. *Conspersa*, die *schwarz- und weißspreckichte weißgefleckte Eule.* *Wien. Schmett.* p. 71. F. no. 6. *Unbekannte Raupe.*

93. *Cal-*

93. *Calvaria*, die *ſchwarzbraune gelbgefleckte Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. F. no. 9. *Unbek. Raupe.*
3) *Raupen* mit einer ſtumpfen Erhöhung.

94. *Lucipeta*, die *gelbgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. G. No. 2. *Unbek. Raupe.*
2) Mit trübgrauen Flügeln.

95. *Birivia*, die *weißgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. G. no. 3. *Unbek. Raupe.*

96. *Pyrophila*, die *dunkelgraugezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 71. G. no. 4. *Unbek. Raupe.*

97. *Candeliſequa*, die *ſchwarzgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 72. G. no. 5. *Unbek. Raupe.*

98. *Cubicularis*, die *Lämmerlatticheule.*
Wien. Schmett. p. 72. G. no. 6.

99. *Flavicincta*, die *Kirſcheneule.*
Wien. Schmett. p. 72. H. no. 2.

100. *Dyſodea*, die *Wildlatticheule.*
Wien. Schmett. p. 72. H. no. 5.

101. *Chamomillae*, die *Kamilleneule.*
Wien. Schmett. p. 73. I. no. 3.

102. *Tanaceti*, die *Rheinfarneule.*
Wien. Schmett. p. 73. I. no. 5.
2) Raupe weiſs mit ſchwarz und gelb.

103. *Linariae*, die *Leinkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 73. I. no. 6. *Leinkrauteulenraupe*
(Antirrhini Linariae).
Réaum. Inſ. Tom. I. p. 536. (ed. 4.) t. 37. f. 4. 5. 6. 7.

La *Chenille de la Linaire.*

Réaum. Inſ. p. 591. f. 4. La *Sang - ſue.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 430. no. 5. t. 8. f. 5. 6.

Phalene de la Linaire.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet doublement huppé; à ailes rabatues d'un blanc gris - de - perle à nuances et rayes noirâtres, avec des taches noires le long du bord poſtérieur.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 314. no. 5. t. 8. f. 5. 6.

Leinkrautphaläne.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, doppeltem Rückenkamm, und niederhangenden weiſsperlgrauen Flügeln, mit ſchwärzlichen Schattirungen und Streifen, und ſchwarzen Flecken längſt dem Hinterrande.

104. *Lactucae*, die *Latticheule.*
Wien. Schmett. p. 74. I. no. 7.

105. *Lithoxylaea*, die *Winterbirneule.*
Wien. Schmett. p. 75. K. no. 2.

106. *Petrificata*, die *Steineicheneule.*
Wien. Schmett. p. 75. K. no. 3.

107. *Rizolitha*, die *Weißeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 75. K. no. 6.

108. *Conformis*, die *Ellerbaumeule.*
Wien. Schmett. p. 76. K. no. 7.

109. *Pulla*, die *Schwarzeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 76. K. no. 8.

110. *Hyperici*, die *Johanniskrauteule.*
Wien. Schmett. p. 76. K. no. 10.

111. *Inſtabilis*, die *Mandelneule.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 76. L. no. 1.
1) Die *Raupen* grün.

112. *Stabilis*, die *Lindeneule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 2.

113. *Humilis*, die *Löwenzahneule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 3.

114. *Gracilis*, die *Weidericheule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 4.

115. *Lychnidis*, die *Wiederfloßeule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 5.

116. *Munda*, die *Gartenbirneule.*
Wien. Schmett. p. 76. L. no. 7.
2) *Raupen* bräunlich.

117. *Blanda*, die *fahle weißlichgezeichnete Eule.*
Wien. Schmetterl. p. 77. L. no. 8. *Unbek. Raupe.*

118. *Cruda*, die *Eichbuscheule.*
Wien. Schmett. p. 77. L. no. 9.

119. *Ambigua*, die *röthliche hellgraugezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 77. L. no. 10. *Unbek. Raupe.*

120. *Advena*, die *Mayeneule.*
Wien. Schmett. p. 77. L. no. 11.
3) *Raupen* lichtgrau.

121. *Pistacina*, die *Flockenkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 1.
1) Mit schwärzlichen Punkten am Aussenrande.

122. *Baja*, die *Tollkrauteule.* (Atropae Belladonnae.)
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 3.

123. *Rubricosa*, die *Grindwurzeule.*
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 4.

124. *Erythrocephala*, die *Spitzwegericheule.*
Wien. Schmett. p. 77. M. no. 5.

125. *Sigma*, die *Gartenmeldeeule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 8.

2) Mit ſchwarzen Fleckchen im Mittelraume.

126. *Nun atrum*, die *Klebekrauteule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 9.

127. *I cinctum*, die *röthlichgraue bogenſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 10. *Unbek. Raupe.*

128. *Characterea*, die *Waldkicherneule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 11.

129. *Baſilinea*, die *fahle geradſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 12.

130. *Ypſilon*, die *Sarbaumeule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 13.

131. *Forcipula*, die *weiſsgraue kreuzſtriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 14. *Unbek. Raupe.*

132. *Rectangula*, die *Siebengezeiteule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 15.

133. *Polygona*, die *Breitwegericheule.*
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 16.

134. *Secalis*, die *Rockenhalmeule.* *)
Wien. Schmett. p. 78. M. no. 17. (Secalis cerealis *intra culmos habitans.*)
Linn. Syſt. Nat. ed. 10. p. 519. (ed. Hal.) no. 126. Ph. *Secalis.*

Spiri-

*) *Müllers* Secalis F. Fr. p. 46. no. 410. ſcheint denn doch von dieſer noch verſchieden zu ſeyn.

Spirilinguis cristata, alis deflexis, *superioribus* griseo-fuscis striatis; macula reniformi *A latino.*

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. XIV. p. 67. die Raupe in den *weissen Aehren* (*Rolander*).

Phalaena seticornis, spirilinguis, fasciculata; alis depressis griseo-fuscis, striatis, *A latino* inscriptis.

135. *Subsequa*, die *Vogelkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 79. M. no. 21.

136. *Linogrisea*, die *veilgraulichte braungerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 79. M. no. 22. *Unbek. Raupe.*

137. *Flammatra*, die *graubraune flammenstriemigte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 1. *Unbek. Raupe.*

1) Mit schwarzem Halskragen.

138. *Cinerea*, die *aschengraue feingestreifte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 3. *Unbek. Eule.*

139. *Suffusa*, die *Gänsedisteleule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 4.

140. *Obelisca*, die *rehfarbige blaßgerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 5. *Unbek. Raupe.*

2) Mit hellen oder deutlichen Ring- oder Nierenmakeln.

141. *Aquilina*, die *adlerbraune schwarzgezähnte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 6. *Unbek. Raupe.*

142. *Ravida*, die *wolfsfarbige wellenstrichige Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 7. *Unbek. Raupe.*

143. *Signifera*, die *Türkenkreſſeneule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 8.

144. *Valligera*, die *hornfarbige kleinmakelichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 80. N. no. 9. *Unbek. Raupe.*

145. *Teſtacea*, die *ſandfarbige kleinmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 11. *Unbek. Raupe.*

146. *Segetum*, die *Winterſaateule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 12. *Winterſaateulenraupe* (Secalis cerealis gramine et radice). tab. 1. a. f. 3. *Raupe.* tab. 1. b. f. 3. *Vogel.*

147. *Corticea*, die *rindenfarbene kleingeſtrichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 13. *Unbek. Raupe.*

148. *Coecimacula*, die *Sichelkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 14.

149. *Radicea*, die *Graswurzeneule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 15.

150. *Lutulenta*, die *braunſchwarze blaßgeſtrichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 16.

3) Mit verfinſterten Makeln.

151. *Sordida*, die *erdfarbene mattgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 17. *Unbek. Raupe.*

152. *Fumoſa*, die *rauchfarbene weißgezähnte Eule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 18. *Unbek. Raupe.*

153. *Furva*, die *Kletteneule.*
Wien. Schmett. p. 81. N. no. 19.

4) Mit zweydeutiger Zeichnung.

154. *Anceps*, die *honigbraune weißadrigte Eule.*

Wie-

Wiener Schmetterl. p. 81. N. no. 22. *Unbekannte Raupe.*

155. *Cespitis*, die *Wasengraseule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 2.
1) Die Oberflügel schwärzlich mit gelber Zackenlinie.

156. *Leucophaea*, die *Tausendblatteule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 5.
2) Graulich mit weissen Linien.

157. *Chenopodii*, die *Gänsefußeule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 6.

158. *Contigua*, die *Gutheinricheule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 7.

159. *Dentina*, die *bräunlichgraue zahnmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 8. *Unbek. Raupe.*

160. *Caesia*, die *blaulichtgraue düsternfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 9. *Unbek. Raupe.*

161. *Prasina*, die *Meerrettigeule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 10.
3) Grüngemischt.

162. *Thalassina*, die *Flechteneule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 13.

163. *Brunnea*, die *Stockerbseneule.*
Wien. Schmett. p. 82. O. no. 15.
4) Rothbraun.

164. *Porphyrea*, die *purpurbraune dunkelspreckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 17.

165. *Suasa*, die *Steinkleeeule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 18.

166. *Xanthographa*, die *kastanienbraune gelbgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 20. *Unbek. Raupe.*

167. *Leucographa*, die *veilbraune weißlich gezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. O. no. 19. *Unbek. Raupe.*

168. *Satura*, die *purpurschwärzliche Eule.*
Wien. Schmett. p. 83. P. no. 2. *Unbek. Raupe.*

169. *Serena*, die *perlweisse hellbraunstreifige Eule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 4. *Unbek. Raupe.*

170. *Cucubali*, die *Gliedereicheule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 5.

171. *Capsincola*, die *Lychnissaameneule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 6.

172. *Protea*, die *Zerreicheneule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 7.

173. *Convergens*, die *Zwergeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. no. 8.

174. *Filicea*, die *Farrenkrauteule.*
Wien. Schmett. p. 84. P. Anm. auf der Pteris aquilina.
Albin. Inf. t. 75. fig. e f g h.

175. *Acetosellae*, die *Schafampfereule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 1.
1) Mit zwo düstern am Innenrande zusammengeneigten Queerlinien.

176. Co-

176. *Conigera*, die *rothgelbe weißgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 3. *Unbek. Raupe.*

177. *Albipuncta*, die *Wegericheule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 4.

178. *Trilinea*, die *weißliche dreygestreifte Eule.*
Wien. Schmett. p. 84. Q. no. 5. *Unbek. Raupe.*

179. *Aenea*, die *erzfarbige gemeinstreifige Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 6. *Unbek. Raupe.*

180. *Communimacula*, die *leibfarbene braunmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 7. *Unbek. Raupe.*
2) Ohne Queerstriche.

181. *Pudorina*, die *weißliche rothgemengte Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 11. *Unbek. Raupe.*

182. *Nervosa*, die *lichtgraue geradstriemigte Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 12. *Unbek. Raupe.*

183. *Livida*, die *griechenblaue Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. Q. no. 13. *Unbek. Raupe.*

184. *Silene*, die *Feldkohleule.*
Wien. Schmett. p. 85. R. no. 1.

185. *Polita*, die *dunkelbraune glänzende Eule.*
Wien. Schmett. p. 85. R. no. 3. *Unbek. Raupe.*

186. *Nitida*, die *Ehrenpreiseule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 4.

187. *Spadicea*, die *Schafzungeneule.*
Wien. Schmett. p. 86. R, no. 6.

188. *Ferruginea*, die *okerbraune röthlichgestrichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 7. *Unbek. Raupe.*

189. *Rubiginea*, die *Holzäpfeleule.*
Wien. Schmett. p. 86. R. no. 8.

190. *Croceago*, die *Traubeneicheneule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 2.

191. *Rutilago*, die *Pappelweideneule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 3.

192. *Flavago*, die *Königskerzeneule.*
Wien. Schmetterl. p. 86. S. no. 4.

193. *Luteago*, die *oraniengelbe hellfleckige Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 5. *Unbek. Raupe.*

194. *Aurago*, die *goldgelbe hellstriemige Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 6. *Unbek. Raupe.*

195. *Sulphurago*, die *hellgelbe schwarzspreckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 86. S. no. 7. *Unbek. Raupe.*

196. *Cerago*, die *Palmweideneule.*
Wien. Schmett. p. 87. S. no. 8.

197. *Gilvago*, die *trübgelbe wellenstriemigte Eule.*
Wien. Schmett. p. 87. S. no. 9. *Unbek. Raupe.*

198. *Flammea*, die *blaßgoldfarbene rothgewässerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 3. *Unbek. Raupe.*
1) Die Oberflügel gelblicht.

199. *Ochroleuca*, die *gelbbräunliche weißgemischte Eule.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 87. T. no. 4. *Unbekannte Raupe.*

200. *Or*, die *Alberneule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 5.
2) Graulicht.

201. *Diluta*, die *graugewässerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 6. *Unbek. Raupe.*

202. *Ruficollis*, die *Wintereicheneule.*
Wien. Schmett. p. 87. T. no. 7.

203. *Purpurina*, die *purpurrothgewässerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 9. *Unbek. Raupe.*
3) Purpurfarben.

204. *Pyralina*, die *dunkelbraune blaulicht gewässerte Eule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 12. *Unbek. Raupe.*
4) Rothbraun.

205. *Miniosa*, die *Galleicheneule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 14.

206. *Strigosa*, die *grünlichbraune graugemischte Eule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 15. *Unbek. Raupe.*
5) Olivenbraun und wicklerförmig.

207. *Ambusta*, die *Wändeflechteneule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 16.

208. *Subtusa*, die *Zitterpappeleule.*
Wien. Schmett. p. 88. T. no. 17.

209. *Latruncula*, die *braune rothſchielende Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. *Grabraupen*, Larvae *Furtivae; kleine Eulen*, N. *Puſillae.* *)
1) Die Flügel ſchmal. No. 1. *Unbek. Raupe.*

210. *Praeduncula*, die *braune weiſsgerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 2. *Unb. Raupe.*

211. *Furuncula*, die *braune weiſsſtreiſige Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 3. *Unb. Raupe.*

212. *Raptricula*, die *braungraue ſchwarzſtrichichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 4. *Unb. Raupe.*

213. *Spoliatricula*, die *Nelkenveileule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 5. *Nelkenveileulenraupe* (Cheiranthi incani).

214. *Fuſcula*, die *braune weiſsgemiſchte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 6. *Unb. Raupe.*
2) Die Flügel ſpannerförmig.

215. *Atratula*, die *ſchwarze weiſswechſelnde Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 7. *Unb. Raupe.*

216. *Candidula*, die *weiſſe ſchwarzfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. V. no. 8. *Unb. Raupe.*

217. *Scutoſa*, die *Eberreiſseule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 1.
1) die Oberflügel oliv- oder buntfarbig.

218. *Peltigera*, die *blaſszimmetfarbene randfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 2. *Unb. Raupe.*

219. *Ono-*

*) Aus dieſer Familie hat *Linné* keine einzige.

219. *Ononis*, die *Hauhecheleule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 4.

220. *Alchymista*, die *schwarze braunlich gerändete Eule.*
Wien. Schmett. p. 89. W. no. 5. *Unb. Raupe.*
2) Schwarz, oder schwarzfleckicht. Et p. 150.
Geoffr. Inf. II. p. 149. no. 80. *)
Phalaena seticornis, spirilinguis, alis deflexis, undulato-nigris, inferioribus basi albis.
L'*Alchymiste.*
Long. 10. lign.

221. *Luctuosa*, die *Wegebreiteule.*
Wien. Schmett. p. 90. W. no. 7.

222. *Solaris*, die *weisse schwarzgemischte Eule.*
Wien. Schmett. p. 90. W. no. 8. *Unb. Raupe.*

223. *Rupicola*, die *schwarze weisslich gezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. p. 90. W. no. 9. *Unb. Raupe.*

224. *Promissa*, die *Wolleicheneule.*
Wien. Schmett. p. 90. X. no. 6.
2) Mit rothen Unterflügeln.

225. *Hymenaea*, die *Schwarzdorneule.*
Wien. Schmett. p. 91. X. no. 8.
3) Mit gelben Unterflügeln, fast ungezähnt.

226. *Asclepiadis*, die *Schwalbenwurzeule.*
Wien. Schmett. p. 91. Y. no. 2.

227. *Cuprea*, die *kupferfarbene dunkelfleckichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 91. Y. no. 3.

228. *Lu-*

*) S. die Anmerk. bey *Leucomelas* L. no. 183. bey der der Ritter diese *Geoffroysche* Phaläne zitirt hatte.

228. *Lunaris*, die *Truffeicheneule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 1.
1) Mit einer ſchwärzlichen unvollkommenen *Mondmakel* auf den Oberflügeln.

229. *Craccae*, die *Vogelwickeneule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 3.

230. *Triquetra*, die *veilgraue dreyeckmaklichte Eule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 6. *Unb. Raupe.*
2) Mit braungelben düſterneblichten Unterflügeln.

231. *Heliaca*, die *kupferbraune mattſtreiſige Eule.*
Wien. Schmett. p. 94. A a. no. 7. *Unb. Raupe.*

232. *Aſteris*, die *Sternblumeule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 10. Fam. I.

233. *Lucifuga*, die *Schildampfereule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 11. Fam. I.

234. *Ditrapezium*, die *Wachtelweizeneule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 24. Fam. M.

235. *Terſa*, die *fahle gelbgezeichnete Eule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 312. no. 12. Fam. L. *Unbekannte Raupe.*

236. *Perplexa*, die *mattbraune düſter- und weiſsgeſtrichte Eule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 313. Fam. N. no. 23. *Unbek. Raupe.*

237. *Herbida*, die *Kuhweizeneule.*
Wien. Schmett. Nachtr. p. 313. Fam. O. no. 22.

238. *Chrysographa*, die *oranienbraune goldgelb gezeichnete Eule.*

Wien. Schmetterl. Nachtr. p. 313. Fam. O. no. 23. *Unbek. Raupe.*

239. *Decora*, die *glänzendsilbergraue mattgezeichnete Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 313. Fam. Q. no. 15. *Unbekannte Raupe.*

240. *Glabra*, die *blaßhonigbraune düsterstriemigte Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. R. no. 10. *Unbekannte Raupe.*

241. *Respersa*, die *silberfarbige, düstergewässerte und punktirte Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. T. no. 19. *Unbekannte Raupe.*

242. *Festiva*, die *dunkelrothe und perlfarbene Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. T. no. 20. *Unbekannte Raupe.*

243. *Bractea*, die *purpurbraune und goldmacklichte Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. Z. no. 7. *Unbekannte Raupe.*

Knochs Beytr. zur Insektengeschichte I St. p. 7. t. 1. f. 2. Ph. N. *C aureum.*

Spirilinguis cristata, alis deflexis: superioribus rubescentibus fusco-variis, maculis septem aureis; C aureo inscriptis.

244. *Aemula*, die *fleischfarbene blaßgoldgezeichnete Eule.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 314. Fam. Z. no. 8. *Unbekannte Raupe.*

245. *Ochreacea*, der *Ochravogel.*

Gladbachs Schmett. p. 24. t. 11. f. 5. 6. *Raupe* unbekannt — des Abends auf den *Specklilien.*

Alis ciliatis; *anticis* ochreaceis, binis punctis fuſcis; *poſticis* griſeo-albis—omnibus nigro-lituratis.

246. *Terrena*, die *ſchwarze Erdeule.*

Gladbachs Schmetterl. p. 39. t. 18. f. 3. 4. *der ſchwarze Erdvogel. Unbek. Raupe.*

Alis *ciliatis; anticis* fuſco-nigris, binis maculis pallidioribus; *poſticis* albo-griſeis, margine rufeſcente.

247. *Variegata*, die *Scheckeule.*

Gladbachs Schmett. p. 39. t. 18. f. 5. 6. der *rare Scheckflügel. Unbek. Raupe.*

Alis *anticis* viridi-micantibus, baſi, faſciisque transverſis ferrugineis; *poſticis* nigris, *Ypſilon* griſeo, nigro-venoſo, notatis.

Schaeff. Icon. t. 173. f. 2. 3.

248. *Criſtata*, die *duppirte Eule.*

Gladbachs Schmett. p. 41. t. 19. f. 1. 2. 3. das *Duppe. Unbek. Raupe.*

Alis *anticis* glauco-ſulphureis; *poſticis* griſeo-rubeſcentibus; *thorace* criſtato ſtriato.

249. *Ypſilon album*, die *Eule mit dem weiſſen Ypſilon.*

Gladbachs Schmett. p. 43. t. 19. f. 6. 7. das *gelbe Ypsilon. Unbek. Raupe.*

Alis concoloribus flavescentibus, *Ypsilon albo.*

250. *Striata*, die *Stricheule.*

Gladbachs Schmett. p. 53. t. 24. f. 1. 2. *der gelbe Muschenflügel. Unbek. Raupe.*

Alis concoloribus flavo-rubroque longitudinaliter striatis.

251. *Hermelina*, die *Hermelineule.*

Gladbachs Schmett. p. 57. t. 25. f. 1-6. der *rare kleine Hermelinvogel* mit der seltsamen *Katzenkopfraupe.*

Alis *anticis* albo-purpureoque variegatis, lineis transversis aurantiacis; margine cum posticis nigro-punctatis.

252. *Tormentaria*, die *Kanoneneule.*

Gladbachs Schmett. p. 63. t. 27. f. 7. 8. der *rare Kanonenvogel. Unb. Raupe.*

Alis concoloribus niveis; *anticis tormento* flavo.

253. *Octogenaria*, die *Achtziger Eule.*

Gladbachs Schmett. p. 66. t. 29. f. 1-5. der *Achtziger mit seiner Raupe, Gespinnst und Puppe.*

Alis *anticis* rubescentibus, numero 80 notatis.

254. *Aluco*, die *chinesische Aluko.*

Fabric. S. E. p. 591. no. 4. N. *Aluco.*

Alis *patulis*, dentatis, brunneis, nigro-undulatis, maculisque tribus marginalibus fuscis.

255. *Caprimulgus*, der *chinesische Kaprimulgus.*
Fabric. S. E. p. 591. no. 5. N. *Caprimulgus.*
Alis *patulis*, dentatis, fuscis, nigro-undulatis; anticis ocello coerulescente.

256. *Ulula*, das *indianische Nachteulchen.*
Fabric. S. E. p. 592. no. 6. N. *Ulula.*
Alis *patulis*, dentatis, nigro-undulatis; *anticis* fascia abbreviata alba maculaque subocellari.

257. *Spiralis*, die *chinesische Spirale.*
Fabric. S. E. p. 592. no. 7. N. *Spiralis.*
Alis *patulis*, griseo-fuscoque undatis; anticis *linea spirali convoluta* nigra.

258. *Illibata*, der *indianische Randfleck.*
Fabric. S. E. p. 592. no. 8. N. *Illibata.*
Alis *patulis* fuscis; macula apicis nigra.

259. *Scrobiculata*, die *ostindianische Höckereule.*
Fabric. S. E. p. 592. no. 9. N. *Scrobiculata.*
Laevis, alis *incumbentibus*, subdentatis, griseis, *scrobiculo* baseos nigro; *posticis* vitta marginali atra.

260. *Hybrida*, die *indianische Schneelinie.*
Fabric. S. E. p. 593. no. 11. N. *Hybrida.*
Laevis, alis *incumbentibus; anticis* flavis; *linea nivea*, limbo pallidiore, fusco-maculato.

261. *Microrrhoea*, der *neuholländische Blutafter.*
Fabric. S. E. p. 593. no. 12. N. *Microrrhoea.*
Laevis, alis *incumbentibus*, cinereis; *posticis* rufescentibus; macula atra. — *Abdomen* supra subsanguineum.

262. *Serva*, die *neuholländische Magd.*

Fabric. S. E. p. 593. no. 13. N. *Serva.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, punctis strigisque quatuor undatis, fuscis; posticis apice nigris.

263. *Astrea*, die *neuholländische Astrea.* *)

Fabric. S. E. p. 594. no. 14. N. *Astrea.*

Laevis, alis incumbentibus, concoloribus, fuscis, disco hyalino; thorace niveo, nigro-punctato.

264. *Quercus*, die *Eicheneule.*

Fabric. S. E. p. 594. no. 15. N. *Quercus.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, strigis tribus fuscis.

265. *4-punctata*, die *englische vierpunktirte Eule.*

Fabric. S. E. p. 594. no. 16. N. *4-punctata.*

Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, fusco-undatis; *punctis quatuor* marginis exterioris nigris.

266. *Ficus*, die *ostindianische Feigeneule.*

Fabric. S. E. p. 595. no. 22. N. *Ficus.*

Laevis, alis *deflexis*, cinereis, basi fulvo-albo-nigroque maculatis; *antennis pectinatis* **), *apice setaceis.*

In *Ficu racemosa* Ind. orient.

267. *Caricae*, der *ostindianische Fünfpunkt.*

P 3 *Fabric.*

*) Diess ist der Sphinx *Astreus* des *Drury.* S. 3 Th. 2 B. p. 218. no. 49.

**) Vielleicht ein *Mittelding* zwischen Bombyx und Noctua.

Fabric. S. E. p. 596. no. 23. N. *Caricae.*

Laevis, alis *deflexis*, cinereis, ſtriis punctoque medio albis; *punctis quinque atris.*

268. *Coronata*, die *chineſiſche Kroneneule.*

Fabric. S. E. p. 596. no. 24. N. *Coronata.*

Laevis, alis *deflexis*, fuſcis, ſtrigis tribus obſcurioribus ſtigmateque poſtico nigro-punctato.

269. *Leonina*, der *indianiſche Schwarzgürtel.*

Fabric. S. E. p. 596. no. 25. N. *Leonina.*

Laevis, alis *deflexis*, brunneis, ſtigmatibus griſeis, poſticis flavis; maculis duabus nigris; *abdomine cingulis nigris.*

270. *Dama*, die *neuholländiſche Dama.*

Fabric. S. E. p. 596. no. 26. N. *Dama.*

Laevis, alis *deflexis*, fuſcis, albo-ſtriatis; *poſticis* albis, margine nigro.

271. *Marginata*, der *amerikaniſche Weiſsrand.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 27. N. *Marginata.*

Laevis, alis *deflexis* variegatis; *poſticis* atris, *margine albo.*

272. *Sagitta*, die *indianiſche Pfeileule.*

Fabric. S. E. p. 597. no. 30. N. *Sagitta.*

Laevis, alis *deflexis*, griſeis: macula magna marginali flava; *poſticis* flavis, apice fuſcis.

273. *Vulpina*, die *oſtindianiſche Vulpina.*

Fabric. S. E. p. 598. no. 34. N. *Vulpina.*

Laevis, alis *deflexis; anticis* obſcure cinereis, immaculatis; *poſticis* apice nigris, albo-maculatis.

274. *De-*

274. *Destituta*, der *chinesische Rauchschenkel.*

Fabric. S. E. p. 598. no. 35. N. *Destituta.*
Laevis, alis *incumbentibus*, griseis, fusco-maculatis; striga alba fuscae innata, submarginali.

275. *Tigrina*, der *ostindianische Tiger.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 36. N. *Tigrina.*
Laevis, alis *deflexis; anticis* variegatis; *posticis* nigris; fascia maculisque tribus marginalibus albis.

276. *Geometrica*, der *ostindianische Schwarzmakel.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 37. N. *Geometrica.*
Laevis, alis *deflexis;* macula magna atra, fasciis duabus, anteriore nivea.

277. *Stolida*, die *ostindianische Schneebinde.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 38. N. *Stolida.*
Laevis, alis *deflexis* fuscis; *fasciis duabus niveis*, posteriore unidentata.

278. *Inclyta*, die *brasilianische Blaubinde.*

Fabric. S. E. p. 599. no. 40. N. *Inclyta.*
Laevis, alis *deflexis* fuscis; *strigis tribus coerulescentibus*, brunneae adnatis.

279. *Vndata*, die *ostindianische Wellenbinde.*

Fabric. S. E. p. 600. no. 43. N. *Vndata.*
Laevis, alis *deflexis* griseis, *strigis undatis* fuscis; posticis cinereis, fascia marginali nigra.

280. *Vittata*, die *ostindianische Randbinde.*

Fabric. S. E. p. 600. no. 44. N. *Vittata.*

Laevis, alis *deflexis* dentatis cinereis; ſtrigis fuſcis, poſticis flaveſcentibus; *vitta marginali atra.*

281. *Frugalis*, die *indianiſche Punktſtreife.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 45. N. *Frugalis.*
Laevis, alis *deflexis* cinereis: faſcia obliqua *ſtrigaque punctorum nigrorum.*

282. *Flava*, der *oſtindianiſche Gelbflügel.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 46. N. *Flava.*
Laevis, alis *deflexis flavis;* ſtrigis undatis ferrugineis.

283. *Stigmatizans*, der *indianiſche Weiſspunkt.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 47. N. *Stigmatizans.*
Laevis, alis *deflexis* angulatis, flavis; ſtrigis obſcurioribus, *ſtigmateque niveo.*

284. *Equeſtris*, das *indianiſche Ritterband.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 48. N. *Equeſtris.*
Laevis, alis *deflexis* fuſcis; *faſcia lata viridi.*

285. *Rejecta*, der *indianiſche Grünfleck.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 49. N. *Rejecta.*
Laevis, alis *deflexis* albis; *macula poſtica vireſcente.*

286. *Litura*, der *oſtindianiſche Grauſtrich.*

Fabric. S. E. p. 601. no. 50. N. *Litura.*
Laevis, alis *deflexis; anticis* fuſco-nebuloſis; *litura* maculaque cinereis; *poſticis* niveis.

287. *Augur*, die *teutſche Karaktereule.*

Fabric. S. E. p. 604. no. 58. N. *Augur.*

Cri-

Cristata, alis *planis* fuscis, *characteribus atris.*

288. *Mercatoria*, die *ostindianische braune Wellenstreife.*

Fabric. S. E. p. 604. no. 59. N. *Mercatoria.*

Cristata, alis *incumbentibus* ferrugineis; *strigis fuscis undatis; posticis* apice nigris, albomaculatis.

289. *Partita*, der *indianische Zirkelfleck.*

Fabric. S. E. p. 604. no. 60. N. *Partita.*

Cristata, alis *incumbentibus* subdentatis griseis; macula baseos atra, stigmatibus duobus brunneis, strigaque media alba.

290. *Pagana*, der *indianische Achtfleck.*

Fabric. S. E. p. 606. no. 68. N. *Pagana.*

Cristata, alis *incumbentibus*, griseo-fuscis; punctis marginalibus fuscis *quinque*, albis *tribus;* posticis albis, fascia nigra.

291. *Orichalcea*, der *indianische Messingfleck.*

Fabric. S. E. p. 607. no. 70. N. *Orichalcea.*

Cristata, alis *deflexis* fuscis; macula magna lunata *orichalcea.*

292. *Signata*, das *indianische goldene Fragzeichen.*

Fabric. S. E. p. 608. no. 74. N. *Signata.*

Cristata, alis *deflexis* obscuris, basi nigropunctatis; *signo medio ? aureo* inscriptis.

293. *Peponis*, die *ostindianische Kürbiseule.*

Fabric. S. E. p. 608. no. 75. N. *Peponis.*

Criſtata, alis *deflexis* griſeis, macula apicis dorſalique brunneo-aurea.

In *Peponibus* Indiae orient.

294. *Pauperata*, der *chineſiſche Glasflügel.*

Fabric. S. E. p. 608. no. 77. N. *Pauperata.*

Criſtata, alis *deflexis* fuſcis, cinereo-variegatis; *poſticis albo-hyalinis.*

295. *Lacera*, der *chineſiſche Schwarzmond.*

Fabric. S. E. p. 609. no. 79. N. *Lacera.*

Criſtata, alis *deflexis*, fuſco-ferrugineoque variegatis, dorſo emarginatis, fronte fulva.

Ad angulum ani macula fulva, *lunula nigra.*

296. *Marginata*, der *europäiſche Braunrand.*

Fabric. S. E. p. 610. no. 85. N. *Marginata.*

Criſtata, alis deflexis flaveſcentibus; ſtrigis ferrugineis, poſtice fuſcis.

297. *Mendica*, der *teutſche Bettler.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 89. N. *Mendica.*

Criſtata, alis *deflexis*, pallide incarnatis; macula media fuſca, ſtigmatibus flavis.

298. *Sinuata*, der *indianiſche Winkelfleck.*

Fabric. S. E. p. 611. no. 92. N. *Sinuata.*

Criſtata, alis *deflexis*, baſi cinereis, macula magna ſinuata nigra.

299. *Hiſtrionica*, der *indianiſche Harlekin.*

Fabric. S. E. p. 612. no. 93. N. *Hiſtrionica.*

Criſtata, alis *deflexis* variegatis; poſticis albis, ſtriga marginali alba.

300. *Rivularis*, die *sächsische Spaltstreife.*

Fabric. S. E. p. 613. no. 99. N. *Rivularis.*

Cristata, alis *deflexis* fuscis; *fascia* grisea, apice *bifida*, flavo-marginata.

301. *Lichenis*, die *teutsche Mooseule.*

Fabric. S. E. p. 614. no. 102. N. *Lichenis.*

Cristata, alis *deflexis; anticis* virentibus, maculis variis atris, subtus fuscis.

In Germaniae *Lichenibus.*

Summa affinitas N. *Aprilinae;* at *duplo minor* *), et puncta postica trigona desunt. Antennae fuscae.

302. *Algae*, die *teutsche Steinflechteneule.*

Fabric. S. E. p. 614. no. 103. N. *Algae.*

Cristata, alis *deflexis;* anticis fuscis; fasciis duabus viridibus.

In *Lichene saxatili* Germaniae.

303. *Eremita*, der *Leipziger Einsiedler.*

Fabric. S. E. p. 616. no. 110. N. *Eremita.*

Cristata, alis *deflexis* ferrugineis; strigis duabus undatis albis: anteriore obsoleta, posteriore repanda.

304. *Tristis*, die *schwedische Trauereule.*

Fabric. S. E. p. 617. no. 115. N. *Tristis.*

Cristata, alis *deflexis* cinereis, fusco-subundatis, margineque exteriore punctato, subtus pallidis fascia fusca.

305. *Rurea*, der *englische Dickrand.*

Fabric. S. E. p. 618. no. 120. N. *Rurea.*

Cri-

*) An *Ludifica* minor no. 143. β?

Criſtata, alis *deflexis*, griſeo-fuſco-variis; poſticis fuſcis, margine craſſiori albo.

306. *Arbuti*, die *engliſche Arbuteule.*

Fabric. S. E. p. 619. no. 122. N. *Arbuti.*

Criſtata, alis *deflexis* fuſcis; *poſticis* nigris, faſcia flava.

307. *Boleti*, die *Löcherſchwammeule.*

Fabric. Mantiſſ. p. 282. no. 21-22. N. *Boleti.*

Laevis, alis *depreſſis* planis, fuſco-irroratis; antennis *pectinatis.*

Kilonii in Boleto verſicolore.

308. *Vireſcens*, die *amerikaniſche grüne S. Craxeule.*

Fabric. Mant. p. 282. no. 27-28. N. *Vireſcens.*

309. *Monilis*, der *engliſche weiſſe Vierpunkt.*

Fabric. Mant. p. 283. no. 42-43. N. *Monilis.*

Laevis, alis *deflexis* brunneis; *punctis quatuor* approximatis *albis*; antennis *pectinatis.*

310. *Lanceolata*, die *teutſche ſchmalflüglichte Eule.*

Fabric. Mant. p. 283. no. 50-51. N. *Lanceolata.*

Laevis, alis *lanceolatis* cinereis, *anticis* fuſco-irroratis.

311. *Viminalis*, die *Goldweideneule.*

Fabric. Mant. p. 284. no. 67-68. N. *Viminalis.*

Criſtata, alis incumbentibus, baſi fuſcis, ſtrigis undatis fulvis, apice cinereis.

Röſels Inſektenbel. III. p. 68. t. 11.

Die

Die zur N. V. 2 Kl. gehörige blaſsgrüne *Raupe* mit weiſſen Linien, Queerſtreifen und Punkten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 34. die *blaſsgrüne Raupe* etc.

312. *Rubiginoſa*, die *Roſteule.* *)

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 525.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae *anticae* ſupra ferrugineae lunula media nigra.

In *Carnioliae* herbidis.

313. *Clavipalpis*, die *Keulſpitze.*

Scop. Ent. carn. p. 213. no. 526.

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.

Alae *anticae* cervinae; margine craſſiore punctis nigris — *Palpi* clavati, compreſſi.

In agro *Labacenſi.*

314. *Deceptoria*, die *wickelförmige Eule.*

Scop. Ent. carn. p. 214. no. 527.

Long. lin. 5. *Lat.* 3.

Alae *anticae* albae; margine externo faſciaque lata media eroſa fuſcis.

In Sylveſtribus circa *Idriam.*

Habitus Ph. *Tortricis.*

315. *Ochracea*, die *öſterreichiſche Okereule.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 114. no. 124.

Vix

*) Ich vermuthe, daſs unter den ſogenannten *Ohrvögeln* oder *Niereneulen* verſchiedene von einerley Art doppelt aufgeſtellt ſind, da man ſie nicht ſowohl aus dem Syſtem, als durch den Augenſchein unterſcheiden kann.

Vix minor Ph. *Quadra*, utrinque flava.

Alae *anticae* ſupra punctis nigris multis; *poſticae* utrinque unico ſubmarginali.

In pratis circa *Schemnitzium.*

Non confundenda cum *Mare* Ph. *Lubricipedae.*

316. *Pyrauſta*, die *wolgaiſche Feuereule.*

Pallas Reiſen I. Anh. p. 20. Ausz. no. 68.

Noctua. Affinis Ph. *complanatae* et *rubricolli*, qua triplo maior. *Alae* obſoletius nigrae; *primariae* punctis tribus aterrimis, ſerie longitudinali aequidiſpoſitis. *Secundariae* obſoletiores. Corpus atrum, ſed abdomen, ſola baſi excepta, *igneo colore* fulvum ſubtus punctis atris. *Vernalis* ad *Volgam* obſervata.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 310. no. 116. c. Ph. *Pyrauſta*, die *Frühlingseule.*

317. *Profuga*, der *Flüchtling.*

Forskähl Deſcript. Animal. p. 82. no. 17.

Spirilinguis; laevis, alis *deflexis*, fuſco-viridibus; faſciis flavis; *inferioribus* rubris, maculis inaequalibus nigris.

Magn. Ph. *Cajae.*

In *Archipelago* prope inſulam *Meteline* excepta in *navi.*

318. *Aureo-maculata*, die *goldmaklichte Eule.*

Sepp Nederl. Inſ. IV. p. 13. t. 3. de *Goudlakens-Vlinder.*

Criſtata; alis *incumbentibus; anticis* pallide fuſcis, *aureo-flavo*-maculatis, faſciatisque; *poſticis* pallide incarnatis.

Larva

Larva lignivora, fuſco-alba, atro-punctata. *Pupa* hilare rubra.

319. *Flava*, die *ganz gelbe Waldeule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 407.

Spirilinguis, criſtata; alis omnibus immaculatis *flavis*.

— Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1423. Ph. *flava.*

Schaeff. Icon. t. 102. f. 1. 2.

320. *Puſtulata*, die *Pockeneule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 408.

Elinguis criſtata; alis fulvis, maculis *novem* luteis. — In *Nemore.*

321. *Pratenſis*, die *Wieſeneule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 46. no. 409.

Spirilinguis criſtata; alis fuſceſcentibus, faſciis duabus fuſcis; omnibus ſubtus flavis, macula media nigra.

— Zool. Dan. Pr. p. 123. no. 1424. Phal. *Pratenſis.*

Schaeff. Icon. t. 163. f. 4. 5?

322. *Deſolata*, die *Weißwelle.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 411.

Spirilinguis criſtata; alis faſcia media undulata *alba; prioribus* faſciis macula baſeos flava: *poſticis* griſeis. — In *Corylo* et *Tilia.*

— Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1426. Phal. *Deſolata.*

Albin. Inſ. t. 85.

323. *Jutica*, die *Schlangeneule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 412.

Criſta-

Criſtata, alis griſeis: *ſuperioribus* ſtrigis *ſerpentibus* quatuor fuſcis; omnibus margine poſtico maculatis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1427. Ph. *Jutica.*

324. *Nocturna*, der *Nächtling.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 124. no. 1429.

Spirilinguis criſtata; alis denticulatis albidis, faſcia lata (medio macula reniformi luteſcente), maculisque duabus apicis nigris.

325. *Heteroclita*, die *Raupenkopfeule.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 413.

Subcriſtata; *capite erucae, antennis nullis;* alis albis, lineis transverſim undatis punctatisque marginalibus nigris. — In *Epilobio.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1429. Ph. *Heteroclita.*

Mém. de Mathem. et de Phyſ. Naturforſch. Tom. V. p. 508. c. figg. *Découverte* d'un *Papillon à tête de Chenille.*

326. *Bilineata*, die *neuyorkiſche Doppellinie.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 18. t. 9. f. 3. Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.* Statura Ph. *Pronubae.*

Alis *anticis* cineraſcentibus, baſi glauco-griſeis, binis lineolis transverſis nigris; *poſticis* glauceſcentibus apice fuſco-flavis, binis faſciis transverſis fuſco-nigris.

327. *Flavo-ſerpentina*, die *neuyorkiſche Gelbſchlange.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 19. t. 9. f. 4. Ses ailes environ *deux pouces.*

Ejusdem *magnitudinis.*

Niger-

Nigerrima, innumeris lineis longitudinalibus, fasciisque transversis nigris; *quatuor lineis serpentinis flavis.*

328. *Incarnato-rubra*, die *neuyorkische fleischfarbigrothe Eule.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 35. t. 18. f. 3. Ses ailes environ *un pouce et trois quarts.*

Alis *anticis* incarnatis, clavis, triangulis, lineisque longitudinalibus nigris; *posticis* rubris nigro-maculatis.

329. *E latinum*, das *neuyorkische lateinische E.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 36. t. 18. f. 5. Ses ailes environ *un pouce et un quart.*

Alis griseo-albis; *anticis* fasciis transversis latis flavis, nigro-punctatis: E latino fusco, ad marginem anteriorem.

330. *Melicerta*, die *bombayische Melizerta.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. I. p. 46. t. 23. f. 1. — de *Bombay.**)
— Ses *ailes* environ *deux pouces et demi.*

Alis *anticis* longitudinaliter glauco-striatis, fasciis transversis fulvis, apice striga purpurascente; *posticis* nigris, albo-maculatis.

Cramer Pap. exot. Vol. I. p. 96. t. 62. Fig. CD. *Melicerta.* (*Foemina.*) — de la Côte de *Coromandel.*

331. *Epi-*

*) *Drury* hat beyde Phalänen t. 23. f. 1. 2. für einerley ausgegeben; Cramer aber daraus zwo verschiedene Arten gemacht, die aber der Zeichnung nach, besonders seine Epione, mit den Druryschen nicht wohl übereinstimmen.

331. *Epione*, die *neuyorkiſche Epione.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 46. t. 23. f. 2.

Alis *anticis* nigris, faſciis transverſis fulvis; *poſticis* concoloribus aterrimis.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 9. t. 102. Fig. EF. *Epione* — à la *Nouv. York* et en *Virginie.*

332. *Ferruginea*, die *St. Chriſtophorſche Roſteule.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 47. t. 23. f. 3. Ses ailes environ *deux pouces et demi.*

Alis concoloribus ferrugineis; *anticis* puncto verſus marginem nigricante, faſciaque transverſa obſcuriore.

333. *Horologica*, die *antiguaiſche Sanduhreule.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 48. t. 23. f. 4.

Alis nigricantibus; *anticis* margine rubro-cinctis, medio apicis rubri faſcia brevis albiſſima. Margines rubri cum thorace rubro *horologii* figuram conſtituunt; inde nomen *Horologica*; *poſticis* margine exteriore partim rubro.

334. *Alboſtrigata*, der *jamaiſche Weiſſſtrich.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 49. t. 23. f. 5.

Alis fuſco-nigris; *anticis* ſtriga longitudinali alba, faſciis transverſis undulatis nigris, baſin ſtrigae albae tangentibus; *poſticis* margine exteriore albis.

335. *Reſpectabilis*, die *neuyorkiſche ehrwürdige Eule.**)

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 49. t. 23. f. 6. Ses ailes *deux pouces.*

Alis

*) Gar keine Aehnlichkeit mit Ph. *Paranympha* L. n. 122. *Röſel* IV. t. 18. f. 1. 2.

Alis *anticis* canefcentibus nigro-maculatis, totis fere nigris, binis lineis transverfis undulatis glaucefcentibus, binisque maculis fulvis reniformibus; *pofticis* aurantiacis, late nigro-fafciatis.

336. *Hieroglyphica*, die *madraffifche Hieroglyphen-eule.*

Drury Illuftr. of nat. hift. p. 3. t. 2. f. 1. Ses ailes *trois pouces et cinq huitiemes.*

Alis concoloribus fufco-nigris; *anticis* binis verfus apicem maculis flaviffimis contiguis, *ferpenteque* in gyrum contracto fufco, canali nigro.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 119. t. 174. Fig. F. Ph. *Mygdonia* — fur la côte de *Coromandel.* *)

337. *Puella*, das *madraffifche Mägdlein.*

Drury Illuftr. of nat. hift. Vol. II. p. 3. t. 2. f. 2. Ses ailes *un pouce et un quart.*

Parva. Alis *anticis* albis, fafciis transverfis rubris, binisque in medio punctis fufcis; *pofticis* rubefcentibus, fufco-ftriatis, margine flavo.

338. *Myrtaea*, die *madraffifche Myrtäa.*

Drury Illuftr. of nat. hift. Vol. II. p. 4. t. 2. f. 3. Ses ailes *un pouce et un quart.*

Alis concoloribus *rubris*, uncinulis nigris tenuiffimis. Parva.

*) Bey der *Cramerfchen* hat die *Schlange* auf den Oberflügeln, da, wo fie fich mit dem Schwanze gegen den Kopf krümmet, noch ein *himmelblaues großes lateinifches* D.

339. *Papilionaris*, die *chinesische tagfalterähnliche Eule.*

Drury Illustr. of nat. hist. p. 4. t. 2. f. 4. Ses ailes *trois pouces et presque un quart.*

Habitus *Papilionis Danai Festivi.* Alis nigris, sulphureo-fasciatis maculatisque; margine anticarum anteriore thoraceque glaucescentibus, duodecim in hoc punctis albidis maioribus minoribusque.

340. *Speciosa*, die *sierraleonische Eule.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 8. t. 5. f. 2. Ses ailes *deux pouces et trois quarts.*

Alis *anticis basi* aurantiacis, fusco-punctatis, *medio* pallide flavis, *apice* fuscis; *posticis* concoloribus sulphureis.

341. *Servula*, die *madrassische Servula.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 20. t. 11. f. 4. Ses ailes *deux pouces.*

Alis *anticis* flavis, strigis tribus obsoletis longitudinalibus, margineque exteriore fuscis; *posticis* dimidio albicantibus, dimidio fuscis.

342. *Anilis*, die *virginische alte Frau.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 22. t. 12. f. 3. Ses ailes *un pouce et demi.*

Alis *anticis* furvis binis lituris, fasciisque binis transversis flavissimis; *posticis* pallidioribus.

343. *Amabilis*, die *afrikanische Perl.* *)

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 23. t. 13. f. 3. Ses ailes *un pouce et demi.*

Alis

*) Unstreitig eine Eule mit den schönsten und seltensten Zeichnungen, so klein sie auch ist.

Alis *anticis* rubris, maculis rotundis, partim contiguis, margineque interiore flavissimis; *posticis* luteis, binis in medio maculis, margineque exteriore aterrimis.

344. *Fluctuosa*, die *sierraleonische Wasserwelle.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 24. t. 14. f. 1.
Ses ailes *trois pouces et un huitieme.*

Alis concoloribus fuscis, ubique nigro-undulatis, fasciis binis transversis latis pallidioribus, linea fusca.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 118. t. 174. Fig. C. Ph. *Fluctuosa.*

345. *Ministra*, die *neuyorkische Dienerinn.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 25. t. 14. f. 3.
Ses ailes *deux pouces.*

Alis *anticis* ferrugineis, lineis transversis nigris tenuissimis; *posticis* flavicantibus margine aurantiacis.

346. *Chera*, die *surinamische Chera.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 36. t. 20. f. 4.
Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus fusco-canescentibus, *anticis* margine interiore flavis.

Cramer Pap. exot. Vol. IV. p. 39. t. 308. Fig. E.

347. *Scolopacea*, die *jamaische Schecke.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 38. t. 22. f. 1.
Ses ailes *trois pouces et trois huitiemes.*

Alis dentatis concoloribus lutescentibus, innumeris lituris, fasciisque nigris undulatis, variegatis.

348. *Sospeta*, die *jamaische Sospeta.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 39. t. 22. f. 3.
Ses ailes *deux pouces et trois huitiemes.*

Alis concoloribus flavissimis, falcato-dentatis, maculis striatis fuscis.

349. *Opigena*, die *jamaische Opigena.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 39. t. 22. f. 4.
Ses ailes *trois pouces et demi.*

Alis falcatis concoloribus fusco-furvis, lineis transversis undulatis nigris, fasciisque obscurioribus: *palpis* longioribus.

Cramer Pap. exot. Vol. II. p. 118. t. 174. Fig. D. Ph. *Scolopacea* *) — de *Suriname.*

350. *Hercyna*, die *jamaische Herzyna.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 41. t. 24. f. 1. 2.
Ses ailes *quatre pouces et un quart.*

Magna. Alis denticulatis fusco-furvis, lineis longitudinalibus undulatis nigris; *anticis* disco pallidiore, binis *lunulis* obscure fuscis.

351. *Edusa*, die *neuyorkische Edusa.*

Drury Illustr. of nat. hist. Vol. II. p. 42. t. 24. f. 4.
Ses ailes *deux pouces et presque un quart.*

Alis dentatis, concoloribus fuscis, griseo-albo-variegatis.

352. *Fla-*

*) Das Citatum des Drury bey dieser Scolopacea ist richtig: nämlich II. t. 22. f. 4. wie denn auch beyderley Abbildungen übereinkommen, nur sind die schwarzen Queerlinien in der kramerschen deutlicher; die Benennung aber Scolopacea ist unrichtig, und aus Versehen von *Drury* II. t. 28. f. 1. genommen, die ganz anders aussiehet.

352. *Flavo-maculata*, der *Gelbfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 148. no. 77.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis deflexis, *ſuperioribus* nebuloſo-fuſcis; *inferioribus* nigris, *macula* margineque luteis.

La *Phalene brune à tache jaune aux ailes inférieures.*

Long. 5. *lign.*

353. *Terlineata*, die *Dreylinie.*

Geoffr. Inſ. II. p. 148. no. 78.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* cinereis, faſciis transverſis fuſcis *e triplici linea* compoſitis.

La *Rayure à trois lignes.*

Long. 8. lign.

354. *Undoſa*, die *Welle.*

Geoffr. Inſ. II. p. 153. no. 86. t. 12. f. 4.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* cinereo-fuſcis; *ſuperioribus* faſcia *undoſa* triplici, punctoque obſcuro marmoratis.

Le *Flot.*

Long. 1 pouce.

355. *Bifaſciata*, die *braune Doppelbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 153. no. 87.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* albo-flaveſcentibus, *faſcia duplici* transverſa *fuſca.*

La *Phalene blancheatre à deux bandes brunes.*

Long. 7. lign.

356. *Margine maculata*, der *Randfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 154 no. 88.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* albido-flaveſcentibus, faſcia marginali oblonga fuſca.

La *tache marginale.*

Long. 5. lign.

357. *Decolorata*, die *verbleichte Eule.*

Geoffr. Inſ. II. p. 154. no. 90.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis*, albido-fulvis immaculatis.

La *Décolorée.*

Long. 7. lign.

Réaum. Inſ. I. t. 36. f. 8. 10. 11. 12.

358. *Griſea*, die *kleine graue Eule.*

Geoffr. Inſ. II. p. 160. no. 98.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſco-nebuloſis, *ſuperioribus* maculis irregularibus albis.

La *Phalene petit-gris.*

Long. 6. lign.

359. *Teſſellata*, der *Würfelſaum.*

Geoffr. Inſ. II. p. 161. no. 102.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſco-nebuloſis, *limbo teſſellato;* ſuperioribus macula duplici punctoque albis.

La *Frange bigarrée.*

Long. 7. lign.

360. *Atra*, der *Schwarzflügel.*

Geoffr. Inſ. II. p. 162. no. 104.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis*, atris, ſingulis macula alba.

La

La *Phalene* noire à une tache blanche ſur chaque aile.

Long. 6. lign.

361. *Albo-maculata*, der *weiſſe Doppelfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 163. no. 105.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigris, ſingulis duabus maculis, et lineis undulatis albis.

La *Phalene noire à deux taches blanches ſur chaque aile.*

Long. 7. lign.

362. *Albo-lineata*, die *Weiſslinie.*

Geoffr. Inſ. II. p. 163. no. 106.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigris, lineis punctisque albis.

La *Phalene noire à lignes blanches.*

Long. 6. lign.

363. *Albo-faſciata*, die *Weiſsbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 163. no. 107.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* fuſcis; ſuperioribus faſcia duplici obliqua alba.

La *Phalene brune à deux bandes blanches.*

Long. 3½. lign.

364. *Aureo-maculata*, der *Goldfleck.*

Geoffr. Inſ. II. p. 165. no. 110.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis *deflexis* nigro-fuſcis, maculis plurimis albido-flaveſcentibus.

La *plaque dorée.*

Réaum. Inſ. I. t. 19. f. 2.

365. ***Murina***, die *mausegraue Eule.*

Degeer Inf. Tom. I. Part. I. p. 406. no. 3. t. 6. f. 22. *Phalene gris-de-souris à 4 taches noires.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes croisées d'un gris de souris avec 4 taches irrégulieres noires, à ailes inférieures en partie blanches.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 293. no. 3. t. 6. f. 22. die *mausefahle Phaläne mit 4 schwarzen Flecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern; Saugrüssel, und gekreuzten mausefahlen Flügeln mit vier schwarzen ungleichen Flecken, und zum Theil weissen Unterflügeln.

Schaeff. Icon. t. 112. f. 1. 2.

366. ***Griseo-variegata***, die *Grauschecke.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 410. no. 2. t. 6. f. 23. *Phalene grise bigarrée à deux taches blanches sur chacune.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues grises tachetées de jaune orange, avec deux grandes taches blanches sur chacune.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 297. no. 2. t. 6. f. 23. die *graue geschechte Phaläne mit zween weissen Flecken.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und niederhangenden grauen, orangegelb gefleckten Flügeln, und zween grossen weissen Flecken auf jedem.

367. ***Viridi-obscura***, die *dunkelgrüne Eule.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 412. no. 5. t. 6. f. 24. *Phalene verte obscure à rayes blanches et noires.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un brun verdâtre avec des rayes

ondées

ondées blanches et noires, et deux taches blancheatres au milieu.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 299. no. 5. t. 6. f. 24. die *dunkelgrüne weiß und ſchwarzgeſtreifte Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braungrünlichen niederhangenden Flügeln, mit weiſſen und ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und zween weiſslichen Mittelflecken.

368. *Megacephala*, der *Dickkopf.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 413. no. 7. t. 7. f. 9. *Phalene groſſe-tête.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit cendrées, avec des rayes ondées noires et une tache ovale au milieu d'un blanc ſale.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 200. no. 7. t. 7. f. 9. der *Dickkopf.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen dachförmig niederhangenden Flügeln, mit ſchwarzen gewäſſerten Streifen, und einem eyförmigen weiſsgraulichen Mittelfleck.

369. *Albo-venoſa*, die *Weißader.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 415. no. 8. t. 7. f. 14. *Phalene griſe à nervures blanches.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit griſes, dont les nervures ſont d'un gris blancheâtre.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 301. no. 8. t. 7. f. 14. die *graue weißadrichte Phaläne.*

Die

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und grauen, dachförmig niederhangenden Flügeln, mit weissgraulichen Adern.

370. *Hepatica*, die *leberfarbige Eule.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 417. no. 9. t. 6. f. 25. *Phalene couleur de foye.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris couleur de foye luisant avec deux lignes ondées et deux taches noirâtres.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 303. no. 9. t. 6. f. 25. die *leberfarbige Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und grauen, glänzend leberfarbigen niederhangenden Flügeln, mit zwo gewässerten Linien, und zween schwärzlichen Flecken.

371. *Hippophäe*, die *Weidendorneule.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 419. no. 11. t. 7. f. 16. *Phalene de l' Hippophäe.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un brun luisant roussâtre avec une ligne transverse rousse, et un gros point noir.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 304. no. 11. t. 7. f. 16. die *Weidendornphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und braunglänzend röthlichen niederhangenden Flügeln mit einer röthlichen Queerlinie, und einem dicken schwatzen Punkt.

372. *Cinerea*, die *aschgraue Eule.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 422. no. 13. t. 7. f. 19. *Phalene cendrée à deux taches couleur de souffre.*

Pha-

Phalene à antennes filiformes rouſſes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris cendré agathe avec des rayes transverſes noires, et deux taches couleur de ſouffre.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 306. no. 13. t. 7. f. 19. die *aſchgraue Phaläne mit zween ſchwefelgelben Flecken.*

Die *Phaläne* mit braunröthlichen fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und aſchgrauen achatfarbigen, niederhangenden Flügeln, mit ſchwarzen Queerſtreifen, und zween ſchwefelgelben Flecken.

373. *Ypſilon graecum*, das *griechiſche Ypſilon.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 423. no. 14. t. 7. f. 23. *Phalene 8, ou.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues d'un gris d'agathe à nuances couleur de lilas, et à rayes ondées noirâtres, avec une tache couleur de ſouffre en 8.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 307. no. 14. t. 7. f. 23. *die 8 Phaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und achatgrauen, lilafarbigen, ſchattirten, niederhangenden Flügeln, mit gewäſſerten ſchwärzlichen Streifen, und einem ſchwefelgelben Fleck in Geſtalt eines griechiſchen 8.

374. *Filicis*, die *Farrenkrautphaläne.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 435. no. 7 t. 7. f. 26. *Phalene de la Fougere.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé, à ailes rabatues rayées de noir, et

et de gris-de-perle avec deux taches cendrées, et une tache et raye ondée d'un blanc jaunâtre.

Degeer Ueberſ. II Th. I B. p. 317. no. 7. t. 7. f. 26. die *Farrenkrautphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, und niederhangenden ſchwarz- und perlgraugeſtreiften Flügeln, mit zween aſchgrauen und einem weiſsgelblichen Fleck, und eben dergleichen gewäſſerten Streife.

375. *Angulata*, die *Eckbruſt.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 436. no. 8. t. 8. f. 9. *Phalene ardoiſée à corcelet angulaire.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé et angulaire, à ailes rabatues ardoiſées avec des taches d'un gris blancheatre, deux taches rouſſes et quelques traits noirs.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 318. no. 8. t. 8. f. 9. die *ſchieferfarbige Phaläne mit eckigem Bruſtſchilde.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, Rückenkamm, eckigem Bruſtſchilde, und niederhangenden ſchieferfarbigen Flügeln, mit grauweiſslichen und zween roſtfarbigen Flecken, wie auch einigen ſchwarzen Strichen.

376. *Reticulata*, die *Netzſtreife.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 441. no. 11. t. 7. f. 27. *Phalene brune à rayes griſes en réſeau.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, et à corcelet huppé et angulaire, à ailes rabatues brunes à nervures et à rayes transverſes d'un gris clair.

Degeer

Degeer Uebers. II Th. I B. p. 223. no. 11. t. 7. f. 27. die *braune Phaläne mit grauen netzförmigen Streifen.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, Rückenkamm, eckigem Brustschilde, und niederhangenden achatbraunen Flügeln, mit zwo schwarzen gekrümmten Streifen, und einem dreyeckigen Fleck von gleicher Farbe.

377. *Agrippina*, die *surinamische Agrippina.* *)

Cramer Pap. exot. I. p. 136. t. 87. Fig. A. Ph. *Agrippina.*

— — p. 138. t. 88. Fig. A.

Maxima. Alis incarnatis cinerascentibus; lineis innumeris transversis undulatis nigris fulvisque.

Merian. Surin. t. 20.

378. *Arnea*, die *surinamische Arnea.*

Cramer Pap. exot. I. p. 59. t. 36. Fig. G.

Alis *anticis* virescentibus nigro-venosis, flavo-marginatis: disco flavo-rubro, atro-uncinulato; *posticis* incarnatis.

379. *Cajeta*, die *koromandelsche Kajeta.*

Cramer Pap. exot. I. p. 48. t. 30. Fig. AB. *Mas;* Fig. C. *Foemina.*

Alis *anticis* fusco-rubris, margine exteriore albis; *lineis* longitudinalibus arcuatis, albo-punctatis, binisque transversis albis: *maculis* binis oblongis nigris, quatuorque ovatis obscure viridibus;

*) Diese ist nicht *Strix* Linn.

dibus; *posticis* ferrugineis dilute atro-maculatis, punctis marginalibus ochreaceis.

380. *Corinna*, die *surinamische Korinna.*

Cramer Pap. exot. I. p. 47. t. 29. Fig. H.

Alis testaceis, aureo-marginatis; *anticis* quatuor lineis transversis *aureis*, coeruleo-terminatis; *posticis* punctis quatuor marginalibus fuscis, binis aureis, et in utraque cyaneum.

381. *Ilus*, die *surinamische Ilus.*

Cramer Pap. exot. I. p. 145. t. 95. Fig. E. *Foemina.*

Alis *anticis* furvis, apice littera Y fulva, rubro-punctata; *posticis* rubicundis.

382. *Julia*, die *kapensische Julia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 11. t. 7. Fig. EF.

Alis fusco-rubris, *anticis* flavo-variegatis; *posticis* concoloribus brunneis.

Houttuin Nat. Hist. Tom. I. Part. XII. p. 676. t. 92. f. 6. *Foemina.*

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 310. no. 193. a. Phal. *Julia*, der *Pinselschwanz.*

383. *Latona*, die *guinéische Latona.*

Cramer Pap. exot. I. p. 20. t. 13. Fig. B.

Magna. Alis obscure brunneis; *anticis* numero 9 olivaceo, macula media atra, notatis; fasciis transversis, lineisque acute undulatis albis.

384. *Manlia*, die — *Manlia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 144. t. 92. Fig. A.

Magna.

Magna. Alis ſubfalcatis fuſco-rubentibus; *anticis* binis maculis obſoletis furvis; *poſticis* baſi fuſco-rubris, medio cyaneo-viridibus, apice purpuraſcentibus.

385. *Menete*, die *weſtindiſche Menete.*

Cramer Pap. exot. I. p. 110. t. 70. Fig. D.

Alis *anticis* purpuraſcentibus, binis maculis, lineisque longitudinalibus, binisque transverſis, flavicantibus; *poſticis* luteis marginalibus fuſcis, binis maculis longitudinalibus fuſcis.

386. *Milete*, die *nordamerikaniſche Milete.*

Cramer Pap. exot. I. p. 26. t. 18. Fig. D.

Alis concoloribus nigerrimis flavo-maculatis.

387. *Nyſeus*, der *ſurinamiſche Nyſeus.*

Cramer Pap. exot. I. p. 119. t. 75. Fig. E.

Alis ſubfalcato-dentatis ciliatis; *anticis* flaveſcentibus, lineis transverſis incarnatis, punctis numeroſis nigris; *poſticis* purpuraſcentibus, baſi margineque flavicantibus.

388. *Ora*, die — *Ora.*

Cramer Pap. exot. I. p. 139. t. 88. Fig. B.

Alis rubeſcentibus; *anticis* margine anteriore luteo; binis lineis transverſis, binisque lunulis nigris, puncto atro.

389. *Pomona*, die *koromandelſche Pomona.*

Cramer Pap. exot. I. p. 122. t. 77. Fig. C.

Magna. Alis *anticis* viridi-albo-fuſcoque variegatis, *virga* fuſca bifurcata; *poſticis* ferrugineo-fuſcis, macula *reniformi* fuſca.

390. *Sybaris*, die *jamaische Sybaris.*

Cramer Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. E. *Mas.*

Alis concoloribus nigerrimis, albo-maculatis; tribus anticarum margine anteriore punctis ruberrimis.

391. *Tanais*, die *surinamische Tanais.*

Cramer Pap. exot. I. p. 106. t. 68. Fig. D. *Foemina.*

Alis fuscis, flavo-nigroque variegatis.

392. *Tybris*, die *surinamische Tybris.*

Cramer Pap. exot. I. p. 145. t. 92. Fig. D.

Alis incarnatis; *anticis* fusco-maculatis punctatisque; *posticis* margine interiore abdomineque aurantiacis.

393. *Timolea*, die *surinamische Timolea.*

Cramer Pap. exot. I. p. 127. t. 80. Fig. F.

Alis concoloribus fuscis; *anticis* lineis transversis undulatis canescentibus.

394. *Admirabilis*, die *surinamische Wundereule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 11. t. 103. Fig. G.

Alis *anticis* albo-flavis, puncto ocellari albo, maculisque ovatis pellucidis; *posticis* niveis, abdomine rubro, albo-punctato.

395. *Amphix*, die *koromandelsche Amphix.*

Cramer Pap. exot. II. p. 59. t. 134. Fig. C.

Alis *denticulatis*; *anticis* incarnatis, tribus medio punctis nigris, in triangulo positis, margine interiore atro-punctato; *posticis* albofurvis.

396. *Asy-*

396. *Asylas*, die *kapensische Asylas.*

Cramer Pap. exot. II. p. 62. t. 137. Fig. C.

Alis incarnatis; *anticis* atro-lituratis, fascia longitudinali albicante.

397. *Bajularia*, die *amboinische Bajularia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 115. t. 172. Fig. C.

Alis *anticis* furvis, binis maculis fasciaque transversa albis; *posticis* flavis atro-maculatis fasciatisque.

398. *Caffraria*, die *kaffersche Eule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 82. t. 147. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* flavo-atroque variegatis, punctis marginalibus atris; *posticis* albis, fusco-marginatis.

399. *Capensis*, die *Kapeule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 109. t. 167. Fig. C.

Alis concoloribus fuscis; *anticis* lineis fasciisque albis variegatis.

400. *Chlorea*, die *surinamische Chlorea.*

Cramer Pap. exot. II. p. 12. t. 104. Fig. C.

Alis furvis; *anticis* nigro-flavoque variegatis, *tridente rubro.*

401. *Cocalus*, der *ostindianische Kokalus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 59. t. 134. Fig. B.

Alis *anticis* viridibus, fusco-lineatis; *posticis* aurantiacis, margine nigris.

402. *Collusoria*, die *surinamische Collusoria.*

Cramer Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. F.

Alis furvis; *anticis* fascia longitudinali undulata obscuriore; *posticis* aurantiacis, margine aterrimo, binis figuris atris, *catulum* referentibus.

403. *Cresus*, die *berbizëische Kresuseule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 72. t. 142. Fig. C.

Alis *anticis* fuscis, atro-argenteoque punctatis; *posticis* incarnato-flavis.

404. *Dolon*, der *surinamische Dolon.*

Cramer Pap. exot. II. p. 7. t. 101. Fig. DE. *Foemina;* Fig. F. *Mas.*

Foem. Alis nigricantibus, linea transversa albidissima; *anticis* glauco-maculatis; *posticis* fusco-cyaneis, fusco-punctatis.

Mas. Alis furvis, apice binis maculis incarnatis, lineisque transversis undulatis albis.

405. *Hermonia*, die *koromandelsche Hermonia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 119. t. 174. Fig. E.

Alis fusco-nigris; *anticis* fascia transversa brevi alba, flavo-marginata; binisque lunulis glaucis, medio luteis.

406. *Hieroglyphica*, die *kurakaische Bildereule.*

Cramer Pap. exot. II. p. 81. t. 147. Fig. D.

Alis *anticis* hieroglyphicis, viridi-flavoque lineatis, trina punctorum atrorum serie marginali; *posticis* fuscis.

407. *Juturna*, die *surinamische Juturna.*

Cramer Pap. exot. II. p. 48. t. 129. Fig. E.

Alis brunneis; *anticis* flavo-fasciatis, binis-

que

que litteris O fuſcis, flavo-marginatis; *poſticis* brunneis concoloribus.

408. *Lelex*, die *ſurinamiſche Lelex.*

Cramer Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. C.
Alis luteis, nigro-venoſis.

409. *Lepida*, die *bengaliſche Lepida.*

Cramer Pap. exot. exot. II. p. 50. t. 130. Fig. E.
Alis *anticis* viridi-fuſcis; *poſticis* fuſco-rubentibus, baſi flavicantibus.

410. *Levida*, die *ſurinamiſche Levida.*

Cramer Pap. exot. II. p. 46. t. 128. Fig. D. *Foemina.*
Alis concoloribus purpuraſcentibus, transverſe nigro-lineatis.

411. *Macarea*, die — *Makarea.*

Cramer Pap. exot. II. p. 17. t. 107. Fig. F.
Alis nigerrimis, baſi cyaneo-radiatis; *anticis* faſcia transverſa alba, latere uno rubro-marginato; *poſticis* binis maculis rubris.

412. *Macaria*, die *ſurinamiſche Makaria.*

Cramer Pap. exot. II. p. 48. t. 129. Fig. D.
Alis fuſcis, viridi-micantibus, linea transverſa, rubro-alba, margine exteriore lato rubente, atro punctato.

413. *Modeſta*, die *ſurinamiſche Modeſta.*

Cramer Pap. exot. II. p. 28. t. 115. Fig. C.
Alis *anticis* furvis, macula marginali ſanguinea; *poſticis* rubeſcentibus.

414. *Mygdon*, der — *Mygdon.*

Cramer Pap. exot. II. p. 94. t. 156. Fig. G.

Alis *anticis* nigris, triangulo furvo, basi aurantiaco, lateribus albicantibus; *posticis* incarnatis.

415. *Mygdonia*, die *koromandelsche Mygdonia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 119. t. 174. Fig. F.

Alis nigro-furvis; *anticis* binis lineis transversis luteis, medio interruptis, litteraque D cyanea, annulis fuscis inclusa.

416. *Onytes*, die *surinamische Onytes.*

Cramer Pap. exot. II. p. 107. t. 165. Fig. E.

Alis *anticis* fusco-rubris; *posticis* pallide fuscis, omnibus flavissime marginatis.

417. *Orodes*, die *surinamische Orodes.*

Cramer Pap. exot. II. p. 49. t. 129. Fig. F.

Alis concoloribus brunneis; *posticis* binis fasciis coeruleis ad marginem exteriorem.

418. *Orsa*, die *surinamische Orsa.*

Cramer Pap. exot. II. p. 75. t. 143. Fig. F.

Alis niveis; *anticis* ocellis fuscis pellucidis, margine exteriore linea fusca undulata, abdomine aurantiaco atro-annulato.

419. *Perithea*, die *amboinische Perithea.*

Cramer Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. D.

Alis fuscescentibus, basi fasciaque transversa flavissimis.

420. *Phasis*, die *surinamische Phasis.*

Cramer

Cramer Pap. exot. II. p. 106. t. 165. Fig. B.

Alis *anticis* marmoratis, lineis transversis atris undulatis; *posticis* olivaceis, binis fasciis transversis luteis.

421. *Procus*, der *surinamische Prokus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 85. t. 149. Fig. G.

Magna. Alis *anticis* violaceis fusco-lituratis, littera d fusca insignitis; *posticis* aurantiacis, binis fasciis latis nigris sinuosis, medio continuis.

422. *Priverna*, die *surinamische Priverna.*

Cramer Pap. exot. II. p. 108. t. 166. Fig. E.

Alis violaceis, fasciis binis transversis flavissimis, lineisque luteis longitudinalibus partim concatenatis; *posticis* aurantiacis, margine purpurascentibus.

423. *Puera*, die *surinamische Puera.*

Cramer Pap. exot. II. p. 10. t. 103. Fig. DE.

Alis supra, *anticis* cinereo-glaucis, margine anteriore rubro-punctatis; *posticis* nigerrimis, flavo-rubroque maculatis; subtus rubris, flavo-atroque maculatis.

424. *Pyrgo*, die *surinamische Pyrgo.*

Cramer Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. D.

Alis *anticis* concoloribus castaneis, margine anteriore albo; *posticis* fuscis, maculis mediis flavis.

425. *Retorta*, die *koromandelsche Retorte.*

Cramer Pap. exot. II. p. 29. t. 116. Fig. D. *Mas.*

Alis fusco-nigris; *anticis Retorta* chymica.

Clerk Icon. t. 54. f. 2. 3.

Cramer Pap. exot. III. p. 146. t. 274. Fig. A. *Foemina.*

426. *Salaminia*, die *surinamische Salaminia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 117. t. 174. Fig. A.

Alis *anticis* viridibus, margine anteriore rubro-lituratis, fascia longa lata incarnata, venis nigris, binis sanguineis, margine exteriore fusco-rubro, glauco-albo; *posticis* luteis nigro-marginatis, binis in medio uncis nigris.

Clerk Icon. t. 48. f. 5. 6.

427. *Sicheas*, der *surinamische Sicheas.*

Cramer Pap. exot. II. p. 86. t. 150. Fig. E.

Alis fuscis, rubro-transverse lineatis; *posticis* flavo-fuscis.

428. *Suero*, die — *Suero.*

Cramer Pap. exot. II. p. 3. t. 97. Fig. F.

Alis nigricantibus, lineis transversis coeruleis interruptis, margine anteriore antice incarnato, lineola marginali communi ferruginea.

429. *Tages*, die — *Tages.*

Cramer Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. D.

Alis furvis, glauco-maculatis.

430. *Tarchon*, die *surinamische Tarchon.*

Cramer Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. G.

Alis *falcatis* concoloribus, obsolete-fuscis.

431. *Tirhaca*, die *kapensische Tirhaka.*

Cramer

Cramer Pap. exot. II. p. 116. t. 172. Fig. E.

Alis *anticis* viridibus, binis maculis fuſcis, margine exteriore fuſco, lineis transverſis rubris undulatis; *poſticis* luteis fuſco-maculatis.

432. *Uſeus*, der *ſurinamiſche Uſeus.*

Cramer Pap. exot. II. p. 2. t. 97. Fig. E.

Alis furvis; *anticis* binis maculis glaucis, lineola transverſa glauca communi.

433. *Venulia*, die — *Venulia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 107. t. 165. Fig. D.

Alis *anticis* atro-punctatis, binis faſciis acuminatis, rubro-marginatis, puncto diaphano; *poſticis* luteis binis punctis margineque nigris.

434. *Acron*, der *berbizéiſche Akron.*

Cramer Pap. exot. III. p. 59. t. 227. Fig. B.

Alis fuſcis; *anticis* nigro-hieroglyphicis, margine punctis pallidioribus.

435. *Adiutrix*, die *ſurinamiſche Adjutrix.*

Cramer Pap. exot. III. p. 144. t. 272. Fig. E F.

Alis *anticis* rubellis, nigro-maculatis; *poſticis* pallide fuſcis.

436. *Amando*, die *ſurinamiſche Amando.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. E.

Alis fulvis concoloribus, fuſco-maculatis punctatisque; *anticis* falcatis.

437. *Ammonia*, die *koromandelſche Ammonia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 98. t. 250. Fig. D.

Alis fuſcis; *anticis* areis furvis, flavis faſciis transverſis.

438. *Archeſia*, die *koromandelſche Archeſia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 145. t. 273. Fig. G.

Alis obſcure aurantiacis, atro-lineatis faſciatisque.

439. *Caraenea*, die *bataviſche Karänea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 140. t. 269. Fig. EF.

Alis furvis; nigro-venoſis, margine poſtico communi fuſco-incarnato, atroque punctato.

440. *Cephiſe*, die *oſtindianiſche Zephiſe.*

Cramer Pap. exot. III. p. 59. t. 227. Fig. C.

Alis fuſcis; *anticis* medio furvis, faſcia transverſa flava, margine atro-punctatis.

441. *Cupentia*, die *ſurinamiſche Kupentia.*

Cramer Pag. exot. III. p. 103. t. 252. Fig. E.

Alis *anticis*, fuſco-alboque variegatis; *poſticis* concoloribus fuſcis.

442. *Cyllaria*, die *koromandelſche Zyllaria.*

Cramer Pap. exot. III. p. 100. t. 251. Fig. CD.

Alis *anticis* furvis, gagatheo-variegatis; *poſticis* purpuraſcentibus, tribus ſignaturis albis.

443. *Emmedonia*, die *virginiſche Emmedonia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. D.

Alis fuſcis; *anticis* baſi macula, medio faſcia, margine 9 lituris transverſis obſcurioribus; *poſticis* ſubdentatis, viridi-incarnatis: abdomine *ſphegiformi.*

444. *Epopea*, die *surinamische Epopea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 144. t. 272. Fig. GH.

Alis *anticis* incarnatis, basi maculis ocellatis, versusque marginem transversis latis — nigerrimis; *posticis* incarnato-fuscis.

445. *Erichtea*, die *virginische Erichtea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. E.

Alis concoloribus fuscis, nigro-venosis; *anticis* binis *bacillis*, *malleisque*, scapo obliquo — nigris.

446. *Ezea*, die *guineische Ezea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 78. t. 239. Fig. D.

Alis furvis; *anticis* maculis, lineisque transversis undulatis nigris; *posticis* maculis marginalibus flavis.

447. *Filia*, die *kapensische Tochter.*

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. D.

Alis *anticis* aurantiaco-canis, maculis marginalibus albis; *posticis* albo-canis.

448. *Grynea*, die *virginische Grynea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 29. t. 208. Fig. H.

Het virginisch geele Weskind. *)

La Likenée jaune de la Virginie.

Alis *anticis* canescentibus, binis in utraque litteris Y albicantibus; *posticis* aurantiacis nigro-signatis.

449. *Hyppasia*, die *koromandelsche Hyppasia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 99. t. 250. Fig. D.

Alis

*) Im Gegensatz der *Paranympha* L.

Alis incarnatis; *anticis* triangulo ſurvo, albo-faſciato.

450. *Inara*, die *koromandelſche Inara.*

Cramer Pap. exot. III. p. 78. t. 289. Fig. E.

Alis teſtaceis; *anticis* baſi albicantibus, maculisque fuſcis triangularibus.

451. *Luminoſa*, die *javaniſche Lichteule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 147. t. 274. Fig. D.

Alis furvis; *anticis* baſi purpuraſcentibus, lunulis albis, albo-punctatis, binis margine litteris U albis; *poſticis* lineis transverſis undulatis nigris.

452. *Martheſia*, die *virginiſche Martheſia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 127. t. 264. Fig. B.

Alis flavo-incarnatis; *anticis* maculis triangularibus liturisque nigris.

453. *Materna*, die *koromandelſche Materna.*

Cramer Pap. exot. III. p. 137. t. 267. Fig. E.

Magna. Alis viridi-micantibus fuſco-lituratis, alboque longitudinaliter faſciatis; tribus globulis brunneis; *poſticis* aurantiacis, binis in medio globulis atris, margineque ſinuato nigerrimo.

454. *Neptis*, die *ſurinamiſche Neptis.*

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. F.

Alis ferrugineis albo-maculatis.

455. *Nitida*, die *ſurinamiſche Glanzeule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 147. t. 274. Fig. F.

Alis

Alis *anticis* fulvis, rubro-punctatis, maculis bacillisque transversis olivaceis, quatuor maculis ovatis albis continuis; *posticis* hilare rubris albo-marginatis.

456. *Obscura*, die *koromandelsche Düstereule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 146. t. 274. Fig. B.

Alis obscure fuscis, fasciis lineisque longitudinalibus et transversis nigerrimis; *anticis* macula obsolete fusca, uno latere albo-nigra.

457. *Ocellata*, die *surinamische Augeneule.*

Cramer Pap. exot. III. p. 151. t. 276. Fig. D. *Foemina*; Fig. E. *Mas.*

Alis *anticis* fusco-olivaceis, *posticis* pallidioribus: ocello nigro, albo-pupillato.

458. *Orosia*, die *koromandelsche Orosia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. D.

Alis *anticis* fusco-incarnatis, triangulo obtuso furvo, albo-marginato; *posticis* aurantiacis fusco-marginatis.

459. *Soror*, die *surinamische Schwester.*

Cramer Pap. exot. III. p. 150. t. 276. Fig. B.

Alis *anticis* fusco-purpurascenti-nigris, basi aurantiaco-striatis, *posticis* furvis binis maculis aurantiacis.

460. *Spadix*, die *virginische Spadix.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. Fig. F.

Alis *anticis* obscure fuscis, lineis transversis ferrugineis, binis ad marginem punctis nigris; *posticis* pallidioribus.

461. *Timais*, die *koromandelsche Timais.*
Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. B.
Alis anticis olivaceis maculis coadunatis incarnatis, binis ocellis nigris, iride aurantiaca, punctisque marginalibus aurantiacis; *posticis* canescentibus.

462. *Umminia*, die *javanische Umminia.*
Cramer Pap. exot. III. p. 137. t. 267.
Alis olivaceo-rubescentibus, *anticis* subfalcatis, binisque maculis coadunatis albis, annulo medio aurantiacis.

463. *Vxor*, die *surinamische Gattinn.*
Cramer Pap. exot. III. p. 150. t. 276. Fig. A.
Alis olivaceis; *anticis* fulvo-coeruleoque variegatis, binis punctis albissimis; *posticis* obscurioribus, binis maculis aurantiacis.

464. *Vidua*, die *guineische Wittwe.*
Cramer Pap. exot. III. p. 127. t. 264. Fig. C.
Alis *anticis* luteo-fuscis; *posticis* incarnatis nigro-venosis.

465. *Virbia*, die *koromandelsche Virbia.*
Cramer Pap. exot. III. p. 146. t. 273. Fig. H.
Alis incarnatis, *anticis* fulvo-punctatis, linea transversa nigra, antice furcata; *posticis* binis fasciis acute undulatis.

466. *Schneideriana*, die *surinamische Schneidereule.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 37. t. 308. Fig. A.
Alis furvis, *anticis* basi nigro-punctatis striatisque,

atisque, margine atra lunulatis; *posticis* transverſe atro-lineatis.

467. *Stenelea*, die *ſurinamiſche Stenelea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 38. t. 308. Fig. B.
Alis teſtaceis, numeroſe atro-lituratis, omnibus ciliatis, linea marginali undulata nigra.

468. *Herilia*, die *ſurinamiſche Herilia.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 39. t. 309. Fig. A. *Mas.* B C. *Foemina.*
Magna. Alis concoloribus furvis, lineis transverſis atris undulatis; *anticis* ocellis, maculis reniformibus, ſquamisque papilionaceis atris.

469. *Helima*, die *afrikaniſche Helima.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 40. t. 309. Fig. D.
Alis concoloribus fuſco-nigris, lineis faſciisque longitudinalibus pallidioribus.

470. *Sterope*, die *ſurinamiſche Sterope.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 40. t. 309. Fig. E. *Femina.* p. 47. t. 312. Fig. C. *Mas.*
Alis concoloribus luteis nigro-lineatis punctatisque; *anticis* binis maculis marginalibus aurantiacis, nigro-atomatis lineola alba.

471. *Politia*, die *ſurinamiſche Politia.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 41. t. 309. Fig. F.
Alis albis nigro-lineatis punctatisque.

472. *Stolliana*, die *ſurinamiſche Stolliana.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 41. t. 310. Fig. A B.
Alis *anticis* brunneis, nigro-faſciatis punctatisque;

tisque; *posticis* purpurascentibus, disco aurantiaco, basi abdomineque coeruleis.

473. *Ebalea*, die *surinamische Ebalea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 41. t. 310. Fig. C.
Alis fuscis, *anticis* ocello furvo, margine ferrugineo; *posticis* pallidioribus.

474. *Androgea*, die *surinamische Androgea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. D.
Alis *anticis* olivaceis, mirifice variegatis; *posticis* albido-rutilantibus.

475. *Cedica*, die *surinamische Zedika.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. E.
Alis fuscis, albido-variegatis.

476. *Choninea*, die *surinamische Choninea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. F.
Alis brunneis, fasciis coalitis aurantiacis.

477. *Dares*, die *surinamische Dares.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 42. t. 310. Fig. G.
Alis *anticis* olivaceis variegatis; *posticis* brunneis, basi nigris.

478. *Idonea*, die *surinamische Idonea.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 43. t. 311. Fig. A.
Alis cinerascentibus, fusco-albo-flavo-aurantiacoque variegatis; *posticis* concoloribus fuscis.

479. *Clara*, die — *Klara.*
Cramer Pap. exot. IV. p. 43. t. 311. Fig. B.

Alis

Alis fuscis; *anticis* macula triangulari argentea; *posticis* disco albo.

480. *Dyndyma*, die — *Dyndyma.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 44. t. 311. Fig. C.

Alis luteo-fuscescentibus; *anticis* macula triangulari furva, linea recta flavissima.

481. *Viridata*, der — *Grünling.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 44. t. 311. Fig. D.

Alis *anticis* virescentibus, punctis binis ferrugineis; *posticis* purpurascentibus, margine flavo.

482. *Oo*, das — *doppelte* O.

Cramer Pap. exot. IV. p. 45. t. 311. Fig. E. *Foemina*; F. *Mas.*

Alis fusco-flavoque variegatis; *anticis* duplici o argenteo.

483. *Glauca*, der *surinamische Blauling.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 45. t. 311. Fig. G.

Alis *anticis* glaucis, fusco-striatis.

484. *Nutrix*, die *surinamische Nutrix.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 46. t. 312. Fig. B.

Alis fusco-flavo-aurantiaco-nigroque variegatis.

485. *Amoenita*, die *surinamische Amönita.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 47. t. 312. Fig. D.

Alis fuscis, nigro-aureoque punctatis.

486. *Hylea*, die — *Hylea.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. E.

Alis testaceis rubro-aurantiacoque variegatis.

487. *Marcellina*, die — *Marzellina.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. F.

Alis nigricantibus, fuſco - ſtriatis; *poſticis* dentatis; omnibus ciliatis.

488. *Diſſimilis*, das *unähnliche Weibchen.*

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte I St. p. 57. no. 12. t. 4. f. 1. *Larva;* f. 3. *Foemina;* f. 4. *Mas.*

N. ſpirilinguis, criſtata, alis deflexis crenatis, ſuperioribus hepaticis macula conica linea terminali bidentata.

IV. SPANNMESSER: Phal. *Geometrae.*

1. mit *kammförmigen Fühlhörnern.* *)
 a. etwas *eckigen*,
 b. *runden* Hinterflügeln.
2. mit *borſtenförmigen Fühlhörnern.*
 a. *eckigen*,
 b. *runden Flügeln.*

I. Mit *kammförmigen Fühlhörnern und eckigen Flügeln.*

*) *Linn.* Geometrae
1. *Pectinatae*
 a. alis *poſticis* ſubangulosis,
 b. — *rotundatis.*
2. *Seticornes*
 a. alis *angulatis*,
 b. — *rotundatis.*

Der *erſten* Klaſſe der Spanner hat *Linné* lauter lateiniſche Namen gegeben, die ſich in *aria*, der *zwoten* aber, die ſich in *ata* endigen. S. *Wien. Schmett.* p. 95. Anm.

194. *Lactearia*, der *Milchflügel.*

Müllers L. N. S. 5 Th. I B. p. 704. no. 194. der *Milchflügel.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 978. no. 23. Ph. *Lactearia*, die *milchweisse Spannmesserm otte.*

Wien. Schmett. p. 98. *Raupen mit 10 Füßen;* B. *Schoßraupen*, Larvae *Stoloniformes; weißstriemige Spanner*, Ph. G. *Albolineatae.*

No. 9. *Unbekannte Raupe: weisser schneeweißgestrichter Spanner*, Ph. G. *Lactearia.*

— — p. 99. Anm. Vielleicht eine *Abänderung* der *Striataria* L. no. 197.

Fischers N. G. von Livl. p. 154. no. 369. Ph. *Lactearia*, der *Milchflügel.*

Schriften der Dronth. Gesellsch. IV. p. 283. no. 41. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 194. Ph. G. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 155. no. 56. Phal. setic. spiril. *tota nivea.*

Act. Upsal. 1736. p. 34. no. 39.

Papilio alis planis *albis.*

Scop. Entom. carn. p. 215. no. 529. Ph. *Lactearia.*

Long. lin. 5. lat. $3\frac{1}{2}$.

Alba; antennis *pectinatis;* pectinibus villosis, apice setaceis; alis *posticis* angulatis, omnibus strigae transversae vestigio.

Fabric. S. E. p. 619. no. 1. *Phalaena Lactearia.* Nom. *Linn.*

In Europae *Nemoribus.*

Tenerrima et fere *pellucida.* *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 417. Ph. *Lactearia.* Nom. *Linn.*

*) Wenn sie sich abgeflattert hat.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1431. Ph. *Lactaria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 131. no. 44.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus rotundatis *niveis*, corpore flavo.

La *Laiteuſe.*

Long. 3 lign. *Larg.* 7 lign.

195. *Vernaria*, der *Frühlingsſpanner.* *)

Müller l. c. p. 704. no. 195. der *Frühlingsvogel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 749. Ph. *Vernaria*, der *Frühlingsmeſſer.*

Bey uns etwas *ſelten.*

— Magaz. der Entomol. II. p. 34. Ph. *Vernaria.*

1) Die Raupen freſſen *Eichen*, *Haſelſtauden*- auch *Erlenblätter.*

2) Da ſolche, und die *Röſelſche* I. Ph. 3. t. 13. *zwo weiſſe* Queerlinien hat, ſo iſt es eher die Vernaria, als die Viridata L. no. 230. wobey *Füeßl.* vielleicht dieſe Röſelſche unrichtig angeführt hat (Chorh. *Meyer*).

Berlin. Mag. IV. p. 506. no. 4. Ph. *Vernaria*, das *weiſſe Band.*

Blaſsgrün, mit zwo weiſſen Queerſtreifen, durch

*) Bey dieſem Spanner ſind die Schriftſteller ſehr uneins: *Fabric.* hält ihn für *Röſels* I. N. V. 3 Kl. t. 13. *Füeßl.* hat dieſe *Röſelſche* bey der Viridata L. no. 230. angeführt; *Müller* in ſ. Faun. Fr. hat eine neue Art *Strigata* no. 454 beſchrieben, und dabey dieſe Röſelſche zitirt. *Kleem.* im Raupenkal. p. 37. no. 97. alles zur Viridata gezogen. Wie iſt hieraus zu kommen? Die *Röſelſche* iſt weder Vernaria noch Viridata L. ſondern *Mülleri* Strigata; *Scop.* Fimbrialis no. 535. der *Wiener* Bupleuraria p. 97. n. 4. und *Hufnagels* Fimbriata ſ. *Berl. Mag.* IV. p. 604. no. 64. ſ. *Naturf.* XI. p. 80. no. 64.

durch die *Ober-* und einem durch die *Unter-flügel.*

— — p. 620. B. das *Männchen* von *dieser Phaläne* — sagt Hr. *Hufnagel.* Allein dies vermeynte *Männchen* der Vernaria ist G. *Putataria* L. no. 196.

Naturf. XI. p. 65. no. 4. Ph. *Vernaria.*

Knochs Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 1. t. 1. f. 1. Ph. G. *Sesquistriataria* (Mas).

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 3. *Waldrebenspannerraupe* (Clematis Vitalbae); *Waldrebenspanner,* Ph. *Vernaria.*

Schriften der Dronth. Ges. IV. p. 284. no. 42. Phal. *Vernaria.*

Schaeff. Icon. t. 122. f. 5.

Réaum. Inf. Tom. II. t. 29. f. 14-19.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1432. Ph. *Vernaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 620. no. 3. *Phalaena Vernaria.* *)

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 362. no. 3. t. 6. f. 8. *Phalene à antennes demi-barbues.*

Phalene à antennes barbues à extrémité lisse et à trompe, à ailes horizontales d'un verd celadon pâle, à deux lignes transverses ondées blanches, et dont les inférieures font un angle.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 263. no. 3. t. 6. f. 8. das *halbbärtige Fühlhorn.*

*) Margo alarum fusco-punctatus.

Larva ferruginea, albo-nigroque varia, capite dentato.

Dies alles aber gehet auf die *Röselsche* Phaläne I. N. V. 3. t. 13, weil man voraussetzte, diese sey mit Vernaria einerley.

Die *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, die am Ende glatt ſind; einem Saugrüſſel, horizontalen blaſsſeladongrünen Flügeln, mit zwo gewäſſerten weiſſen Queerſtreifen und Unterflügeln, die einen Winkel machen.*)

Réaum. Inſ. II. ed. 4. p. 367. 368. t. 29. f. 14-19.

196. *Putataria*, der *Weiſsſtrich.*

Müller l. c. p. 704. no. 196. der *Weiſsſtrich.*

Berl. Mag. IV. p. 620. B. das vermeynte Männchen der Vernaria.

Naturf. XI. p. 65. no. 4. der kleine Vogel in *Hufnagels* Anm. B. iſt nicht das Männchen der Vernaria, ſondern die Ph. *Putataria* L. (von *Kottemb.*)

Wien. Schmett. p. 98. B. no. 8.

Unbek. Raupe: perlweiſslicher weiſsſtriemiger Spanner, Ph. *Putataria.***)

Fabric. S. E. p. 620. no. 4. *Phalaena putataria* — antennis apice ſetaceis.

In Europae *Nemoribus.*

Clerk Icon. t. 3. f. 9. Ph. *putata.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 416. Ph. *putataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1436. Ph. *putataria.* Nom. *Linn.*

197. *Stri-*

*) Ich nehme hierdurch die daſelbſt angeführten Zitata: als *Röſel* I. Ph. 3. t. 13, und *Müllers* Strigata F. Fr. n. 454. zurück.

**) Im Anhange des Linn. Syſt. ed. 12. iſt für die Putataria *Schaeff.* Icon. t. 67. f. 10. 11. angeführt. Gewiſs von einem Schüler des *Linné*, der ſich durch die Aehnlichkeit des Namens verleiten laſſen. Denn die Schäfferſche Phaläne iſt Ph. B. *Potatoria* L. (Foem.), no. 23.

197. *Striataria*, der *Gelbſtrich.*

Müller l. c. p. 704. no. 197. der *Gelbſtrich.*

Wien. Schmett. p. 99. Anm. Vielleicht nur eine Abänderung der *Lactearia* L. no. 194.

Berl. Mag. IV. p. 514. no. 17. Ph. *Strataria*, der *Schneevogel.*

Der Grund gelblich weiſs, mit 2 braunen breiten irregulären Queerbinden; die Felder dazwiſchen braunpunktirt.

— p. 622. G. Viel ähnliches mit Hufnagels *Atomaria* no. 12.

Naturf. XI. p. 68. no. 17. Ph. *Stratario.*

Clerk Icon. t. 55. f. 4.

Fabric. S. E. p. 620. no. 5. *Phalaena ſtriataria.* Nom. *Linn.*

In Europae *Vmbroſis.*

Alae omnes albidae, ſtrigis *anteriorum* duabus; *poſteriorum* unica, flaveſcentibus.

198. *Vibicaria*, der *Purpurſtrich.*

Müller l. c. p. 704. no. 198. der *Purpurſtrich.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 750. Ph. *Vibicaria.*

Bey uns *ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 612. no. 82. Ph. *Rubro-faſciata*, die *rothe Binde.*

Strohgelb, mit einer breiten *roſinrothen* Binde durch alle vier Flügel.

Naturf. XI. p. 84. no. 82. Rubro-faſciata — eigentlich *faſciaria*, weil ſie unter die *Pectinicornes* gehört, iſt L. *Vibicaria* (v. *Rottemb.*).

Wien. Schmett. p. 117 P. *Fadenraupen*, Larvae *Filiformes*; *bogenſtriemigte Spanner*, Ph. G. *Arcuato-ſtriatae.*

No. 2. *Schmelenſpannerraupe* (Airae montanae), *Schmelenſpanner.* Ph. *Vibicaria.*

Scop. Entom. carn. p. 226. no. 562. Ph. *Cruentata.*
Long. lin. 6. *Lat.* 4½.
Alae ſupra oſſeae, faſcia communi fimbriaque ruſſcis.

Schaeff. Icon. t. 12. f. 5.

Fabric. S. E. p. 623. no. 19. *Phalaena Vibicaria.*
Pectinicornis; alis *rotundatis*, flaveſcentibus; ſtrigis tribus purpureis; anteriore obſoletiore.
In Europae *Nemoribus.*
Convenit *Linn.* deſcriptio, at alae *haud angulatae.*

Geoffr. Inſ. II. p. 132. no. 48.
Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus luteis; faſcia tranſverſa rubra.
La *Bande rouge.*
Long. 6 lign. *Larg.* 13 lign.

Cramer Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. D. Ph. G. *Vibicaria.*

199. *Thymiaria*, der *Wellenſtrich.*

Müller l. c. p. 705. no. 199. der *Wellenſtrich.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 751. Ph. *Thymiaria.*
Bey uns *ſelten.*

Friſch Inſ. X. p. 20. 3 Pl. t. 17. no. 17.
Vom braunen *Spannmeſſer* mit den zwey Kopf- und Rückenſpitzen, und ſeinem *grünlichen Papilion.*

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 5. *Thymianſpannerraupe* (Thymi vulgaris); *Thymianſpanner*, Ph. *Thymiaria.*
Jährlich die *Raupe* immer auf *Schlehen* (Prunus ſpinoſa).

Albin Inſ. t. 48. f. 81. *Raupe:* auf dem *Weißdorn* (Crataegus Oxyac.).

200. *Pun-*

200. *Punctaria*, der *Punktſtrich.*

Müller l. c. p. 705. no. 200. der *Punktſtrich.*

Berl. Mag. IV. p. 514. no. 18. Ph. *Punctaria*, der *Rothſtreif.*

Blaſsgelb, mit einem rothen Queerſtreif und vielen rothen Punkten.

— — p. 622. G. Im Frühjahr die zeitigſte unter allen; ſchon an den Baumſtämmen, wenn der Schnee noch nicht weggeſchmolzen iſt.

Wien. Schmett. p. 103. Anm. Ph. *Punctaria.*

— — p. 107. H. *Stricheraupen*, Larvae *Strigillatae*; *wechſelnde Spanner*, Ph. G. *Alternantes.*

1) mit einem Queerſtriche.

No. 2. *Eichenbuſchſpannerraupe* (Quercus Roboris); *Eichenbuſchſpanner*, Ph. *Punctaria.*

Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 13. t. 1. f. 4. Ph. *Punct.* Foemina; f. 5. *Larva;* f. 6. *Pupa.*

Réaum. Inſ. II. t. 29. f. 1-4. *)

Chenille arpenteuſe verte du chêne. Ph. *Punctaria.*

Fabric. S. E. p. 620. no. 6. *Phalaena punctaria.*

In Europa; *Anglia.*

201. *Amataria*, der *Favoritſpanner.*

Müller l. c. p. 705. no. 201. der *Liebling.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 752. Ph. *Amataria*, der *Lieblingsmeſſer.*

Bey uns etwas ſelten auf *Birken.*

*) Dieſes Zitatum hat *Linne* zu *Amataria* n. 201, und *Degeer* Tom. II. P. I p. 360 no. 2. bey G. *Pendularia* L. *Faun.* Suec. ed. 2. no. 1244. geſetzt; die Wiener Entomologen aber p. 103. Anm. ſagen: es gehöre zu *Punctaria* L.

Berl. Mag. IV. p. 514. no. 19. Ph. *Vibicaria*, das *rothe Band.*

Schmuziggelb, mit einer ſchmalen rothen Binde durch alle vier Flügel; die Hinterflügel mit einer kleinen Spitze.

Naturf. XI. p. 68. no. 19. Ph. *Vibicaria* iſt *Linn. Amataria.* (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen*, Larvae *Ramiformes.*

Chenilles Arpenteuſes en bâton raboteux.

Zackenflüglichte Spanner; Ph. G. *Angulatae.*

No. 9. *Ampferſpannerraupe* (Rumicis acuti et acetoſae); *Ampferſpanner*, Ph. G. *Amataria.*

Fabric. S. E. p. 621. no. 7. *Phalaena amataria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 414. Ph. *Amataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1433. Ph. *Amataria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 128. no. 37.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis patentibus angulatis cinereis, faſcia duplici transverſa, punctoque obſcuriore, atomis cineraſcentibus.

L' *Anguleuſe.*

Long. 4½ lign.

Scop. Entom. carn. p. 214. no. 528. Ph. *Amataria.*

Long. lin. 7. *Lat.* 4.

Per alas expanſas omnes utrinque ab apice primoris unius ad apicem alterius ſociae decurrunt ſtrigae duae obſcuriores; quarum poſtica tenuior et repanda extremitates ſuas adnectit apicibus alarum anticarum, ſeu extremitatibus ſtrigae ſuperioris.

Ama-

Amataria *Linn.* ſolo colore a noſtra differt; illa enim *albida* apicibus alarum margine rufis; noſtra vero *Zinziberis* colore, ſtriga ſuperiore ferruginea, altera fuſca.

202. *Falcataria*, der *Sichelflügel.*

Müller l. c. p. 705. no. 202. der *Sichelflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 753. Ph. *Falcataria*, der *Sichelmeſſer.*

Kleem. Beytr. I. p. 177. t. 21. die kleine zimmetbraune mit einem hochfleiſchfarbenen Flecken gezierte, und mit einer beſondern Rücken- auch Schwanzſpitze verſehene *Raupe*, ohne Nachſchieberfüſse. (Seltſame *Puppe* f. 4. 5.)

— Raupenkal. p. 94. no. 273. Ph. *Falcataria*, der *Sichelflügel.*

Berl. Mag. IV. p. 514. no. 20. Ph. *Falcataria*, der *Kukuk.*

Okerbraun, mit vielen blaſsgrünen ausgekappten Queerſtreifen; die Spitzen der Oberflügel ſichelförmig.

— — p. 623. I. die Raupe eben ſo beſchrieben, als die *Kühnſche.*

Gleditſch Forſtw. I. p. 556. no. 9. Ph. *Falcataria*, der *Kukuk.*

Gladbachs Schmetterl. p. 53. t. 23. f. 5. 6. der *S Vogel.*

Wien. Schmett. p. 64. T. *Spitzraupen*, Larvae *Cuſpidatae.*

Chenilles à queue ſimple. Réaum.

Spannerförmige Spinner; Ph. *Bombyces Geometriformes.*

No. 2. *Weißbirkenſpinnerraupe* (Betulae albae); *Weißbirkenſpinner*, Ph. *Falcula*, G. *Falcataria* L.

Naturf.

Naturf. IX. p. 96. t. 1. f. 6. von der ſeltenen Puppe einer Birkenraupe (*Mas*). (D. *Kühn.*)

Schaeff. Icon. t. 64. f. 1. 2.

Fabric. S. E. p. 621. n. 8. *Phalaena Falcataria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 415. Ph. *Falcataria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 124. no. 1434. Ph. *Falcataria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. I. Mém. 10. p. 333. t. 24. f. 1-7. (*Foemina.*)

Chenille à quatorze jambes, verte, à ſix tubercules coniques et charnus ſur le dos, dont le deſſus du corps eſt d'un brun tirant ſur le pourpre, et dont le poſtérieur, qui eſt dépourvu de jambes, ſe termine en pointe conique — ſur l'*Aune.*

— — p. 695. t. 24. f. 7.

Phalene à antennes à barbes et à trompe, dont les ailes ſupérieures, qui ſont brunes et traverſées d'une raye obſcure, ſont courbées en crochet vers l'angle extérieur.

— Tom. II. P. I. p. 353. no. 7. t. 6. f. 1. Phal. *Faucille.* (*Mas.*)

Phalene à antennes barbues à trompe, à ailes horizontales d'un blancheâtre feuille-morte rayées de brun, avec une ligne oblique et une tache brune, et dont l'angle extérieur eſt courbé en crochet.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 91. t. 24. f. 1-7.

Die grüne vierzehnfüſsige *Erlenraupe*, mit ſechs kegelförmigen, fleiſchichten Rückenbuckeln, die obenauf braun und purpurſarbig iſt, am Schwanze aber keine Füſse, ſondern nur eine koniſche Spitze hat.

Degeer

Degeer Ueberſ. 4 Qu. p. 118. t. 24. f. 7.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern und Saugrüſſel, deſſen Oberflügel braun ſind, eine dunkle Queerſtreife haben, und am Auſsenwinkel hakenförmig gebogen ſind.

— — II Th. I B. p. 257. no. 7. t. 6. f. 1. die *Sichelphalene.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und horizontalen, weiſslich fahlbraunen, braungeſtreiften Flügeln, mit einer ſchrägen Linie und braunen Flecken, deren Auſsenwinkel hakenförmig gekrümmt iſt.

203. *Sambucaria*, der *Spitzſchwanz.*

Müller l. c. p. 705. no. 203 die *Schwanzecke.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 754. Ph. *Sambucaria*, der *Schwanzmeſſer.*

Bey uns etwas *ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 512. no. 14. Ph. *Sambucaria*, der *Spitzſchwanz.*

Blaſsgelb, mit kleinen halbolivenfarbenen Stralen und zwo Queerſtreifen durch die Ober- und einem durch die Unterflügel.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 17. no. 26. Ph. *Sambucaria*, der *Spitzſchwanz.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 25. t. 6. die groſſe, braune und dunkelgeſtreifte *Spannenraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 949. no. 1. Ph. *Sambucaria*, die *gelbliche Fliedermotte.*

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen.*

No. 1. *Holunderſpannerraupe* (Sambuci nigrae); *Holunderſpanner*, Ph. *Sambucaria.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 16. der *Holunderſpanner.*

Ono-

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 413. Ph. *Sambucaria*, der *Holdervogel.*

Liſt. Goed. p. 26. no. 10. f. 10. et p. 33. Eruca *Extenſor*, ſeu *Grallator.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 177. no. 1.

Phalaena media ochroleucos, alis ampliſſimis; *exterioribus* duabus lineis transverſis e fulvo virentibus; *interioribus* una diviſis.

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 203. Ph. *Sambucaria.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 63. f. 8.

Fabric. S. E. p. 621. no. 10. *Phalaena Sambucaria.* Nom. *Linn.*

Larva ſubnodoſa, pulla, fuſco-lineata.

Pupa fuſiformis, brunnea, fuſco-punctata.

Ova coſtata.

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 3. t. 1.

De *Vlier-Vlinder.*

Geoffr. Inſ. II. p. 138. no. 58.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus *ſulphureis*, linea duplici transverſa obſcuriore, inferioribus caudatis.

La *Souffrée à queue.*

Long. 10. lign.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 125. no 1435. Ph. *Sambucaria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 447. no. 3. *Phalene ſouffrée à queue.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues d'un jaune paille avec deux lignes transverſes d'un jaune foncé, dont les inférieures ſont angulaires à deux points bruns.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 327. no. 3. die *ſchwefelgelbe Schwanzphaläne.*

Die

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und ſtrohgelben breiten Flügeln, mit zwo dunkelgelben Queerlinien, deren Unterflügel eckigt ſind, und zween braune Punkte haben.

204. *Lacertinaria*, der *Eidexſchwanz.*

Müller l. c. p. 706. no. 204. der *Eidexſchwanz.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 755. Ph. *Lacertinaria*, der *Eidexmeſſer.*

Auf Birken nicht ſelten.

Berl. Mag. IV. p. 510. no. 9. Ph. *Lacertinaria*, die *Zahnmotte.*

Schmuziggelb; die Oberflügel mit zwo braunen Queerſtreifen und ausgezackt.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 30. Ph. *Lacertinaria*, die *Zahnmotte.*

Wien. Schmett. p. 64. T. *ſpannerförmige Spinner.* No. 5. *Hangelbirkenſpinnerraupe* (Betulae albae *Virgis pendulis*); *Hangelbirkenſpinner*, Ph. Bomb. *Lacertula*, G. *Lacertinaria* L.

Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 10. Ph. *Lacertinaria*, der *Eidexſchwanz.*

Bekm. Epit. S. L. p. 166. no. 204. Ph. *Lacertinaria.*

Schaeff. Icon. t. 66. f. 2. 3.

Fabric. S. E. p. 622. no. 11. *Phalaena Lacertinaria.*

Pectinicornis; alis eroſis, luteſcentibus, ſtrigis duabus fuſcis.

Larva nuda, rubra, dorſo angulato.

Mülleri Faun. Fridr. p. 47. no. 418. Ph. *Lacertinaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1438. Ph. *Lacertinaria.* Nom. *Linn.*

De-

Degeer Inſ. I. Mém. 10. t. 10. f. 5-8.

Chenille à quatorze jambes, brune avec des nuances et des taches obſcures, dont le poſtérieur, qui manque de jambes, ſe termine en pointe ſimple, et qui vit ſur le Bouleau.

— — p. 695. t. 10. f. 7. 8.

Phalene à antennes à barbes et à trompe; d'un brun clair jaunâtre, dont les ailes ſupérieures, qui ont deux lignes transverſales brunes, ſont courbées en crochet vers l'angle extérieur.

— II. Part. I. p. 335. no. 3. t. 5. f. 6. la *Chenille* — Phalene *Lacertine.*

Phalene à antennes barbues, à trompe; à corcelet uni; à ailes découpées voutées d'un jaune griſeatre avec deux lignes transverſes brunes et un point brun obſcur.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 94. t. 10. f. 5-8.

Die braune vierzehnfüſsige Birkenraupe, mit ſchwarzen Flecken und Schattirungen, die keine Hinterfüſse, ſondern nur eine einfache Schwanzſpitze hat.

— — 4 Qu. p. 117. t. 10. f. 7. 8.

Ein brauner hellgelblicher *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, und einem Saugrüſſel, deſſen Oberflügel zwo braune Queerlinien haben, und gegen den äuſſerlichen Winkel wie Häkchen gebogen ſind.

— II Th. I B. p. 242. no. 3. die *Eidexenmotte.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, glattem Bruſtſchilde, und gelbgraulichen gezackten, gewölbten Flügeln, mit zwo braunen Queerlinien, und einem dunkelbraunen Punkt.

205. *Alniaria*, der *Erlenſpanner.*

Müller l. c. p. 706. no. 205. der *Nageflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 756. Ph. *Alniaria*, der *Franſemeſſer.*

Bey uns *ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 27. Ph. *Alniaria*, das *Brett.*

Okergelb, mit braunen Flecken geſprenkelt, die Flügel ſtark ausgezackt.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 102. no. 290. p. 111. no. 313. Ph. *Alniaria*, der *Nageflügel.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 1. t. 1. die ſchlanke ſchwarzbraune *Spannenraupe.*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 10. II. p. 751. no. 68. Ph. *Alniaria;* das *Brett;* das *Brettſpiel.*

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen.* no. 2. *Erlenſpannerraupe* (Betulae Alni); *Erlenſpanner*, Ph. *Alniaria.*

Fiſchers N. G. von Livl. p. 154. no. 370. Ph. *Alniaria*, der *Nageflügel.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 148. no. 25. Phalena *de l' Aune.*

Fabr. S. E. p. 622. no. 12. *Phalaena Alniaria.* Nom. *Linn.*

Larva griſeo-fuſca, luteo-punctata; verrucis dorſalibus tribus remotis; caudalibus quatuor approximatis.

Pupa coeruleſcens, poſtice attenuata.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 419. Ph. *Alniaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 125. no. 1439. Ph. *Alniaria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. p. 349. Mém. XI. t. 10. f. 9-14.

Grande *Chenille arpenteuſe* en baton à dix jambes, dont la tête eſt égale et unie, et qui mange les feuilles du Bouleau.

Degeer Inſ. Tom. I. p. 696. t. 10. f. 13. 14.

Phalene à antennes à barbes, ſans trompe; à corcelet jaune-citron, et à ailes découpées d'un jaune d'ocre clair.

— Tom. II. Part. I. p. 305. no. 4.

Phalene *branche ſeche.*

Phalene à antennes barbues ſans trompe; à ailes presque horizontales découpées d'un jaune d'ocre clair avec deux lignes obliques brunes, à corcelet jaune-citron.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 11te Abh. p. 102. t. 10. f. 9-14.

Der groſse zehnfüſsige *Stockſpanner* auf den Birken, mit einigen Hökern und ganz glattem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 118. t. 10. f. 13-14.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, einem zitrongelben Halskragen, und hellokergelben ausgezackten Flügeln.

— II Th. I B. no. 4. der *dürre Aſt.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, mit hellokergelben gezähnelten, mit zwo braunen Queerſtreifen verſehenen, beynahe horizontalſtehenden Flügeln, und einem zitrongelben Halskragen.

206. *Syringaria*, der *Fliedermeſſer.*

Müller l. c. p. 706. no. 206. der *Fliedermeſſer.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 757. Ph. *Syringaria*, der *Gemſemeſſer.*

Auf

Auf der Lonicera und dem Ligustro *nicht selten.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 36. t. 10. die dicke beſonders ſchöne Spannenraupe, mit zwey den Gemſenhörnern ähnlichen Haken, und andern auf dem Rücken ſtehenden Zapfen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 36. no. 94. Ph. *Syringaria*, der *Fliedermeſſer.*

Wien. Schmett. p. 103. F. *Aeſteraupen.*

No. 8. *Fliederſpannerraupe* (Syringae vulgaris); *Fliederſpanner*, Ph. *Syringaria.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 17. t. 9. f. 9. 10. 11. der *Fliedermeſſer.*

Onomatol. hiſt. nat. P. 6. p. 413. Ph. *Syringaria*, der *Syringenvogel.*

Fabric. S. E. p. 622. no. 13. *Phalaena Syringaria.* Nom. *Linn.*

Larva glauca luteoque varia, dorſo aculeis ſex, poſticis longioribus recurvis.

Pupa folliculata, farcta, antice griſea, poſtice brunnea.

Geoffr. Inſ. II. p. 125. no. 32.

Phalaena pectinicornis, alis margine ſinuatis, fulvo-nigro-fuſco-roſeoque marmoratis, ſingulis ſubtus puncto nigro, ſuperioribus extremo dilatato, recurvis.

La *Phalene jaſpée.*

Long. 9. lign.

207. *Dolabraria*, der *Hobelſpanner.*

Müller l. c. p. 706. no. 207. der *Eichenmeſſer.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 758. Phal. *Dolabraria.*

Bey uns *ſehr ſelten* auf *Birken.*

Berl. Mag. IV. p. 516. no. 22. Ph. *Vſtulataria*, der *Brandvogel.*

Weiſslichgelb, mit vielen gelbbraunen Strichlein; die Spitzen der Oberflügel wie ausgebrannt.

Naturforſch. XI. p. 69. no. 22. Ph. *Vſtulataria* iſt *Dolabraria* L. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 104. F. *Aeſteraupen.*

No. 16. *Wintereichenſpannerraupe* (Quercus Roboris); *Wintereichenſpanner*, Phal. *Dolabraria.*

Sulzers Geſch. p. 161. t. 22. f. 9. Ph. *Dolabraria*, der *Birkenmeſſer.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 17. *Phalaena Dolabraria.*

Pectinicornis, alis angulatis, flavis, ſtrigis ferrugineis; angulo ani violaceo.

208. *Prunaria*, der *braune Mondſpanner.*

Müller l. c. p. 707. no. 208. der *Schlehedornmeſſer.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 759. Ph. *Prunaria.*

In den Wäldern *nicht ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 26. Ph. *Fulvularia*, der *geſtreifte Tiger.*

Oraniengelb, mit unzählichen blaſsgrauen Strichlein beſäet.

Naturf. XI. p. 70. no. 26. Ph. *Fulvularia* iſt L. *Prunaria* (v. *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtw. II. p. 753. no. 73. Ph. *Fulvularia*, der *geſtreifte Tiger.*

— — p. 821. no. 15. Phal. *Prunaria*, die *Schlehedornmotte.*

Wien. Schmett. p. 104. F. *Aeſteraupen.*

No. 17. *Pflaumenſpannerraupe* (Pruni domeſticae); *Pflaumenſpanner*, Ph. *Prunaria*, et p. 105. *Anm.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 152. wo gezeigt wird, daſs es die *Prunaria* L. ſey.

Schaeff. Icon. t. 17. f. 2. 3. *Männchen* und *Weibchen.*

Scop. Entom. carn. p. 216. no. 533. Ph. *Corticalis.* *Long.* lin. 10½. *Lat.* 6½.

Alae oſſeae; lineolis transverſis parvis numeroſis ferrugineis; linea craſſiore utrinque pariter ferruginea, in ſingulis alis.

— Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 126. Ph. *Corticalis.* Varietas Hungarica flava, lineolis fuſcis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 421. Ph. *Prunaria,* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1440. Phal. *Prunaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 624. no. 21. *Phalaena Prunaria.* Nom. *Linn.*

Larva ferruginea, dorſo antice poſticeque ſpinis duabus.

209. *Pennaria*, der *Endpunkt.*

Müller l. c. p. 707. no. 209. der *Rothflügel.*

Wien. Schmett. p. 103. E. *Zweigſchoßraupen;* Larvae *Surculiformes*; *geradſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Rectofaſciatae.*

No. 12. *Hagebüchenſpannerraupe* (Carpini Betuli); *Hagebüchenſpanner*, Ph. *Pennaria.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 420. Phal. *Pennaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1441. Phal. *Pennaria.* Nom. *Linn.*

210. *Piniaria*, der *Fichtenſpanner.* (*Mas.*)

Müller l. c. p. 707. no. 210. die *Bruchlinie.*

*) *Nicht abgebildet.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 760. Phal. *Piniaria.*
In den *Wäldern* nicht ſelten.

Berl. Mag. IV. p. 506. no. 2. Phal. *Piniaria*, der *Wildfang.*
Braun, ſo an manchen Orten ins Gelbe fällt; das *Weibchen* fällt mehr ins Gelbbraune, als das Männchen.

— — p. 620. A. Beſtätigung, daſs die gelbbraunen mit ſchwärzlichem Rande die *Weibchen* ſind.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 502. no. 4. Ph. *Piniaria*, der *Wildfang.*

Wien. Schmett. p. 106. G. *Streiferaupen; Larvae ſtriatae; ſtaubigte Sqanner*, Ph. G. *Pulverulentae.*

3) Mit nur angefangenen Queerſtrichen, oder zuſammengefloſſenen Punkten am Auſsenrande.

No. 7. *Föhrenſpannerraupe* (Pini Sylveſtris); *Föhrenſpanner*, Ph. *Piniaria.* *)

Gladbachs Schmett. p. 36. t. 17. f. 1-6. der *Fichtenſpanner* mit ſeiner Raupe und Puppe. **)

Naturf. 15 St. p. 67. Beſchr. der *Raupe* (von *Scheven*). Die Larve viel ähnliches mit der Larve der G. *brumatae.*

Alton. Merkur no. 110. bey Dresden an den Tannenwäldern groſsen Schaden gethan. Der Name

*) Dieſe *Spannerart* trägt die Flügel in der Ruhe einigermaſsen erhaben, und ſie ſind *mehr auf der Unter-* als Oberſeite mit *Punkten beſtäubt.* Bey beyden Geſchlechtern iſt die Oberſeite gar zu verſchieden. Daher hat *Linné* bey der Beſchreibung ſein Augenmerk vornämlich auf die *Unterſeite* gerichtet.

**) Ich zweifle faſt nicht, daſs nicht dieſer die G. *Piniaria* L. ſey' da das Weibchen davon auch ganz okerbraun iſt.

me *Processionsraupe* falsch, weil diese auf den *Eichen* wohnen.

Fabric. S. E. p. 624. no. 23. *Phalaena Piniaria.*

Pectinicornis, alis fuscis, flavo-maculatis, subtus nebulosis, fasciis duabus fuscis.

Larva viridis, supra albo—subtus flavo-striata.

Pupa folliculata, brunnea.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 30. Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 817. Phal. pectinicornis, spirilinguis, alis planiusculis rotundatis, supra fuscis, antrorsum albis.

Clerk Icon. t. 1. f. 10. Ph. *Piniaria.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1233. p. 325. Phalaena *Piniaria.*

Pectinicornis, alis omnibus fuscis disco bimaculato albo; subtus nebuloso-subfasciatis.

Sepp Nederl. Ins. VI. p. 17. t. 4. f. 8. 9. das schwarzbraungelbliche *Männchen;* f. 10. das okergelbe *Weibchen.*

De *Vlinder Anomalus.*

Schaeff. Icon. t. 159. f. 1. 2. (Mas, aber verstäubt).

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 351. no. 5. t. 5. f. 20. *Phalene panachée à raye blanche.*

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales brunes ou *roussâtres* (Foemina); dont les inférieures sont picquées de points olives en dessous avec une raye longitudinale blanche.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 255. no. 5. t. 5. f. 20. die *weißgestreifte Phaläne mit federbuschartigen Fühlhörnern.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und horizontalen braunen, oder *rostfarbigen* (*Weibchen*) Flügeln, davon die untern auf der Unterseite eine längst herunter-

terlaufende weiſſe Streiſe haben, und mit olivenfarbigen Punkten geſprenkelt ſind.

β. *Foemina.*

Linn. Faun. Suec. ed. 1. no. 818.

Phalaena pectinicornis, alis planiuſculis rotundatis nebuloſis *luteſcentibus*, inferioribus linea longitudinali alba.

— — ed. 2. no. 1234. p. 325. Phal. *Tiliaria.*

Pectinicornis; alis *luteſcentibus* ſubtus nebuloſo-faſciatis, linea alba interrupta.

Clerk Icon. t. 4. f. 11. Phal. *Tiliaria.*

Réaum. Inſ. II. t. 28. f. 6.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 143. no. 10. Nom. *Linn.* ex F. Su. ed. 1. no. 818.

Antennes en forme *de lance*, dentelées (*Lanceolatae*).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 390. no. 8. Ph. *Tiliaria*, der *Lindenmeſſer.*

II. *Mit kammförmigen Fühlhörnern und runden Flügeln.*

211. *Elinguaria*, der *gelbbandirte Birnſpanner.*

Müller l. c. p. 708. no. 211. der *Kohlſauger.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 761. Ph. *Elinguaria.*

Bey uns *ſelten.*

— Magaz. der Entom. II. p. 35. Phal. *Elinguaria.*

1) Der *Körper* dicker, als bey Spannern gewöhnlich.

2) Die *Raupen* auf Schlehendornen.

3) Verwandeln ſich unter einem veſten Dache von Seide mit untergemengter Erde.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 35. t. 9. die groſ-ſe braunlichgraue *Spannenraupe* mit dem platten Kopfe.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 28. Ph. *Elinguaria*, *der Kohlſauger.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 788. no. 14. Ph. *Elinguaria*, die *gelbe Birnmotte*, *mit der breiten dunkelgelben Binde.*

Wien. Schmett. p. 103. E. no. 11. *Geißblattſpannerraupe* (Lonicerae Caprifolii); *Geißblattſpanner*, Ph. *Elinguaria.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 356. Ph. *Elinguaria.*

Fabric. S. E. p. 628. no. 43. *Phalaena Elinguaria.* Nom. *Linn.*

Larva rugoſa, cinereo-brunneoque variegata.

Pupa folliculata, antice fuſca, poſtice brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 422. Ph. *Elinguaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1442. Phal. *Elinguaria.* Nom. *Linn.*

212. *Melanaria*, der *Schwärzling.*

Müller l. c. p. 708. no. 212. der *Schwärzling.*

Wien. Schmett. p. 115. Anm. Vielleicht nur eine *Abänderung* von *Macularia* L. da bey einigen die *Oberflügel*, gleichſam von der Sonne gebleicht, ganz *weißlich* ausſahen.

Fabric. S. E. p. 625. no. 25. *Phalaena Melanaria.* Nom. *Linn.*

Clerk Icon. t. 4. f. 2.

Knochs Beyträge zur Inſektengeſch. I St. p. 11. t. 1. f. 3. Ph. *Melanaria.*

213. *Macularia*, der *Fleckling.* *)

Müller l. c. p. 708. no. 213. der *Fleckling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 39. no. 762. Ph. *Macularia*, der *Fleckling.*

Nicht ſelten *nahe bey Wäldern.*

Kleem. Beytr. I. p. 123. t. 14. f. 5.

Der zur 3 Kl. der N. V. gehörige gelb- und ſchwarzgefleckte *Nachtpapilion.*

Wien. Schmett. p. 115. N. *Zeichenraupen*, Larvae *ſignatae; halbſtreifigte Spanner;* Ph. G. *Subfaſciatae.*

No. 13. *Unbekannte Raupe. Goldgelber ſchwarzfleckigter Spanner*, Ph. G. *Maculata* (*Macularia* L.).

Schaeff. Icon. t. 12. f. 3.

Scop. Ent. carn. p. 224. no. 557. Ph. *Maculata.*

Long. lin. 7. *Lat.* 4¾.

Flava; alis omnibus utrinque fuſco-maculatis.

In *pratis* non rara.

Fabric. S. E. p. 637. no. 88. *Phalaena Maculata.* Nom. *Linn.*

In *Anglia frequens.*

Antennae mihi omnes *ſetaceae.*

Geoffr. Inſ. II. p. 140. no. 61. Phal. ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus flavis, maculis numeroſis fuſcis.

La *Phalene panthere.*

Long. 5 lign. *Larg.* 1 pouce.

214. *Atomaria*, der *Atomſpanner.* **)

Müller l. c. p. 708. no. 214. der *Sprenkling.*

Füeßl.

*) Vielleicht nur eine Abänderung von *Melanaria.*

**) Nicht *Hufnagels* Atomaria: *Berl. Magaz.* IV. p. 510. no. 12. S. *Naturf.* XI. p. 66. no. 12.

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 763. Ph. *Atomaria*, der *Sprenkling*.

Friſch Inſ. XIII. p. 12. no. 6. 1 Pl. t. 5. von dem weiſs- und ſchwarzgewürfelten *Spannenmeſſer* auf den Linden.

Kleem. Beytr. I. p. 285. t. 34. die zur 3ten Kl. der N. V. gehörige groſse bräunlichgraue, mit zarten Linien und Würfelflecken gezierte zehnfüſsige *Spannenraupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 68. no. 194. Phal. *Atomaria*.

Gleditſch Forſtw. I. p. 390. no. 7. Ph. *Atomaria*, der *faule Eſel*.

Wien. Schmett. p. 105. G. *ſtaubigte Spanner*.

2) Mit zuſammenſtoſsenden Queerſtrichen.

No. 5. *Flockenkrautſpannerraupe* (Centaureae Scabioſae); *Flockenkrautſpanner*, Ph. G. *Atomaria*.

(Pennata (et Fem.) Iſoſcelata Scop.)

Cathol. A. p. 583. Ph. *Atomaria*, der *braunſtaubige Spannmeſſer*.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 31. Ph. *Atomaria*. Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 840.

Act. Vpſ. 1736. p. 24. no. 48.

Papilio alis planis pallidis angulatis.

Wilke's Engl. Moths and Butterfl. Book I. Chap. 3. Cl. I. 5. a. i. No. 1. p. 35. t. 70.

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 569. Phal. *Pennata* (Mas).

Long. lin. $6\frac{1}{4}$. *Lat.* $4\frac{2}{3}$.

Antennae amplae, deflexae, ubique pectinatae, pectinibus piloſis; alae pallide ferrugineae; faſciis obſoletis lineolisque plurimis confluentibus nebuloſae.

Scop.

Scop. Ent. carn. p. 225. no. 558. Phal. *Isoscelata.* (*Foemina.*)

Long. lin. 6. lat. $3\frac{1}{2}$.

Alae supra albae, fasciis 4 lineolisque parvis transversis fuscis, subtus flavescentes.

Fabric. S. E. p. 625. no. 26. *Phalaena Atomaria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 426. Ph. *Atomaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1443. Ph. *Atomaria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 133. no. 50.

Phalaena pectinicornis spirilinguis, alis patentibus flavescentibus, fasciis plurimis transversis, nonnullis connexis, atomisque fuscis.

La *Rayure jaune picotée.*

Long. 5 lign.

Bibl. reg. Paris. p. 26. f. 9. 10. 11.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 344. no. 2. t. 5. f. 14.
Phalene jaune à atomes gris.

Phalene à antennes barbues, à trompe; à ailes dentelées horizontales d'un jaune couleur d'orange, toutes parsemées de traits et de petites lignes transverses d'un gris agathe.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 250. no. 2. t. 5. f. 14. die *gelbe Phaläne mit grauen Atomen.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, gezähnelten horizontalen, orangegelben, mit achatgrauen Strichen und kleinen Queerlinien ganz besäeten Flügeln.

Schaeff. Icon. t. 17. f. 3.

215. *Pulveraria*, der *Staubling.* *)

Müller

*) Nicht *Pulveraria* Hufnag. *Berl. Mag.* IV. p. 518. no. 29. denn diese ist *Defoliaria* L. S. *Naturf.* XI. p. 70. no. 29.

Müller l. c. p. 708. no. 215. der *Staubling.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 764. Ph. *Pulveraria*, der *Staubling.*

Bey uns etwas *selten.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 390. no. 9. Ph. *Pulveraria*, die *Sommersprosse.*

Wien. Schmett. p. 105. zu den staubigten Spannern G. 1) mit einem *fast gleichfarbigten wellenrandigten Queerbande.*

Anm. In dieser Art *Defoliaria* L. viele *Abänderungen.* Eine davon mag wohl die *Pulveraria* L. seyn.

Schriften der Dronth. Ges. IV. p. 284. no. 43. Ph. *Pulveraria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 627. no. 39. *Phalaena Pulveraria.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1446. Ph. *Pulveraria.* Nom. *Linn.*

Degeer Ins. Tom. II. Part. I. p. 350. no. 3. t. 5. f. 19. *Phalene grise à bande olive.* *)

— *Uebers.* II Th. I B. p. 254. no. 3. t. 5. f. 19. die graue *Phaläne* mit der olivenfarbigen Binde.

216. *Fasciaria*, der *Bandling.*

Mülleri l. c. p. 708. no. 216. der *Bandling.*

Berl. Mag. IV. p. 520. no. 32. Ph. *Neustriaria*, der *Fichtenmesser.*

Röthlichgrau, mit einer etwas dunklern Binde durch die Oberflügel.

Naturf. XI. p. 71. no. 71. Ph. *Neustriaria* ist Phal. *Fasciaria* L. (v. *Rottemb.*).

Gle-

*) Je ne sçai pas au juste, si la Ph. G. *Pulveraria* L. est de cette espece.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 503. no. 5. Ph. *Neuſtriaria*, der *Fichtenmeſſer*.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 15. t. 3. die blaſsgrüne *Spannenraupe* auf den Pappeln.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 35. no. 88. Ph. *Faſciaria*, der *Bandling*.

Wien. Schmett. p. 96. A. *Halbeulenraupen*, Larvae *Seminoctuales; doppelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Biſtriatae*.

No. 2. *Kienbaumſpannerraupe* (Pini Sylveſtris); *Kienbaumſpanner*, Ph. *Faſciaria.* *)

Scop. Ent. carn. p. 216. no. 534. Ph. *Cervinalis.* **)

Long. lin. 10. *Lat.* 6½.

Alae *cervinae;* anticae faſciis binis, fuſcis, dentatis, lineaque alba undata ſubmarginali; *poſticae* linea nigra marginali.

Fabric. S. E. p. 628. no. 40. *Phalaena Faſciaria.* Nom. *Linn.*

Faſcia lata ferruginea, margine antico et poſtico albo.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1444. Ph. *Faſciaria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 160. no. 100.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis ſubdeflexis, exterioribus caeſio-purpureis, faſciis trans-

*) Anm. Dieſer Spanner ändert an Farben ſehr merklich ab: bald grünlicht, bald matt- und blaſsroth, bald iſabell- kupfer- oder zimmetfarbig. Vielleicht eine Spielart von *Proſapiaria* L. n. 222.

**) Den die Wiener Entomologen doch p. 111. als eine beſondere Art betrachten, und mit dem *Geoffroyſchen* Dent de ſcie für einerley halten: L. *Runzelraupen*, Larvae *Rugoſae; mittelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Mediofaſciatae*. 1) Die Oberflügel braun. No. 1. *Roſenpappelſpannerraupe* (Alceae Roſeae); *Roſenpappelſpanner*, G. *Cervinata* (Cervinalis *Scop.*).

transversis undulatis, interioribus pallidis, omnibus margine serrato.

La *dent de scie.*

Long. 8. lign.

Degeer Inf. II. Part. I. p. 348. no. 2. *Phalene grise à bandes.*

Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales d'un gris cendré avec deux larges bandes brunes découpées transverses bordées de blanc, et une ligne blanche en Ziczac.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 252. no. 2. die *graue Bandphaläne.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und aschgrauen horizontal stehenden Flügeln, mit zwo breiten braunen gezackten, weissgerändelten Queerstreifen, und einer weissen zickzackichten Linie.

217. *Betularia*, der *Birkenspanner.*

Müller l. c. p. 709. no. 217. der *Weissling.*

Füessl. schweiz. Inf. p. 40. no. 765. Ph. *Betularia*, der *Chinese.*

Nicht selten auf *Pappeln*, *Weiden* und *Hanf.*

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 30. Phal. *Betularia*, der *Birkvogel.*

Ganz weiss, mit schwarzen Punkten und Flecken besäet.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 359. no. 3. Ph. *Betularia*, der *Birkenmesser.* p. 550. no. 9. Ph. *Betularia*, der *weisse Birkvogel.*

Kleem. Beytr. I. p. 329. t. 39. f. 1-7. die zur N. V. 3 Kl. gehörige, bald braun, bald grau, oder auch gelblich grüne, grosse, glatte, astförmige

Span-

Spannenraupe mit einem gespaltenen dreyeckigen braungelben Kopfe und zehn Füssen.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 85. no. 246. et no. 268. — grosse glatte astförmige *Spannenraupe*. (K. B. t. 39. f. 1 - 7.)

Sulzers Gesch. p. 161. t. 23. f. 1. Ph. *Marmorata*, der *Marmormesser*. *)

Der Oberflügel führt drey weisse und zwey braune Bänder, schwarz punktirt und gestreift. Das Männchen hat gekämmte Fühlhörner.

Wien. Schmett. p. 99. C. *Rinderaupen*, Larvae *Corticinae*; *spinnerförmige Spanner*, Ph. G. *Bombyciformes*.

1) *Große Spanner*; Männchen und Weibchen geflügelt.

No. 2. *Birkenspannerraupe* (Betulae albae); *Birkenspanner*, Ph. *Betularia*.

Abhandl. der königl. schwed. Akad. der Wiss. Uebers. 17 Th. p. 212. t. 6. f. 2. 3. (Carl *Klerk* Beschr. e. *Nachtvogels*.)

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 18. der *Birkenspanner*.

Albin Ins. t. 40. 41. 91. *Raupe* und *Spanner*. **)

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 41. Phal. *Betularia*. Nom. *Linn.* ex ed. 1. Faun. Suec. no. 850.

Bekm.

*) Hr. *Sulzer* macht daraus eine eigene Art. Sein Exemplar ist in der Zeichnung dunkler als das kleemannische: beyde aber haben den deutlichen Linn. Karakter: *Thorace fascia atra.*

**) Auf allen 3 Tafeln des *Albins* einerley Art, nämlich diese *Betularia* L. Sie nimmt auf verschiedenen Bäumen verschiedene Gestalten an. Daher hat sie *Albin* für 3 besondere Arten gehalten. Und eben dies hat vermuthlich Hr. *Sulzern* bewogen, seine und die *kleemannische* Marmoratam für eine verschiedene Art anzusehen, S. *Wien. Schmett.* p. 99. Anm. *)

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 217. Phal. *Betularia.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 88. f. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 628. no. 41. *Phalaena Betularia.* Nom. *Linn.*

Réaum. Inſ. Tom. II. t. 27. f. 15.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 423. Ph. *Betularia.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1445. Ph. *Betularia.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. p. 344. t. 17. f. 19-22. *Grande Chenille arpenteuſe en bâton*, à dix jambes, brune, dont la tête eſt refendue profondement, et qui vit ſur l'Orme.

— — p. 699. t. 17. f. 22.

Phalene à antennes en filets et à courte trompe; blanche, avec une infinité de points, de petites taches et rayes noires.

— Tom. II. Part. I. p. 344. no. 1. t. 5. f. 18. *Phalene blanche, tachetée de noir.* (*Mas.*)

Phalene à antennes barbues à trompe; à ailes horizontales blanches avec un grand nombre de taches, de points, et de mouchetures noires; à corcelet à raye noire.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 98. t. 17. f. 19-22. der groſse, braune, zehnfüſsige *Stockſpanner* mit tief geſpaltenem Kopfe auf den Rüſtern.

— — 4 Qu. p. 122. t. 17. f. 22.

Ein weiſſer *Nachtvogel* mit unzählichen ſchwarzen Punkten, kleinen Streifen und Flecken, mit fadenförmigen Fühlhörnern, und kurzem Saugrüſſel.

— II Th. I B. p. 250. no. 1. t. 5. f. 18. die *weiſſe ſchwarzgefleckte Phaläne.* (*Männchen.*)

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, horizontalen, weissen, schwarzgefleckten, punktirten, gesprenkelten Flügeln, und *schwarzgestreiftem Brustschilde.*

218. *Pantaria*, die *portugiesische Fleckstreife.* *)

Müller l. c. p. 709. no. 218. der *Panterling.*
Wien. Schmett. p. 115. N. *Zeichenraupen.*
3) Mit fast zerstreuten Fleckchen **). —
No. 12. *Unbekannte Raupe. Weisser düsternfleckichter Spanner*, G. *Pantaria.* (Sylvata *Scop.*)
Scop. Ent. carn. p. 220. no. 546. Ph. *Sylvata.*
Long. lin. $8\frac{1}{2}$. *Lat.* 5.

Alba; alis *anticis* maculis fuscis subelatis, basi tamen et prope angulum posticum macula maiore obscuriore et colore ferrugineo inquinata; abdomine paleaceo, punctorum nigrorum seriebus 7.

In sylvis *faginis*, umbrosis.

219. *Wauaria*, das *lateinische V.*

Müller l. c. p. 709. no. 219. der *W-ling.*
Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 767. Ph. *Wauaria.* Ziemlich gemein auf den *Johannis-* und *Krauselbeerstauden.*
Berl. Mag. IV. p. 508. no. 5. Ph. *Vauaria*, das *lateinische V.*

Hellmäusefarbig, mit einigen braunen Flecken, darunter einer ein V vorstellet.

Röseli

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Linné* fragt hiebey: An femina huius *aptera*? die Wiener Entomologen antworten p. 115. Anm. *) *Nein.* Oder das *Männchen* kann keine *gekämmte* Fühlhörner haben und die Art müsste alsdann *Pantherata* heissen. Die Fühlhörner unserer Stücke sind nur *borstenförmig.*

Röfels Infektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 17. t. 4. die bräunlich grüne gelbgestreifte und schwarzpunktirte *Spannenraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 35. no. 90. Phal. *Vauaria*, das *lateinische V.*

Frisch Inf. III. p. 15. no. 6. 2 Pl. t. 3. f. 1 - 3. der grüngelbe und schwarz besprengte *Spannenmesser.*

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1012. no. 5. Ph. *Wauaria*, des *grünen Spannenmessers mausegraue und schwarzbendigt Motte.*

Das *lateinische V.*

Wien. Schmett. p. 106. G. No. 12. *Johannisbeerspannerraupe* (Ribes rubri); *Johannisbeerspanner*, Ph. *Wauaria*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 15. Ph. *Wauaria.*

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 219. Phal. *Wauaria.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 58. f. 1.

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 151. no. 36. *Le double W; Littera* W.

List. Goed. f. 12. *Somnolentus.*

Act. Vpsal. 1736. p. 23. no. 44. *Papilio* alis planis albidis, fasciis linearibus nigricantibus.

Petiv. Mus. 3. no. 4. *Phalaena* hortensis media cinerea, maculis fuscis notata.

Raj. Hist. Inf. p. 179. no. 41.

Phalaena minor, alis amplis, e cinereo albicantibus, interdum fusco - cinereis, 4 in exteriorum margine maculis linearibus e rufo nigricantibus.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1248. Ph. *Wauaria.* Vulgo *W littera.*

Fabric. S. E. p. 626. no 32. *Phalaena Wauaria.* Nom. *Linn.*

Larva ſubpiloſa, viridis, nigro-punctata, linea dorſali lateribusque flavis.

Pupa nuda, brunnea, acuminata.

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 427. Ph. *Wauaria.* Nom. *Linn.*

— p. 49. no. 434. Ph. *Viduaria.*

Pectinicornis, alis pallentibus, ſuperioribus margine inferiori quatuor maculis fuſcis; *poſtico linea arcuata* undulataque albida.

— Zool. Dan. Prodr. p. 125. no. 1447. Ph. *Wauaria* et *Viduaria* F. Fr. no. 434. Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 132. no. 46.

Phalaena pectinicornis, ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, ſuperiorum margine exteriore macula triplici nigro-fuſca.

Le *Damas cendré.*

Long. 4. lign. *Larg.* 8. lign.

220. *Sacraria*, die *barbariſche Blutſtreiſe.* *)

Müller l. c. p. 709. no. 220. der *Blutling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 768. Ph. *Sacraria.*

Fabric. S. E. p. 628. no. 42. *Phalaena Sacraria.* Nom. *Linn.*

221. *Purpuraria*, der *Purpurſpanner.*

Müller l. c. p. 710. no. 221. der *Purpurling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 769. Ph. *Purpuraria.*

Bey uns etwas *ſelten.* **)

Berlin. Mag. IV. p. 516. no. 25. Phal. *Cruentaria*, das *rothe Band.*

Die

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Füeßl.* hat dabey *Schaeff.* Ic. t. 19. f. 16. angeführt; ſolche iſt aber Pyralis *ſanguinalis* L.

Die Oberflügel grünlichgelb mit *rothen Binden;* die Unterflügel oraniengelb.

Naturf. XI. p. 70. no. 25. Ph. *Cruentaria* ist L. *Purpuraria* (v. *Rottemb.*).

Gleditsch Forstw. I. p. 653. no. 31. Ph. *Purpuraria*, der *kleinste Spannenmesser.*

— II. p. 821. no. 16. Ph. *Purpuraria*, die *gelbgeflügelte Spannenmessermotte.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 9. *Wegetrittspannerraupe* (Polygoni avicularis); *Wegetrittspanner*, Ph. *Purpuraria.*

— p. 152 wird gezeigt, daſs des *Schaeff.* Icon. t. 19. f. 16. nicht diese G. *Purpuraria*, sondern eher Pyralis *Sanguinalis* L. sey.

Schaeff. Icon. t. 173. f. 5. 6.

Fabric. S. E. p. 629. no. 45. *Phalaena Purpuraria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 432. Ph. *Purpuraria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1448. Ph. *Purpuraria.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 126. no. 34.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis deflexis luteo-rubris, *fascia duplici transversa sanguinea.*

L' *Ensanglantée.*

Long. 6. lign.

Leche nov. Inſ. Spec. p. 32. no. 63.

Phalaena pectinicornis flava, alis *fasciis duabus rubentibus* transversalibus (*Mas*).

222. *Prosapiaria*, der *Blaurand.* *)

Müller l. c. p. 710. no. 222. der *Stammling.*

 Linn.

*) Vielleicht eine Spielart von G. *Fasciaria* L. S. *Wien. Schmett.* p. 96. Anm. *)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1252.
Alis lutescentibus; fascia saturatiore vtrinque *striga glauca* distincta.

Vddm. Diss. 66. *Phalaena* alis primariis dilute cinnamomeis; fasciis duabus linearibus subcoeruleis.

Clerk Icon. t. 3. f. 1. Ph. *Prosapiaria.*

Fabric. Mantiss. p. 285. no. 26 - 27. *Phalaena Prosapiaria.*
Pectinicornis, alis lutescentibus, atomis strigisque tribus fuscis, tertia maculari. — In Europae *Nemoribus.*

223. *Pusaria*, der *kleine Weißling.*

Müller l. c. p. 710. no. 223. der *Kleinling.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 770. Ph. *Pusaria.*
In den *Wäldern* nicht selten.

Berlin. Mag. IV. p. 510. no. 10. Ph. *Pusaria*, das *braune Band.*
Ganz weiss, mit drey blassbraunen Queerstreifen.

— p. 621. E. Einige *Abänderungen.*

Naturf. XI. p. 66. no. 10. Ph. *Pusaria.*
Die *Raupe* gelblich grün, mit gelben Einschnitten in den Gelenken. Ueber den Rücken läuft eine karminrothe unterbrochene Linie.
— Deren *Hufnagel* in der Anm. gedenkt, sind bloss eine *Varietät* (v. *Rottemb.*).

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 220. no. 45. t. 17. Ph. *Pusaria.* Auf den schneeweissen Flügeln zween undeutliche Striche.

Wien. Schmett. p. 107. H. *Stricheraupen*, Larvae *Strigillatae*; *wechselnde Spanner*, Phal. G. *Alternantes.*

2) Mit drey Queerstrichen.

No. 4. *Weißbirkenspannerraupe* (Betulae albae); *Weißbirkenspanner*, Phal. *Pusaria.* (Strigata *Scop.*)

Schaeff. Icon. t. 111. f. 7.

Scop. Ent. carn. p. 218. no. 541. Ph. *Strigata.*

Long. lin. 7. *Lat.* $4\frac{1}{2}$.

Alba; alis *anticis* strigis transversis tribus; *posticis* duabus ferrugineis.

Fabric. S. E. p. 625. no. 27. *Phalaena Pusaria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 430. Ph. *Pusaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1449. Ph. *Pusaria.* Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 448. no. 4. t. 8. f. 12. *Phalene blanche à trois lignes grises.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues blanches, traversées de trois, et les inférieures de deux lignes grises.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 329. no. 4. t. 8. f. 12. Die *weisse Phaläne* mit drey *grauen Linien.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel und breiten weissen Flügeln, davon die Oberflügel drey, die Unterflügel aber zwo graue Queerlinien haben.

224. *Vespertaria*, der *portugiesische Abendspanner*. *)

Müller l. c. p. 710. no 224. der *Abendling.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 4. *Unbekannte Raupe; weißgrauer dunkelstreifiger Spanner*, Phal. *Vespertaria.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 31. *Phalaena Vespertaria.* Nom. *Linn.*

Habitat in *Germania*, *Anglia.*

*) Nicht abgebildet.

225. *Papilionaria*, der *tagfalterartige Spanner.*

Müller l. c. p. 710. no. 225. der *Tagling.*

Füeßl. schweiz. Inſ. p. 40. no. 771. Ph. *Papilionaria*, der *Tagmeſſer.*

Nicht ſelten auf *Birken.*

Friſch Inſ. X. p. 20. no. 17. 3 Pl. t. 17. vom braunen *Spannmeſſer* mit den zwey Kopf- und Rückenſpitzen, und ſeinem *grünlichen* Papilion.

Berl. Mag. IV. p. 506. no. 1. Ph. *Praſinaria*, das *grüne Blatt.*

Grasgrün, mit drey ſchmalen gelblich weiſſen unterbrochenen parallellaufenden Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 63. no. 1. Ph. *Praſinaria*, iſt L. *Papilionaria* (v. *Rottemb.*).

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. t. XII. p. 43. die ſchöne grüne breitleibige *Spannenraupe* mit dem beſondern Kopf (Foemina).

— IV. p. 134. t. 18. f. 3. Ein ungemein ſchöner celadongrüner *Nachtvogel* der dritten Klaſſe. (Mas.)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 96. Ph. *Papilionaria*, der *Tagling.*

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 1. *Buchenſpannerraupe* (Fagi ſylvaticae); *Buchenſpanner*, Ph. *Papilionaria.*

Fiſchers N. G. v. Livl. p. 154. no. 371. Ph. *Papilionaria*, der *Tagling.*

Schäffers Abhandl. von Inſ. III. p. 83. c. tab. adj. f. 1-7. die *Ellernraupe.*

— Icon. t. 17. f. 1.

Fabric. S. E. p. 624. no. 20. *Phalaena Papilionaria.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 425. Ph. *Papilionaria.* Nom. *Linn.*

Mül-

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1450. Ph. *Papilionaria.* Nom. *Linn.*

226. *Tripunctaria*, der *asiatische Dreypunkt.*

Müller l. c. p. 710. no. 226. der *Punktling.*
Seligm. ausl. Vögel I. t. 69.
Fabric. S. E. p. 627. no. 35. *Phalaena tripunctaria.*

Pectinicornis, alis fuscis, *anticis* fascia maculaia, *posticis* disco albo.

Fascia alarum e *maculis quinque* constat.

Cramer Pap. exot. II. p. 34. t. 22. Fig. E. Ph. *Tripunctaria.*

227. *Tricinctaria*, der *amerikanische Dreygürtel.**)

Müller l. c. p. 711. no. 227. der *Gürtling.*
Mus. Ludov. Vlricae p. 394. no. 29.

Corpus magnitudo Pap. *Cardamines.*

Antennae pectinatae, fuscae.

Alae concolores, flavae, at supra pallidiores.

Arcus fuscus ex costa Primoris ad anum ducit.

Arcus altera a costa Primorum ducit per medium alae anterioris, ad marginem alae posticae.

Arcus tertius apicem Alae anterius claudit.

228. *Caffraria*, der *Kafferspanner.***)

Müller l. c. p. 711. no. 228. der *Kafferling.*
Linn. Mus. Lud. Vlr. p. 393.

Corpus mediae magnitudinis, albicans, capite subflavescente.

Antennae albae, bifariam pectinatae, radiis fuscis.

*) *Nicht abgebildet.*

**) *Nicht abgebildet.*

Alae ſubconcolores, patentes, integerrimae, albidae.

Primores ſupra punctis ocellaribus luteis, centro ferrugineo, *ſeptem* in faſciae formam digeſtae. Praeter haec tria ejusmodi puncta verſus baſin et unum medio.

— *ſubtus* concolores, ſed obſoletiores. Puncta 7 ut ſupra, ſed alia tantum duo, quorum unum in medio, unum ad marginem anticum verſus baſin.

Poſticae ſimiles, ſed puncta 7 obſoleta ſupra, ſubtus evidentiora.

Punctum ferrugineum, lunatum, in medio alae ſubtus, absque annulo luteo.

229. *Iatropharia*, der *amerikaniſche Purgirnuß-ſpanner.*

Müller l. c. p. 711. no. 229. der *Purgierling.*
Cathol. I. p. 46. Ph. *Iatropharia.*
Clerk Icon. t. 55. f. 3.
Merian. Surin. t. 38. f. 1.
Fabric. S. E. p. 627. no. 36. *Phalaena Iatropharia.* Nom. *Linn.*

III. *Mit borſtenförmigen Fühlhörnern und eckigen Flügeln.*

230. *Viridata*, der *grünflüglichte Spanner.**)

Müller l. c. p. 711. no. 230. der *Grünflügel.*
Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 772. Phal. *Viridata*, der *Grünflügel.*

Bey uns nicht ſelten in *Hecken und Gebüſche.*

Wien. Schmett. p. 97. B. no. 7. *Brombeerſpanner-raupe*

*) S. unſere Anmerk. bey Linn. *Vernaria* no. 195.

raupe (Rubi fruticosi); *Brombeerspanner*, Ph. *Viridata.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 462. no. 19. der *Grünflügel; Brombeerspanner.*

Réaum. Inf. Tom. II. Mém. 9. p. 149. *Arpenteuse de la ronce.*

Albin. Inf. t. 48. f. 80. *Vierhörnigte Raupe* auf *Haselnußblättern.*

Scop. Ent. carn. p. 215. no. 530. Ph. *Viridata.*

Long. lin. $5\frac{1}{4}$. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Alae montano viridi colore tinctae, striga fimbriaque pallidiore, margine crassiore flavescente.

Fabric. S. E. p. 630. no. 54. *Phalaena Viridata.* Nom. *Linn.*

231. *Margaritata*, der *perlflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 712. no. 231. der *Perlflügel.*

Wien. Schmett. p. 95. A. No. 1. *Haynbüchenspannerraupe* (Carpini Betuli); *Haynbüchenspanner*, Ph. *Margaritaria.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 428. Ph. *Margaritaria.*

Subpectinicornis, *alis margaritaceis*, fascia rivulari lutescente, extremitatibus fuscis.

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1452. Ph. *Margaritaria.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1249. Ph. *Margaritaria.*

Geoffr. Inf. II. p. 137. no. 57.

Phalaena seticornis spirilinguis, alis patentibus, sinuatis, pallido-glaucis, fascia transversa obscuriore.

Le *Celadon.*

Long. 9. lign. *Larg.* 21. lign.

Réaum.

Réaum. Inſ. I. t. 39. f. 13. 14.
Chenille à forme de poiſſon.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 132. no. 77. *Phalaena* minor alis ex coeruleo viridibus, exterioribus duabus lineis transverſis albicantibus diſtinctis.

232. *Notata*, der *Zeichenflügel.*

Müller l. c. p. 712. no. 232. der *Zeichenflügel.*

Wien. Schmett. p. 104. F. No. 11. *Weidenſpannerraupe* (Salicis Pentandrae etc.); *Weidenſpanner*, Ph. *Notataria* (Notata L.).

Berl. Mag. IV. p. 600. no. 53. Ph. *Exuſtata*, der *Vierling.*

Weiſsgrau, mit 4 braunen Flecken, welche in einem Viereck zuſammenſtehn; die Unterflügel mit einer ſtumpfen Spitze.

Naturf. XI. p. 76. no. 53. Ph. *Exuſtata* iſt Linn. *Notata* (v. *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 652. no. 34. Ph. *Exuſtata*, der *Vierling.*

Clerk Icon. t. 6. f. 11.

233. *Porata*, der *italiäniſche Punktflügel.**)

Müller l. c. p. 712. no. 233. der *Punktflügel.*

Wien. Schmett. p. 101. D. *Stengelraupen*, Larvae *Pedunculares; zackenſtriemigte Spanner*, Phal. G. *Crenatoſtriatae.*

1) Mit ſtumpfgezähnten Unterflügeln; die Männchen mit ſehr gekämmten Fühlhörnern.

No. 7. *Aeberreiſsſpannerraupe* (Artemiſiae campeſtris); *Aeberreiſsſpanner*, Phal. *Selenaria* (*Porata* Linn.).

Fabric. S. E. p. 631. no. 56. *Phalaena Porata.*

Seti-

*) Nicht abgebildet.

Seticornis, alis pallidis, rufo pulverulentis, omnibus puncto ocellari albo. — In *Europa, Anglia.*

234. *Repandata*, der *wellenflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 712. no. 234. der *Wellenflügel.*

Füeßl. schweiz. Inſ. p. 40. no. 773. Ph. *Repandata*, der *Wellenflügel.*

Nicht selten auf den *Eibenbäumen.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 2. *Weißbüchenspannerraupe* (Carpini betuli); *Weißbüchenspanner*, Ph. *Repandata.*

Hollar Inſ. t. 3. f. 2. (*Naturf.* IX. p. 222.) Ph. *Repandata.*

Kleem. Beytr. I. p. 233. t. 18. f. 1. der mit ausgekappten, weiſs und grau gemengten, auch mit aus- und eingekappten ſchwarz- und bräunlichgelb gezeichneten Flügeln gezierte *Spannenpapilion.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 62. Ph. *Repandata:* der *aſchgraue* braungewäſſerte *Spannenmeſſervogel* mit eckigten Flügeln, wovon die untern einen zurückgeſchlagenen ſchwarzen Rand haben.

Clerk Icon. t. 6. f. 8. Ph. *Repandata.*

235. *Dubitata*, das *Räthſel.* *)

Müller l. c. p. 712. no. 235. das *Räthſel.*

Berlin. Mag. IV. p. 610. no. 80. Ph. *Fuliginata*, das *Käuzlein.*

Glänzend grau, mit braunen ausgeſchwungenen Queerbinden, die Flügel ausgezackt.

Naturf. XI. p. 84. no. 80. Ph. *Fuliginata* iſt Linn. *Dubitata* (v. *Rottemb.*).

Kleem.

*) *Linné* ſagt davon: Statura *Geometrae*; Magnitudo *Noctuae*; Facies *Tineae*.

Kleem. Beytr. I. p. 134. t. 28. f. 2. der mit gelblich grauen, ſchwarzbraungezeichneten *Vorder*-und mit aſchfarbig braungrau gezeichneten, nett ausgekappten Hinterflügeln gezierte *Spannenpapilion.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 748. no. 51. Ph. *Fuliginata*, das *Käuzlein.*

Wien. Schmett. p. 109. K. *Sheineulenraupen*, Larvae *Noctuiformes*; *wellenſtriemigte Spanner*, Ph. G. *Vndatae.*

1) Die Unterflügel klein ausgezähnt.

No. 3. *Wegedornſpannerraupe* (Rhamni cathar.); *Wegedornſpanner*, Ph. *Dubitata.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 33. Phal. *Dubitata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 842. (ed. 2. no. 1259.)

Clerk Phal. t. 6. f. 2.

236. *Emarginata*, der *Rändelflügel.*

Müller l. c. p. 713. no. 236. der *Rändelflügel.*

Berl. Mag. IV. p. 526. no. 46. Ph. *Eroſata*, die *Zackmotte.*

Okerbraun, mit 4 ſchwarzen Punkten, und 2 feinen Queerſtreifen, die Flügel ausgeſchwungen und gezackt.

Naturf. XI. p. 73. no. 46. Ph. *Eroſata* iſt L. *Emarginata* (von *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtw. I. p. 656. no. 43. Ph. *Eroſata*, die *Zackmotte.*

— II. p. 753. no. 74. Phal. *Emarginata*, die *blaſsgelbe Spannenmeſſermotte, mit 2 hellgrauen Streifen und ausgeſchweiften Flügeln.*

Wien. Schmett. p. 104. F. No. 10. *Unbekannte Raupe. Beinfarbener rothgeſtrichter Spanner*, Ph. *Emarginata.*

Anm.

Anm. Das *Männchen* dieses *Spanners* hat doch *haarichte* Fühlhörner (Antennae *pubescentes* L.).

Fabric. S. E. p. 631. no. 57. *Phalaena emarginata.*

Seticornis, alis subemarginatis, pallidis; fasciis duabus griseis punctoque fusco.

Clerk Phal. t. 4. f. 12.

IV. *Mit borstenförmigen Fühlhörnern und runden Flügeln.*

237. *Chaerophyllata*, der *schwarzflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 713. no. 237. der *Kerbelfreund.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 774. Ph. *Chaerophyllata*, der *Schwarzflügel.*

Nahe bey den Wäldern auf den Viehweiden nicht selten.

Wien. Schmett. p. 116. O. *Spreckenraupen*, Larvae *Punctatae; einfärbigte Spanner*, Ph. G. *Unicolores.*

No. 1. *Kälberkernspannerraupe* (Chaerophylli Sylvestris); *Kälberkernspanner*, Ph. *Chaerophyllata.*

Gladbachs Schmett. p. 41. t. 19. f. 4. 5. Phal. *Chaerophyllata: Mas* et *Foemina;* der *Mohr mit weissen Flügelspitzen.*

Beschäftig. der naturforsch. Fr. zu Berlin III. p. 33. t. 1. f. 3. Ph. G. *Chaerophyllata;* der *Mohr mit weissen Flügelspitzen.* (D. *Kühn.*)

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 55. Ph. *Atra.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 864.

Act. Upsal. 1736. p. 23. no. 25. *Papilio* alis nigris, apicibus albis.

Scop.

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 127. Ph. *Chaerophyllata.*

Alis *anticis* totis nigris, ſoloque apicis margine albo.

In Montibus circa *Schemnitzium* non rara.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1274. Ph. *atrata.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 73. *Phalaena Chaerophyllata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1457. Ph. *Chaerophyllata.* Nom. *Linn.*

238. *Clathrata*, der *gitterflüglichte Spanner.*

Müller l. c. p. 713. no. 238. der *Gitterflügel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 775. Ph. *Clathrata*, der *Gitterflügel.*

Nicht ſelten in Wäldern im *Graſe.*

Berl. Mag. IV. p. 614. no. 90. Ph. *Clathrata*, das *Gitter.*

Weiſs mit braunen gegitterten Streifen.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 748. no. 54. Ph. *Clathrata*, das *gelbe Gitter.*

Wien. Schmett. p. 107. H. *wechſelnde Spanner.*

3) Mit unter einander verflochtenen Nerven und Queerſtrichen.

No. 5. *Unbek. Raupe. Gelblichtweiſſer braunſchwarzgegitterter Spanner*, Ph. *Clathrata.*

Sulzers Geſch. p. 162. t. 23. f. 2. Ph. *Clathrata*, der *Gitterflügel.*

Gelblichweiſſe Flügel, mit drey bis vier Reihen brauner Linien, *gittermäſsig* unordentlich durchzogen.

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 536. Ph. *Retialis.*

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

Alae albae; venis faſciisque 4 murinis *reticulatae.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 72. *Phalaena Clathrata.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 135. no. 53.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus fuſcis, utrinque maculis albis quadrangulis teſſellatis.

Les *barreaux.* *Long.* 5. lign. *Larg.* 11. lign.

239. *Vndulata*, der *Wellenſpanner.*

Müller l. c. p. 713. no. 239. die *Braunwelle.*

Berl. Mag. IV. p. 512. no. 13. Ph. *Undulataria*, die *Wellenmotte.*

Weiſslichgrau, mit vielen dicht an einander liegenden wellenförmigen bräunlichen Queerlinien.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 752. no. 70. Ph. *Vndulata*, die *Werftmotte*, oder *Spannenmeſſer des Werfts.*

Wien. Schmett. p. 109. K.

3) Feine Wellenlinien über alle Flügel.

No. 16. *Saalweidenſpannerraupe* (Salicis Capreae); *Saalweidenſpanner*, Ph. *Vndulata.*

Fabric. S. E. p. 632. no. 59. *Phalaena Vndulata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1463. Ph. *Vndulata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 6. f. 3.

240. *Flaveolata*, das *indianiſche Gelbfeld.*

Müller l. c. p. 714. no. 240. das *Gelbfeld.*

Linn. Muſ. Lud. Vlr. p. 396. no. 31.

Corpus quartae ſ. quintae magnitudinis; Capite, Thorace, Lingua, Abdomine flavum, apice abdominis nigro.

Antennae ſetaceae, nigrae.

Pedes flavo - et nigro - varii.

Alae primores utrinque nigrae.

Macula flava, magna, extrorſum crenata, antice ſinu excavata, ad marginem tenuiorem, verſus baſin.

Poſticae utrinque a baſi ultra medium flavae.

Margo diſcum verſus crenatus; reliquum alae verſus marginem exteriorem nigrum.

Nervi alarum apice albeſcunt.

Cramer Pap. exot. I. p. 139. t. 88. Fig. C. Ph. *Flaveolata.*

Seba Theſ. IV. t. 7. f. 7. 8. t. 13. f. 3. 4.

241. *Aeſtuata*, der *indianiſche Kettenſpanner.*

Müller l. c. p. 714. no. 241. t. 22. f. 9. der *Kettenvogel;* der *röthlichbraune weißgefleckte kapenſiſche Nachtvogel.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 98. *Phalaena Aeſtuata.*

Seticornis, cyaneo - nigra, albo - maculata.

Statura P. *Vrticatae*, at paulo maior. Thorax et abdomen cyanea, ſtriis quatuor albis.

Linn. Muſ. Lud. Vlr. p. 397. no. 32. Ph. *Aeſtuata.*

Corpus tertiae magnitudinis, pallidum.

Antennae nigrae.

Pedes pallidi, albo - notati.

Alae omnes concolores utrinque, fuſcae.

— *Primores* utrinque concolores.

Maculae 2 oblongae, fere contiguae, albae ad baſin.

Maculae 6 albae oblongae, obtuſae, coadunatae, in diſco.

Margo linea alba notatus.

— *Poſticae* fuſcae.

Macu-

Macula ex 7 albis, linearibus, obtuſis coadunatis, maiorem alae partem a baſi verſus marginem occupans.

Margo poſticus lineola alba.

242. *Groſſulariata*, der *gefleckte Tiger*.

Müller l. c. p. 714. no. 242. der *Tintenfleck*.

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 776. Ph. *Groſſulariata*, der *Tiger*.

Auf den *Krauſel*- und *Johannisbeerſtauden* häufig.

— Mag. der Entomol. II. p. 37. Ph. *Groſſulariata*. (Chorh. *Meyer*.)

Berl. Mag. IV. p. 602. no. 59. Ph. *Groſſulariata*, der *gefleckte Tiger*.

Weiſs mit ſchwarzen Flecken; an einigen Orten ſafrangelb.

Friſch Inſ. III. p. 14. no. 5. 2 Pl. t. 3. vom weiſſen *Spannmeſſer* mit ſchwarzen und gelben Flecken.

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 9. t. 2. die graulich weiſſe *Spannenraupe* mit dem gelben Bauche und ſchwarzen Flecken auf dem Rücken.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 102. no. 291. p. 112. no. 314. Ph. *Groſſulariata*, der *Tintenfleck*; der *gefleckte Tiger*, der *Harlekin*.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1012. no. 6. Ph. *Groſſulariata*, der *gefleckte Tiger*.

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 221. no. 48. Phal. *Groſſulariata*; Däniſch: *Snare-Orm*; *Schlingenwurm*.

Fiſchers N. G. von Livl. p. 154. no. 372. Ph. *Groſſulariata*, der *Tintenfleck*.

Wien. Schmett. p. 115. N.

3) Mit faſt zerſtreueten Fleckchen.

No. 11. *Stachelbeerſpannerraupe* (Ribes Groſſulariae); *Stachelbeerſpanner*, Ph. *Groſſulariata.*

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 16. Ph. *Groſſulariata.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 20. Phal. *Groſſulariata*, der *Tiger.*

Onomat. hiſt. nat. P. 6. p. 374. Ph. *Groſſulariata.*

Seligman ausl. Vögel. Tom. VI. t. 97.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 242. Ph. *Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

Syſt Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 40.

Petiv. Muſ. p. 4. no. 7. *Eruca* geometrica, pulchre variegata, *Groſſularias* depaſcens.

Phalaena hortenſis alba, maculis plurimis nigris inſignita.

Raj. Hiſt. Inſ. p. 178. no. 14.

Phalaena media, alis amplis albis, maculis crebris nigris et lineis transverſis luteis variis.

— p. 179. *Eruca* maiuſcula groſſula, albo-rubro-nigroque coloribus varia.

— p. 373. no. 1. *Eruca* Geometra Groſſulariam depaſcens.

Schaeff. Icon. t. 67. f. 1. 2.

Scop. Entom. carn. p. 219. no. 544. Ph. *Groſſulariata.*

Long. lin. 9. *Lat.* 6.

Alba; alis fuſco-maculatis, *anticis* ſupra baſi faſciaque flavis.

Fabric. S. E. p. 631. no. 58. *Phalaena Groſſulariata.* Nom. *Linn.*

Larva Geometra ſubpiloſa, ſupra cinerea, nigro-punctata, ſubtus flava.

Pupa ſubfolliculata, atra: faſciis flavis.

Mülle-

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 435. Ph. *Grossulariata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1458. Phal. *Grossulariata.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inf. II. p. 137. no. 56.

Phalaena seticornis spirilinguis, alis patentibus albis, maculis inaequalibus nigris plurimis, fasciaque transversa lutea.

La *Mouchetée.*

Long. 8. lign. *Larg.* 1½. pouce.

Bibl. Reg. Paris. p. 16. f. 2. Ph. *hortensis.*

243. *Crataegata*, der *Heckenkriecher.*

Müller l. c. p. 714. no. 243. t. 22. f. 10. der *Heckenkriecher.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 40. no. 777. Ph. *Crataegata*, der *Gelbflügel.*

Bey uns *etwas selten.*

Berl. Mag. IV. p. 522. no. 37. Ph. *Luteolata*, die *gefleckte Zitrone.*

Wien. Schmett. p. 104. F. No. 13. *Weißdornspannerraupe* (Crataegi Oxyac.); *Weißdornspanner*, Ph. *Crataegata.*

Beschäft. naturf. Fr. zu Berl. IV. p. 29. t. 2. Ueber den *Weißdornspanner* nach Hn. *Sepp.* Ph. *Crataegata.* (*Bergsträsser.*)

Schrift. der Dronth. Gesellsch. III. p. 368. no. 34. Ph. G. *Luteolata.* Nom. *Linn.* (*Ström.*)

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 240. Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 163. f. 2. 3.

Linn. S. N. ed. 10. p. 525. no. 168. Ph. *Luteolata.*

Uddm. Diss. 70. *Phalaena* flava, alis patentibus macula tricuspide fusca, pupilla alba.

Scop. Ent. carn. p. 224. no. 556. Ph. *Crataegata.*

Long. lin. 9. *Lat.* 5½.

Lutea tota; alis anticis margine ſuperiore maculis ferrugineis 5, antice minoribus, macula ocellari dentata alba; iride fuſca, ferrugineae ſecundae adnata.

Fabr. S. E. p. 633. no. 65. *Phalaena Crataegata.* Nom. *Linn.*

Larva griſea, tuberculo dorſali didymo.

Pupa fuſca, folliculo cinereo, ferrugineo-maculato.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1459. Phal. *Crataegata.* Nom. *Linn.*

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 25. t. 6. De *Hagedoorn-Vlinder.*

Geoffr. Inſ. II. p. 139. no. 59.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus luteis, duplici punctorum cinereorum ordine, ſuperioribus maculis duabus, et rachi croceo-ferrugineis.

La *Citronelle rouillée.*

Long. 7. lign. *Larg.* 15. lign.

244. *Populata*, der *Pappelnſpanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 244. die *Sudelſpitze.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 778. Ph. *Populata.*

Auf den *Pappelbäumen etwas ſelten.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 684. no. 8. Ph. *Populata*, der *Spannenmeſſer der Aſpen.*

Wien. Schmett. p. 113. M. *Schuppenraupen*, Larvae *Squamoſae*; *eckeſtreifige Spanner*, Ph. G. *Angulato-faſciatae.*

2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 17. *Aeſpenraupenſpannerraupe* (Populi Tremulae etc.); *Aeſpenſpanner*, Phalaena *Populata.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 632. no. 60. Phal. *Populata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 5. f. 14. 15.

245. *Bilineata*, die *Doppellinie.*

Müller l. c. p. 715. no. 245. t. 22. f. 11. die *Ziegelwelle.*

Füeßl. schweiz. Inſ. p. 40. no. 779. Ph. *Bilineata*, die *güldene Kette.*

Ziemlich gemein in *Wäldern* im *Graſe.*

Berl. Mag. IV. p. 600. no. 55. Ph. *Bilineata*, die *güldne Kette.*

Pomeranzengelb, mit verſchiedenen weiſſen und braunen ſchmalen ſchlangenförmigen Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 77. no. 55. Ph. *Bilineata.* Die *Raupe* auf dem Rücken weiſsgrau, an den Seiten und am Bauche aber gelblichweiſs; zu Ende des Aprils im Graſe. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtw. II. p. 753. no. 75. Ph. *Bilineata;* die gelbe *Spannenmeſſermotte* mit einer zurückgeſchlagenen Binde, und ſchwarz und weiſſen Saume.

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 284. no. 44. Ph. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 17. *Wiederſtoßſpannerraupe* (Lychnidis dioicae); *Wiederſtoßſpanner*, Ph. *Bilineata.*

Anm. Nur bey wenigen Stücken dieſer Art verbreiten ſich zwo ſchwarze Queerlinien auf den Oberflügeln einigermaſſen in ein Queerband. (Faſcia L.)

Schaeff. Icon. t. 12. f. 4.

Scop. Ent. carn. p. 227. no. 566. Ph. *Bilineata.*

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

Alae utrinque ſulphureo-ochreaceae; anticae ſupra lineis binis repando-dentatis fuſcis albisque; omnibus ſubtus limbo fuſceſcente.

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 445. Ph. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 127. no. 1467. Phal. *Bilineata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 75. *Phalaena bilineata.* Nom. *Linn.*

Geoffr. Inſ. II. p. 143. no. 68.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis; alis patentibus luteis, lineolis fuſcis et albidis vndulatis, limbo dentato.

La *Brocatelle d'or.*

Long. 4. lign. *Larg.* 10 lign.

246. *Chenopodiata*, der *Gänſefußſpanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 246. der *Hochpunkt.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 780. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.*

Bey uns *etwas ſelten;* in Bündten.

Friſch Inſ. V. p. 35. no. 14. 2 Pl. t. 14. von dem *grünen Ausſpanner* mit drey weiſſen Linien auf jeder Seite. *)

Berlin. Mag. IV. 602. no. 58. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor.* *Hellblaſsgelb* mit Ockerbraun ſchattirt.

Kleem. Beytr. I. p. 313. t. 37.

Die zur 3ten Klaſſe der *Nachtvögel* gehörige glatte mit eckigen Abſätzen und Zeichnungen begabte zehnfüſsige Spannenraupe.

Naturforſch. XI. p. 77. Ph. *Chenopodiata* iſt die *Kleemanniſche.*

1) Die

*) Dieſes Zitatum ſtehet nach *Linné* bey ſeiner *Prunata* no. 250; es gehöret aber eigentlich hierher. S. *Naturf.* XI. p. 77.

1) Diese gleichet einigermaſsen der Ph. *Prunata* L. no. 250. weil Kl. ſeine Figuren nach ſehr dunklen Exemplaren entworfen; die meiſten Stücke der *Chenop.* aber weit heller ausfallen.

2) Die Zeichnungen der Prunata weit dunkler als ſelbſt bey den dunkelſten Exemplaren der Chenop. auch hat die Prunata *nichts gelbliches* wie jene. (v. *Rottemb.*)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 84. no. 244. p. 92. no. 266. Ph. *Chenopodiata.*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 1013. no. 7. Ph. *Chenopodiata*, der *gelbe Marmor*.

Wien. Schmett. p. 112. M.

1) Mit einer Ecke des Queerbandes.

No. 2. *Gänſefuſsſpannerraupe* (Chenopodii viridis); *Gänſefuſsſpanner*, Ph. *Chenopodiata* — und p. 153. daſs die *Schaeff.* Icon. t. 76. f. f. 4. 5. nicht *Chenopodiata*, ſondern ihre *Menſuraria* ſey p. 111. no. 2.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 47. Phal. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 856.

Act. Upſ. 1736. p. 24. no. 47.

Papilio alis planis griſeis, faſcia pallida.

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 436. Ph. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 127. no. 1460. Phal. *Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 636. no. 83. *Phalaena Chenopodiata.* Nom. *Linn.*

247. *Comitata*, der *Braunpunkt.*

Müller l. c. p. 715. no. 247. der *Geſelle.*

Wien. Schmett. p. 112. M.

1) Mit einer Ecke des Queerbandes.

No. 3. *Unbekannte Raupe.* *Blaſsockergelber bräunlichtſtreifiger Spanner*, Ph. *Comitata.*

— Der *Chenopod.* ſehr ähnlich p. 108. (*)

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 437. Ph. *Comitata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1461. Ph. *Comitata.* Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 51. f. 10.

Fabric. S. E. p. 632. no. 61. *Phalaena Comitata.* Nom. *Linn.*

248. *Plagiata*, der *breitbandirte Spanner.*

Müller l. c. p. 715. no. 248. das *Breitband.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 781. Phal. *Plagiata* Bey uns *nicht ſelten.*

Berl. Mag. IV. p. 522. no. 38. Ph. *Plagiata*, das *doppelte Band.*

Der Grund weiſsgrau, mit einigen braunen Queerſtreifen, die theils heller, theils dunkler ſind.

Wien. Schmett. p. 111. L. *Runzelraupen;* Larvae *Rugoſae; mittelſtreifigte Spanner*, Ph. G. *Medio-faſciatae.*

2) Die Oberflügel grau.

No. 4 *Johanniskrautſpannerraupe* (Hyperici perforati); *Johanniskrautſpanner*, Ph. *Plagiata.*

Schaeff. Icon. t. 12. f. 1. 2. *)

Clerk Phal. t. 6. f. 1.

249 *Miata*, der *Doppelhaken.*

Müller l. c. p. 716. no. 294. die *Dreynull.*

Füeſsl. Magaz. der Entom. II. p. 37. Ph. *Miata.*

1) Die *Raupe* friſst *Eichblätter*, auch *Schlehenblätter.*

2) Das

*) An haec; an Mülleri *Matronaria*: Faun. Fridr. p. 49. no. 433. — Zool. D. Pr. no. 1455.

2) Das dritte Paar der Vorderbeine ganz roth.

3) Die Haut des Oberleibes durchaus grünlich gelb. (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. IV. p. 522. no. 41. Ph. *Miata*, der *Doppelhaken.*

Blaſsgrün mit vielen ſchmalen braunen Strichen und grauen Flecken.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 751. no. 67. Ph. *Miata*, der *Doppelhaken.*

Kleem. Beytr. I. p. 222. t. 27. f. 1-8. *Raupe bis zum Ey des Vogels.*

— p. 120. t. 14. f. 1. 2. *Männchen* und *Weibchen.*

Die platte, bräunlich graue, mit einem herzförmig getheilten Kopfe, und hellem rautenförmig ſchwarz gezeichneten Rücken verſehene zehnfüſsige *Spannenraupe.*

Der zur N. V. 3 Kl. gehörige bräunlich graue und mit vielen Kappenzügen gezierte *Nachtpapilion.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 104. no. 295. Ph. *Miata.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.

No. 21. *Mayenſpannerraupe* (Betulae albae); *Mayenſpanner*, Ph. *Miaria* (*Miata* L.).

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 54. Phal. *Miata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 863.

Act. Vpſal. 1736. p. 23. no. 43.

Papilio alis planis vireſcentibus cinereo-maculatis.

Réaum. Inſ. II. t. 29. f. 11-13.

Fabric. S. E. p. 633. no. 67. *Phalaena Miata.*

Seticornis, alis griſeis, faſciis tribus viridibus, intermedia latiore, fuſco-undata.

250. *Pru-*

250. *Prunata*, der *Grauflügel.* *)

Müller l. c. p. 716. no. 250. der *Greifsflügel.*
Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 782. Ph. *Prunata.* Bey uns *etwas selten.*
Berl. Mag. IV. p. 600. no. 54. Ph. *Prunata*, der *Erpel.*
Dunkelbraun, mit 2 bräunlich gelben irregulären Queerstreifen, welche etwas weisgefleckt sind.
Naturf. XI. p. 76. no. 54. Ph. *Prunata.* Die Grundfarbe der *Raupe* von Hrn. *Hufnagel* unrichtig beschrieben, die niemals grün, sondern braun ist.
Wien. Schmett. p. 105. Anm. (*) p. 113. M.
2) Mit mehreren Ecken des Queerbandes.
No. 19. *Zwetschkenspannerraupe* (Pruni domesticae); *Zwetschkenspanner*, Ph. *Prunata.*
Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 155. no. 57. Phal. *Prunata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 866.
Clerk Phal. t. 7. f. 3. Ph. *Prunata.*
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1464. Ph. *Prunata.* Nom. *Linn.*
Fabric. S. E. p. 632. no. 64. *Phalaena prunata.* Nom. *Linn.*

251. *Aversata*, der *Finnländer.*

Müller l. c. p. 716. no. 251. der *Finnländer.*
Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 783. Ph. *aversata.* Bey uns selten.
Wien. Schmett. p. 117. P.

No.

*) Der *Chenopodiatae* ähnlich. S. unsere Anm. bey derselben no. 246. Es gehört auch das vom Linné zu Prunata gesetzte Zitatum *Frisch* zu jener.

No. 3. *Unbek. Raupe. Bleicher braungeſtrichter Spanner*, Ph. *Averſata.*

Cathol. A. p. 636. Ph. *Averſata.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1468. Ph. *Averſata.*?

Clerk Phal. t. 5. f. 7.

252. *Triſtata*, der *Trauerſpanner.*

Müller l. c. p. 716. no. 252. der *Kloſtervogel.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 784. Ph. *Triſtata.* Auf Birken *nicht ſelten.*

Gleditſch Forſtw. II. p. 752. no. 71. Ph. *Triſtata*, die *weiß- und ſchwarzgewäſſerte Spannenmeſſermotte.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

3) Mit hellem Durchſchnitte, und unrichtigem Rande des Queerbandes.

No. 26. *Unbekannte Raupe; ſchwarzer* weiſsſtreifigter und ſchwarzgeſtrichter Spanner.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 53. Phal. *Triſtata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 862.

Act. Upſ. 1736. p. 23. no. 25. *Papilio* alis planis albidis; faſciis latis cinereis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 440. Ph. *Triſtata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1465. Ph. *Triſtata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 71. *Phalaena Triſtata.* Nom. *Linn.*

Othon. *Fabric.* Faun. Groenland. p. 195. no. 149. Ph. *Triſtata.* Nom. *Linn.*

Habitat in *Betula nana*, et aliis fruticibus montanis, numeroſa ſatis.

Clerk Phal. t. 1. f. 13.

253. *Al-*

253. *Alchemillata*, der *Alchemiſtenkrautſpanner*.

Müller l. c. p. 715. no. 253. der *Alchymiſt*.

Wien. Schmett. p. 112. M.

No. 8. *Sinauſpannerraupe* (Alchemillae vulgaris); *Sinauſpanner*, Ph. *Alchemillata.*

Martini allgem. Geſch. d. N. II. p. 46. der *Alchymiſt;* der *Sinauvogel.*

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 285. No. 45. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 444. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1466. Ph. *Alchemillata.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. Tom. I. p. 358. t. 22. f. 10-16.

Petite *Chenille arpenteuſe* verte, à dix jambes, dont les ſeparations des anneaux ſont jaunâtres, qui a tout le long de chaque côté du corps une raye blanche, et qui vit ſur le Pied-de-Lion.

— — p. 695. t. 22. f. 16.

Petite Phalene à antennes à barbes, et à trompe, dont les ailes ſupérieures, qui ſont amples et plates, ont des rayes ondées blanchâtres et brunes.

— Tom. II. Part. I. p. 357. no. 10. *Phalene du Pied-de-Lion.*

Phalene à antennes barbues à trompe; à ailes horizontales d'un brun griſeatre avec deux bandes ondées, et une ligne en Ziczac blanches ſur les ſupérieures.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. p. 106. t. 22. f. 10-16. die kleine zehnfüſsige *Spannenraupe*, mit gelblichen Ringgelenken, und an beyden Seiten weiſsgeſtreift, auf der *Sinau*, oder *Alchemiſtenkraut.*

De-

Degeer Ueberſ. 4 Qu. p. 117. t. 22. f. 16.

Ein kleiner *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, und Saugrüſſel, deſſen breite und flache Oberflügel weiſsliche und braune wellenförmige Streifen haben.

— II Th. I B. p. 259. no. 10. die *Sinau- oder Alchymiſtenkrautphaläne.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen braungraulichen Flügeln, mit zwo gewäſſerten weiſſen Binden, und einer ſolchen zickzackichten Linie auf den Oberflügeln.

254. *Haſtata*, das *Spieſsband.*

Müller l. c. p. 717. no. 254. das *Spieſsband.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. no. 785. Ph. *Haſtata*, das *Spieſsband.*

Bey uns *etwas ſelten.*

Kleem. Beytr. I. p. 369. t. 44.

Die zehnfüſsige, zimmetbraune, zartgeſtreifte, und auch ſchwarze *Spannenraupe* mit gelben hufeiſenförmigen Seitenflecken und zehn Füſsen.

Wien. Schmett. p. 113. M.

No. 25. *Birkenbuſchſpannerraupe* (Betulae albae); *Birkenbuſchſpanner*, Ph. *Haſtata.*

Syſt. Natur. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 52. Ph. *Haſtata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 861.

Act. Vpſ. 1736. p. 24. no. 46. *Papilio* alis planis cinereis, faſciis albis punctatis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1470. Ph. *Haſtata.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 70. *Phalaena Haſtata.* Nom. *Linn.*

Faſciae

Fasciae albae in nostro specimine *nigro-punctatae.* *)

Othon. *Fabric.* Faun. Groenl. p. 195. no. 150. Phal. *Hastata.* Nom. *Linn.* — *Gras-Fidrilde.* Ol. 602?

Frequenter obvia mensibus Iunio et Iulio in *graminibus* et *muscis* montanis: *Tristatae* socia, oui similis, sed *maior.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 455. t. 8. f. 20. no. 7.

Phalene blanche et noire à tache en fer-de-pique.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues blanches avec des bandes ondées et des taches découpées noires tant en dessus qu'en dessous.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 334. no. 7. t. 8. f. 20. die weiss und schwarze *Phaläne* mit einem weissen Fleck, wie ein *Pikeneisen.*

Die Phaläne mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und breiten weissen Flügeln, mit gewässerten Binden, und schwarzen gezackten Flecken sowohl unten als oben.

255. *Albicillata*, das *Weissfeld.*

Müller l. c. p. 717. no. 255. das *Weissfeld.*

Füessl. schweiz. Inf. p. 41. no. 786. Ph. *Albicillata*, der *Weissger.*

Bey uns *etwas selten.*

Wien. Schmett. p. 114.

2) Die Queerflecken am Unterrande.

No. 8. *Unbekannte Raupe. Milchweisser grauschwarzfleckichter Spanner*, Ph. *Albicillata.*

Knochs

*) Auch in dem *Kleemannischen* Exemplar.

Knochs Beyträge zur Insektengeschichte I St. p. 40. no. 7. t. 2. f. 8. *Larva.* Ph. *Albicillata*, der *weisse Schleyer.*

Fabric. S. E. p. 634. no. 69. *Phalaena Albicillata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 1. f. 12.

256. *Dealbata*, der *Bleicher.*

Müller l. c. p. 717. no. 256. der *Tüncher.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 41. no. 786. Ph. *Dealbata*, der *Bleicher.* In den Wäldern *nicht selten.*

Wien. Schmett. p. 116. O.

No. 3. *Unbek. Raupe; weisser, unten schwarzadrichter Spanner*, Ph. *Dealbata.*

Sulzers Gesch. p. 162. t. 23. f. 3. Ph. *Dealbata*, der *Getünchte.*

Die *obere Seite* der Flügel wie getüncht, die *untere* mit schwarzen Adern durchzogen, und auf den vordern ein halbes Möndchen.

Fabric. S. E. p. 632. no. 63. *Phalaena dealbata.* Nom. *Linn.*

257. *Marginata*, der *Braunrand.*

Müller l. c. p. 717. no. 257. der *Flicker.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 40. no. 788. Ph. *Marginata*, der *Braunrand.*

Nicht selten in *Wäldern im Grase.*

Berlin. Mag. IV. p. 524. no. 42. Ph. *Marginata*, das *Kalbfell.*

Ganz weiss, mit dunkelgraubraunem Rande und Flecken. — — (?

— p. 625. O. ändert sich sehr ab; einige beynahe ganz weiss. — —

Gleditsch Forstwiss. I. p. 570. no. 8. II. p. 751. no. 66. Phal. *Marginata*, das *Kalbfell.*

Wien. Schmett. p. 114. N.
No. 10. *Haselstaudenspannerraupe* (Coryli Avellanae); *Haselstaudenspanner*, Ph. *Marginata.*
Sulzers Kennz. der Inf. t. 16. f. 96. Ph. *Hortulata.**)
Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 154. no. 51. Phal. *Marginata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 860.
Act. Vps. 1736. p. 23. no. 37. *Papilio* alis planis albis, maculis fuscis inaequalibus marginalibus.
Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 441. Ph. *Marginata.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1471. Ph. *Marginata.* Nom. *Linn.*
Fabric. S. E. p. 633. no. 66. *Phalaena Marginata.* Nom. *Linn.*
Interdum maculae aliquot nigrae in disco alae.
Scop. Entom. carn. p. 221. no. 548. Ph. *Staphylaeata.* **)

Long.

*) Dies war nach *Linn.* S. N. ed. 10. Ph. *Vrticalis*, und ed. 12. Ph *Vrticata.* Allein wenn man damit die Abbildung der wahren *Vrticata*: *Rösel* I. N. V. 4. t. 14. vergleicht, so wird man die deutlichste Verschiedenheit bemerken. Vermuthlich ist daher *Sulzers* Phaläne eine Abänderung der Ph. *Marginata*, wobey sie auch *Linné* angeführt hat. S. *Wien. Schmett.* p. 122. Anm.

**) Variat 1) *Alis anticis*: fascia abrupta fusca, maculisque marginalibus coalitis.
2) — — macula parva disci maculisque marginalibus disjunctis.
3) — — posticis limbo, et disco fusco-fasciato maculato.
4) — — limbo maculis tribus obsoletis, fascia nulla.

Long. lin. 5¾. *Lat.* 3⅔.

Alae concolores albae; *anticae* limbo maculisque binis contiguis fuſcis craſſiori margini impoſitis.

Habitat in *Fago*, in *Staphylaea*.

Geoffr. Inſ. II. p. 139. no. 60.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, margine undique interrupte fuſcis.

La *Bordure entrecoupée.*

Long. 6. lign. *Larg.* 11. lign.

258. *Ocellata*, das *Doppelauge.* *)

Müller l. c. p. 717. no. 258. das *Doppelauge.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 789. Ph. *Ocellata*, das *Doppelauge.*

Bey uns *ſelten.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

No. 9. *Labkrautſpannerraupe* (Galii Sylvatici); *Labkrautſpanner*, Phal. *Ocellata* (Faſciata *Scop.*).

Scop. Ent. carn. p. 221. no. 550. Ph. *Faſciata.* **)

Long. lin. 6. *Lat.* lin. 4½.

Alba; alis *anticis* ſupra baſi faſciaque dentata fuſco ferrugineoque variis.

Fabric. S. E. p. 635. no. 78. *Phalaena ocellata.*

Seticornis, alis albidis; faſcia lata abbreviata fuſca, puncto ſubocellari atro.

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 442. Ph. *Ocellata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1472. Ph. *Ocellata.* Nom. *Linn.*

*) *Nicht abgebildet.*

**) Habitus et faſciae figura, ut in *Friſch* Inſ. VII. t. 19. f. 2; ſed *colores alii.*

259. *Janata*, der *indianische Janus.* *)

Müller l. c. p. 717. no. 259. der *Janus.*

Linn. Muf. Lud. Vlr. p. 398. no. 33. Ph. *Janata.*

Corpus mediae magnitudinis, cinereum.

Antennae nigrae.

Oculi nigri.

Alae *primores supra* cinereae.

Lineae 2, saturatiores, undatae, transversae, remotae.

— — *subtus* cinereo-fuscae.

Fascia alba in medio.

— *posticae supra* fuscae.

Fascia transversalis alba.

Maculae 3, albae, in margine postico.

— — *subtus* cinereae.

Lineae 2 saturatiores, undatae, transversae.

Macula rotunda, fusca, ad angulum ani.

Fabric. S. E. p. 635. no. 80. *Phalaena Janata.*

Seticornis, alis cinereis; *posticis* supra fuscis, fascia punctisque tribus albis.

260. *Fluctuata*, die *Wasserwoge.*

Müller l. c. p. 718. no. 260. die *Wasserwoge.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 41. no. 790. Ph. *Fluctuata.*

Bey uns *etwas selten.*

Frisch Inf. VII. p. 27. no. 19. 3 Pl. t. 19. vom gelbgrünen *Spannenmesser*, der aufgerichtet zu stehen pflegt.

Berlin.

*) *Nicht abgebildet.*

Linné hat dabey eine artige Bemerkung:

Si Ph. *subtus* inspiciatur, ut cauda sit capitis loco, refert eandem supra, antice visam: hinc *Hysteronproteron*, vel *Janus bifrons* audit.

Berlin. Mag. IV. p. 604. no. 65. Ph. ***Fibulata***, der *Gartenvogel.*

Weiſslich mattaſchgrau gefleckt mit einigen dunkelbraunen Flecken auf den Oberflügeln.

Naturf. XI. p. 80. no. 65. Ph. ***Fibulata*** iſt L. ***Fluctuata*** (v. *Rottemb.*).

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 61. Ph. ***Fluctuata***, das *weiſſe Bändchen.*

Wien. Schmett. p. 114. N.

1) Das Queerband vom Auſſenrande bis in den Mittelraum.

No. 2. *Merrettigſpannerraupe* (Cochleariae Armoraciae); *Merrettigſpanner*, Phal. ***Fluctuata.***

Schriften der Dronth. Geſ. III. p. 369. no. 35. Phal. *Fluctuata.* Nom. *Linn.*

Olaffens Reiſ. durch Isl. I. p. 320. no. b. Ph. ***Fluctuata.***

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 594. no. 2288.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus, *erucae viridis baculiformis.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 35. *Phalene du Pin.* Ph. *Fluctuata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 844.

Fabric. S. E. p. 634. no. 74. ***Phalaena Fluctuata.*** Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 443. Ph. ***Fluctuata.*** Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1473. Ph. ***Fluctuata.*** Nom. *Linn.*

Schaeff. Icon. t. 123. f. 6.

Geoffr. Inſ. II. p. 143. no. 69.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, lineolis faſciisque plurimis undulatis fuſcis, limbo ſubdentato.

La *Brocatelle d'argent.*
Long. 4. lign. *Larg.* 10. lign.

261. *Juniperata*, der *Wacholderspanner.*

Müller l. c. p. 718. no. 261. der *Wacholdervogel.*
Gleditsch Forstwiss. II. p. 1044. no. 1. Ph. *Juniperata*, die *aschgrauliche Wacholdermotte.*
Wien. Schmett. p. 110. K.
4) Ein wechselndes Queerband über die Oberflügel.
No. 29. *Krammetsspannerraupe* (Juniperi communis); *Krammetsspanner*, Ph. *Juniperata.*
Cathol. I. p. 405. Ph. *Juniperata.*
Clerk Phal. t. 2. f. 8.

262. *Sordiata*, die *Saloppe.*

Müller l. c. p. 718. no. 262. die *Saloppe.*
Füeßl. schweiz. Ins. p. 41. no. 791. Ph. *Sordiata.*
Bey uns *etwas selten.*
Rösels Insektenbel. III. p. 17. t. 3. f. 3. die grosse, weisslichbraune, gewässerte, mit Spitzen und Knöpflein besetzte Spannenraupe der *Rose von Jericho.*
Kleem. Beytr. I. p. 235. t. 28. f. 3. 4. der grosse mattledergelbe und mit etwas ausgekappten Hinterflügeln begabte *Spannenpapilion.*
Der hellumbrabraune mit hellledergelben Flecken, und ausgekappten Hinterflügeln besetzte *Spannenpapilion.*
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 32. Ph. *Sordiata*, die *Saloppe.*
Wien. Schmett. p. 105. Anm. Ph. *Sordiata.*
Naturf. XV. p. 65. t. 3. f. 15. (*Capieux.*) (*Mas.*)
Schaeff. Icon. t. 164. f. 6. 7.

263. *In-*

263. *Incanata*, das *Mäntelchen.*

Müller l. c. p. 718. no. 263. das *Mäntelchen.*
Berl. Mag. IV. p. 604. no. 62. Ph. *Incanata*, das *Mausefell.*
Durchaus weissgrau.
Wien. Schmett. p. 117. P.
No. 7. *Unbekannte Raupe: graulichter wellenschattigter Spanner*, Ph. *Incanata.*
Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 447. Ph. *Incanata.* Nom. *Linn.*
— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1474. Ph. *Incanata.* Nom. *Linn.*
Clerk Phal. t. 3. f. 3.

264. *Immutata*, der *Scheckspanner.*

Müller l. c. p. 719. no. 264. der *Nämliche.*
Wien. Schmett. p. 117. P.
No. 6. *Ehrenpreißspannerraupe* (Veronicae agrestis); *Ehrenpreisspanner*, Ph. *Immutata.*
Fabric. S. E. p. 637. no. 92. *Phalaena Immutata.*
Seticornis, alis niveis, strigis undatis, obscurioribus, margine postico nigro punctato.
Geoffr. Inf. II. p. 140. no. 63.
Phalaena seticornis spirilinguis, alis patentibus albidis, atomis cinerascentibus, et fascia undulata ferruginea.
Les Atomes à une bande.
Long. 5. lign.
Clerk Phal. t. 6. f. 11.

265. *Immorata*, der *Leimflügel.* *)

Müller l. c. p. 719. no. 265. der *Zauderer.*

*) *Nicht abgebildet.* Gar kein anderer Schriftsteller dabey angeführt.

266. *Remutata*, der *Randpunkt.*

Müller l. c. p. 719. no. 266. Ein *Anderer.*

Berl. Mag. IV. p. 606. no. 69. Ph. *Trilineata*, der *Dreystrich.*

Blassgelb, etwas grau bestäubt, mit drey braunen Queerlinien durch alle vier Flügel, und einem schwarzen Punkt in jedem Oberflügel.

Naturf. XI. p. 81. no. 69. Ph. *Trilineata* ist Ph. *Remutata* L. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 117. P.

No. 5. *Zaunwickenspannerraupe* (Viciae sepium); *Zaunwickenspanner*, Ph. *Remutata.*

Clerk Phal. t. 5. f. 12.

267. *Succenturiata*, der *Anhangspanner.*

Müller l. c. p. 719. no. 267. der *Anhang.*

Füeßl. schweiz. Ins. p. 41. no. 792. Ph. *Succenturiata.*

Bey uns *nicht selten.*

Röfels Insektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 30. t. 7. das gelblich grüne *Spannenräuplein der Pflaumenbäume*, mit dem dunklen Rückenstreif.

Frisch Ins. IV. p. 31. no. 16. 2 Pl. t. 16. der kleine *Spannenmesser* auf dem *Till.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 17. no. 27. Ph. *Succenturiata*, p. 36. no. 92. Ph. *Succenturiata.* *)

Wien. Schmett. p. 110. K.

No. 24.

führt. Sollte diese *Linné* allein gekannt haben? In der Faun. Suec. ed. 2. no. 1290. die genaueste Beschreibung.

*) Es muss aber an beyden Orten heissen: *Rösel* I. Phal. 3. t. 7. und nicht t. 8. weil no. 93. diese *Röselsche* t. 8. mit Recht als eine *neue* Geometra angeführt wird, die *Linné* Faun. Suec. ed. 2. Sepos. p. 548. no. 2286. beschrieben hat.

No. 24. *Unbekannte Raupe* *); *aſchgrauer lang-flüglichter Spanner*, Ph. *Succenturiata* (*Signata Scop.*).

Scop. Ent. carn. p. 231. no. 578. Ph. *Signata.* *Long.* lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{2}$.

Albida; alis *anticis ſupra* ſtrigis duabus obſoletis fuſceſcentibus, punctoque nigro utrinque.

Fabric. S. E. p. 637. no. 86. *Phalaena Succenturiata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 5. f. 2.

Geoffr. Inſ. II. p. 141. no. 64.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, ſuperioribus macula nigra, et faſcia duplici in extremo undulata.

La *Phalene blanche à tache et bande noire.* *Long.* 4. lign. *Larg.* 9. lign.

268. *Strigilata*, der *kammſtrichigte Spanner.*

Müller l. c. p. 719. no. 268. der *Kammſtrich.*

Wien. Schmett. p. 117. P.

No. 4. *Vogelwickenſpannerraupe* (Viciae Craccae); *Vogelwickenſpanner*, Ph. *Strigilata.* (*Variegata Scop.*)

Scop. Ent. carn. p. 222. no. 553. Ph. *Variegata.***) *Long.* lin. $6\frac{1}{2}$. *Lat.* $4\frac{1}{4}$.

*) Die Wiener Entomologen müſſen die *Röſelſche* I. Ph. 3. t. 7. nicht für die Succent. L. halten, weil ſie die Raupe für noch unbekannt ausgeben; indeſſen haben ſie doch den vom *Linné* angemerkten karakteriſtiſchen Umſtand mit angeführt: *langflüglichter Spanner:* und den hat die *Röſelſche.*

**) Hr. Rath *Scop.* ſetzt hinzu: Cf. Geom. *Immutata* Cel. *Linn.* Dies mag den Ritter bewogen haben, dieſe Varieg. mit ſeiner Immut. für einerley zu halten, und bey der letztern den Scop. zu zitiren.

Albida; atomis fafciisque undatis tenuibus fufcis variegata; alis omnibus puncto medio margineque nigro punctato utrinque.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1476. Ph. *Strigilata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 5. f. 2.

269. *Didymata*, der *Zwillingfpanner.*

Müller l. c. p. 720. no. 269. der *Doppellappen.*

Wien. Schmett. p. 113. M.

No. 13. *Megerkrautfpannerraupe* (Galii Mollaginis); *Megerkrautfpanner*, Ph. *Galiata.* (*Didymata Linn.*) *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 50. no. 438. Ph. *Didymata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1477. Ph. *Didymata.* Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 6. f. 10.

270. *Rectangulata*, der *Winkelhaken.*

Müller l. c. p. 720. der *Winkelhaken.*

Berl. Mag. IV. p. 524. no. 43. Ph. *Viridulata*, das *grüne Bändchen.*

Schwarzgrau mit hellgrünen Queerftreifen; die Flügel länglicht. **)

Naturf. XI. p. 73. no. 43. Ph. *Viridulata*, fcheint Ph. *Rectangulata* L. zu feyn; jedoch bin ich noch ungewifs. (v. *Rottemb.*)

Gleditfch Forftw. II. p. 750. no. 59. Ph. *Rectangulata*, der *rechte Winkel.*

Wien.

*) Die 2 braunen Fleckchen (macula fufca biloba L.) oder Punkte am Unterrande zeigen fich nur bey einigen *Spielarten.*

**) Hufnagels Rectangulata p. 606. no. 71. ift nicht des *Linné* Rectangulata. S. *Naturf.* XI. p. 82.

Wien. Schmett. p. 112. L.
No. 9. *Aepfelspannerraupe* (Pyri mali); *Aepfelspanner*, Ph. *Rectangulata.*
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1478. Phal. *Rectangulata.* Nom. *Linn.*
Fabric. S. E. p. 636. no. 85. *Phalaena Rectangulata.* Nom. *Linn.*
Clerk Phal. t. 8. f. 6.

271. *Ocellata*, das *Violetauge.* *)
Müller l. c. p. 720. no. 271. das *Violetauge.*

272. *Vrticata*, der *Nesselspanner.*
Müller l. c. p. 720. no. 272. t. 22. f. 12. der *Nesselspanner.*
Füessl. schweiz. Ins. p. 40. no. 793. Ph. *Vrticata*, der *Nesselspanner.*
Auf den *Nesseln* häufig.
Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 78. no. 225. p. 89. no. 258. Ph. *Vrticata*, der *Nesselspanner.*
Röseis Insektenbel. I. N. V. 4 Kl. p. 37. t. 14. der grünlichgraue dunkel und hellgestreifte *Blattwickler* auf der grofsen Brennessel.
Wien. Schmett. p. 121. B. kurzschnauzigte *Zünsler*, Ph. *Pyralides Brevipalpes.*
1) Die Flügel gewässert (undulatae).
No. 12. *Brennesselzünslerraupe* (Vrticae urentis); *Brennesselzünsler*, Ph. Pyr. *Vrticalis.*
List. Goed. p. 150. no. 61. f. 61.
Eruca *Munda*, quia puram se conservare solet.
— f. *Paresca*, quia *pari* eam persequuntur. *Raj.*

*) Nicht mit no. 258. *Ocellata* zu verwechseln. Diese gegenwärtige *nicht abgebildet.*

Raj. Hiſt. Inſ. p. 222. no. 73.

Phalaena minor, alis oblongis ex albo et coeruleo nigricante variis, ad exortum flavis.

Bekm. Epit. S. L. p. 167. no. 272. Phal. *Vrticata.* Nom. *Linn.*.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 151. no. 37. *Teigne de l'Ortie.*

Petiv. Gazoph. p. 51. *Phalaena minor* alba, maculis nigreſcentibus ornata.

Schaeff. Icon. t. 119. f. 1. 2.

Scop. Ent. carn. p. 220. no. 547. Ph. *Vrticata.*

Long. lin. 6¾. *Lat.* 4.

Alae albae; macularum fuſcarum ordinibus transverſis binis poſticis; thorace anoque flavis.

Poda Muſ. graec. t. 2. f. 2. Ph. *Saliſtaria.*

Hollar Inſ. t. 10. f. 3. (*Naturf.* IX. p. 223.) Phal. *Vrticata.*

Fabric. S. E. p. 639. no. 101. *Phalaena Vrticata.* Nom. *Linn.*

Larva 16-poda, nuda, albida, dorſo fuſco, collari bipunctato. Latet intra folium urticae, quod contorquet.

Conjungit *Geometras Linn.* cum *Pyralidibus.*

Pupa folliculata, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 448. Ph. *Hortulata*, et no. 449. Ph. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1479. Ph. *Vrticata.* Nom. *Linn.*

Réaum. Inſ. I. t. 49. f. 17. 18.

Geoffr. Inſ. II. p. 135. no. 54.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albo-fuſcoque nebuloſis, ano flava.

La *queue jaune.*

Long. 7. lign.

Degeer Inſ. I. p. 418. Mém. 13. t. 28. f. 12-19.

Chenille à ſeize jambes, verte, avec une raye d'un verd obſcur tout le long du dos, qui plie les feuilles de l'*Ortie*, et ſ'en nourrit.

— — p. 701. t. 28. f. 18. 19.

Phalene à antennes en filets; blanche, à taches noires nuancées, et à corcelet jaune.

— Tom. II. Part. I. p. 445. §. 1. no. 1. *Phalene queue jaune.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes horizontales blanches, à taches ovales noires, et dont le corcelet et le derriere ſont jaunes.

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. 13te Abh. p. 23. t. 28. f. 12-19.

Die ſechzehnfüſsige grüne *Neſſelraupe* mit der langen dunkelgrünen Rückenſtreife.

— — 4 Qu. p. 124. t. 28. f. 18. 19.

Ein weiſſer *Nachtvogel* mit fadenförmigen Fühlhörnern, ſchwarzſchattirten Flecken und gelbem Halskragen.

— II Th. I B. p. 326. no. 1. der *Gelbſchwanz.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen weiſſen Flügeln, mit eyförmigen ſchwarzen Flecken, gelbem Bruſtſchilde und Schwanze.

273. *Limbata*, der *Braunſaum.* *)

Müller l. c. p. 720. no. 273. der *Braunſaum.*

Wien. Schmett. p. 122. B.

4) Mit einem Mittelpunkt.

No. 20. *Ginſterzünſlerraupe* (Spartii juncei); *Ginſterzünſler*, *Pyralis Limbalis.* S. p. 121. Anm. (*) **)

Fa-

*) *Nicht abgebildet.*

**) Wo aber die Zahlen verſetzt zu ſeyn ſcheinen.

Fabric. S. E. p. 639. no. 102. *Phalaena Limbata.* Nom. *Linn.*

274. *Nymphaeata*, der *Seeblumenspanner*.

Müller l. c. p. 721. no. 274. der *Schwimmer.* — *Füeßl.* schweiz. Inf. p. 41. no. 794. Phal. *Nymphaeata*, der *Seeblumspanner*.

Im Grase, an feuchten Orten, nahe bey Seen und Sümpfen.

Berlin. Mag. IV. p. 618. no. 99. Ph. *Nitidulata*, der *Wasservogel*.

Shneeweifs, mit einigen irregulären hellbraunen Zeichnungen.

Naturf. XI. p. 89. no. 99. Ph. *Nitidulata* ist L. *Nymphaeata.* (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 121. B.

2) Die Flügel gegittert (*Reticulatae*). — No. 13. *Seeblumenzünslerraupe* (Nymphaeae luteae ac albae); *Seeblumenzünsler*, *Pyralis Nymphaealis*.

Raj. Hist. Inf. p. 227. no. 87. *Phalaena* minor, piscinas et stagna frequentans, alis utrisque albo et fusco colore variis.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 42. *Phalene de la Lentille d'eau*: Phal. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 851.

Act. Vps. 1736. p. 24. no. 52. *Papilio* alis planis e nitido albis, omnibus *reticulatis*.

Schaeff. Icon. t. 189. f. 4. 5.

Fabric. S. E. p. 640. no. 105. *Phalaena Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 450. Ph. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1480. Ph. *Nymphaeata.* Nom. *Linn.*

275. *Potamogata*, der *Saamenkrautspanner.*

Müller l. c. p. 721. no. 275. der *Saamkrautspanner.*

Füeßl. schweiz. Inf. p. 41. no. 794. Ph. *Potamogata*, der *Saamkrautspanner.*

Häufig am *Katzensee.*

Berl. Mag. IV. p. 604. no. 66. Ph. *Nymphaeata*, die *Nymphe.*

Glänzend weisslich, mit olivenbraunen in einander gezogenen Zeichnungen.

Naturf. XI. p. 80. no. 66. Ph. *Nymphaeata* ist L. *Potamogata.* (v. *Rottemb.*)

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 44. *Phalene du Potamogeton.* Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 852.

Act. Upsal. 1736. p. 24. no. 51. *Papilio* alis planis nitidis albis, inferioribus reticulatis.

Schaeff. Icon. t. 118. f. 5. 6.

Fabric. S. E. p. 642. no. 104. *Phalaena Potamogata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 451. Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1481. Ph. *Potamogata.* Nom. *Linn.*

276. *Stratiotata*, das *Amphibium.*

Müller l. c. p. 721. no. 276. das *Amphibium.*

Wien. Schmett. p. 123. B.

No. 23. *Wasseraloëzünslerraupe* (Stratiotis Aloidis); *Wasseraloëzünsler*, *Pyralis Stratiotalis.*

Mannigf. (neue) 3 Jahrg. p. 350.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 45. Phal. *Stratiotata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 854.

Geoffr. Inf. II. p. 142. no. 66.

Pha-

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, faſciis linearibus fuſcis, punctoque nigro.

La *Phalene griſe à lignes brunes et point noir.*

Long. 3½. lign. *Larg.* 9. lign.

Degeer Inſ. I. Mém. 16. p. 517. t. 37. f. 1-19.

Chenille aquatique verte, qui au premier coup d'œil ſemble être velue, et qui mange les feuilles du *Stratiotes* ou de l'*Aloë Paluſtris* de Bauhin.

— — p. 702. t. 37. f. 16-18.

Phalene à antennes en filets, à ailes planes, griſes, nuancées de blanc ſur le mâle, et brunes ſur la femelle: d'une Chenille aquatique du *Stratiotes.*

— *Ueberſ.* I. 3 Qu. p. 85. t. 37. f. 1-19.

Eine grüne *Waſſerraupe*, die beym erſten Anblick rauch ſcheint, und die Blätter der Waſſeraloe friſst.

— — 4 Qu. p. 125. t. 37. f. 16-18.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, flachen, grauen, bey dem *Männchen* weiſs ſchattirten, und bey dem *Weibchen* braunen Flügeln, von einer *Waſſerraupe* der Waſſeraloe.

— II. Part. I. p. 426. no. 15. *Phalene aquatique du Stratiotes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes rabatues griſes ou brunes avec un point blanc bordé de noir, et dont les ailes inférieures ſont blanches à rayes noires.

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 309. no. 15. die *Waſſeraloëphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und grauen oder braunen nie-

der-

derhangenden Flügeln, mit einem weissen schwarzgerändelten Punkt, und weissen schwarzgestreiften Unterflügeln.

277. *Paludata*, der *Sumpfspanner.* *)

Müller l. c. p. 721. no. 277. der *Morastläufer.*

Berl. Mag. IV. p. 526. no. 47. Phal. *Institata*, die *Kreidenmotte.*

Ganz schneeweiss; der Rand mit gelben Flecken; in den Unterflügeln ein schwarzer Punkt.

Naturf. XI. p. 74. no. 47. Ph. *Institata:* wo es sehr wahrscheinlich gemacht wird, dass diese Inst. L. *Paludata* sey. (v. *Rottemb.*)

278. *Lemnata*, der *Wasserlinsenspanner.*

Müller l. c. p. 721. no. 278. der *Wasserschmetterling.*

Berl. Mag. IV. p. 614. no. 88. Ph. *Gemmata*, der *Edelstein.*

Schneeweiss, in der Mitte eines jeden Flügels ein schwarzer Punkt; der Hinterrand der Unterflügel schwarz mit einer Reihe weisser Punkte.

Naturf. XI. p. 86. no. 88. Ph. *Gemmata* ist L. *Lemnata*, und beynahe der *kleinste* unter den Spannmessern. (v. *Rottemb.*)

Wien. Schmett. p. 121. B.

5) Einfarbigte (Vnicolores).

No. 30. *Wasserlinsenzünslerraupe* (Lemnae majoris).

La *Chenille de lentille aquatique Réaum.*

Wasserlinsenzünsler, Ph. *Lemnalis.*

Raj.

*) *Nicht abgebildet.*

Raj. Hist. Inf. p. 205. no. 102.
Phalaena aquatica minima alba sive argentea.
Fabric. S. E. p. 640. no. 106. *Phalaena Lemnata.* Nom. *Linn.*
Réaum. Inf. II. t. 32. f. 1 et 13.
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 128. no. 1482. Ph. *Lemnata.* Nom. *Linn.*
Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 43. *Phalene de lentille d'eau;* Ph. *Lemnata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 852.

279. *Hyalinata*, der *amerikanische Durchsichtige.* *)
Müller l. c. p. 722. no. 279. der *Dreyeckflügel.*
Fabric. S. E. p. 640. no. 103. *Phalaena hyalinata.* Nom. *Linn.*
Parva; abdomen cylindricum, niveum, ano valde barbato, barba nigra.

280. *Cingulata*, der *Ringelflügel.*
Müller l. c. p. 722. no. 280. der *Ringelflügel.*
Wien. Schmett. p. 123. B.
6) Mit hellen Wellenstrichen (Albido-repandae).
No. 31. *Unbekannte Raupe. Schwarzer Zünsler mit weissem Queerstriche*, Ph. *Cingulalis.*
Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 96. Phal. *Cingulata.* Nom. *Linn.* ex Faun. Suec. ed. 1. no. 906.
Act. Upsal. 1736. p. 23. no. 38. *Papilio* alis planis nigris; linea transversa alba.
Fabric. S. E p. 638. no. 93. *Phalaena Cingulata.* Nom. *Linn.*
Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 32.
Tinea nigra, fascia transversa alba.

La

*) *Nicht abgebildet.*

La *Teigne cordeliere.*

Long. 2½. lign.

Clerk Phal. t. 2. f. 10.

281. *Brumata*, der *Froſtſchmetterling.*

Müller l. c. p. 722. no. 281. der *Winterſchmetterling.*

Füeßl. ſchweiz. Inſ. p. 41. no. 796. Ph. *Brumata*, der *Winterſpanner.*

Bey uns nicht ſelten, doch niemals ſchädlich.

Berl. Mag. IV. p. 612. no. 85. Ph. *Hyemata*, der *Spätling.*

Gelblichgrau mit blaſsbraunen ausgekappten Queerlinien.

Naturf. XI. p. 85. no. 85. Ph. *Hyemata* iſt L. *Brumata.* (v. *Rottemb.*)

Kleem. Beytr. I. p. 256. t. 31. f. 1-12.

Die zur 3ten Kl. der N. V. gehörige ſchädliche, geſellige, glatte, grüne, mit weiſſen Streifen gezierte, und mit 10 Füſsen verſehene *Spannraupe.* *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 58. Ph. *Brumata*, der *Froſtſchmetterling.*

Friſch Inſ. V. p. 35. no. 14. 2 Pl. t. 14. der grüne *Ausſpanner* mit drey weiſſen Linien auf jeder Seite.

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 787. no. 13. Ph. *Brumata*, der *Froſtnachtſchmetterling.*

Wien. Schmett. p. 109. K.

No. 9. *Frühebirnſpannerraupe* (Pyri communis); *Frühebirnſpanner*, G. *Brumata* (Fem. aptera).

*) Vielleicht eine Mittelart: Ph. *Brumata* media. *Glaſer* von ſchädl. Raupen p. 18.

Glaſers phyſikal. ökon. Abhandl. von den ſchädlichen Raupen der Obſtbäume, verbeſſ. Aufl. p. 18. 117. 150. Ph. *Brumata* minor, der *Froſtnacht-ſchmetterling.*

Bekmanns phyſ. ökon. Bibl. V. p. 249. Phal. *Brumata.*

Abhandl. der ſchwed. Akad. der Wiſſ. XXXII. p. 19. Bericht vom Fangen der *Froſtnachtſchmetterlinge* (*Cronſtedt*).

— — p. 26. angeſtellte Verſuche, die *Froſtſchmetterlinge* zu hindern. (*Adlerheim.*)

Raj. Hiſt. Inſ. p. 181. no. 4.

Phalaena alis latis, exterioribus albicantibus cum tinctura viridi aut coerulea.

— — p. 369. no. 9. *Eruca* geometra parva, pallide ſeu ex flavo virens, lineolis albicantibus tum ſecundum longitudinem tum transverſis.

Fabric. S. E. p. 636. no. 81. *Phalaena Brumata.* Nom. *Linn.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 424. Ph. *Brumata.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Prodr. p. 128. no. 1483. Phal. *Brumata.* Nom. *Linn.*

Degeer Inſ. 1. Mém. XI. p. 360. t. 24. f. 11-16.

Chenille arpenteuſe verte, à rayes longitudinales blanches qui plie ou attache enſemble les feuilles de pluſieurs eſpeces d'arbres, et qui ſ'en nourrit.

Le Papillon *femelle* de cette Chenille eſt *ſans ailes.*

— — p. 700. t. 24. f. 11. 12. 13. 14.

Phalene à antennes en filets, à longs poils; d'un brun clair et griſâtre, dont les ailes de la femelle ſont très-courtes.

Degeer

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 452. no. 6. *Phalene hyemale.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues d'un gris-brun à lignes transverſes plus obſcures, et dont la femelle manque d'ailes.

— *Ueberſ.* I. 2 Qu. 11te Abh. p. 107. t. 24. f. 11-16.

Die grüne *Spannraupe*, mit langen weiſſen Streifen, welche die Blätter von vieler Art Bäumen, die ihr zur Nahrung dienen, zuſammenwickelt, und von der das Schmetterlingsweibchen *keine Flügel* hat.

— — 4 Qu. p. 123. t. 24. f. 11-14.

Ein hellbrauner graulicher Nachtvogel, mit fadenförmigen langbehaarten Fühlhörnern, deſſen Weibchen ſehr kurze Flügel hat.

— II B. I Th. p. 331. no. 6. die *Winterphaläne.*

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und breiten graubraunen Flügeln, mit dunklern Queerlinien; das Weibchen ungeflügelt.

Unabgebildete Linnéiſche Spanner.

1. *Pennaria* no. 209.
2. *Pantaria* no. 218.
3. *Sacraria* no. 220.
4. *Veſpertaria* no. 224.
5. *Tricinctaria* no. 227.
6. *Caffraria* no. 228.
7. *Porata* no. 233
8. *Ocellata* no. 258
9. *Immorata* no. 265.
10. *Ocellata* no. 271.
11. *Limbata* no. 273.

12. *Paludata* no. 277.
13. *Hyalinata* no. 279.

Neue Arten von Spannern.
(Geometrae.)

1. Ph. *Geom. Hirtaria*, der *Rauchflügel.* *)

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. Anim. p. 225.
Pectinicornis; alis *hirtis* canis: ftrigis duabus nigris, pofterioribus approximatis, antennis atris.

— Faun. Suec. ed. 2. p. 325. no. 1236.

Clerk Phal. t. 7. f. 1.

Wien. Schmett. p. 99. C. *Spinnerförmige Spanner.* No. 3. *Kirfchenfpannerraupe* (Pruni Cerafi); *Kirfchenfpanner*, G. *Hirtaria.*

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 11. p. 354. t. 22. f. 6-9. **)
Grande Chenille arpenteufe en bâton, à dix jambes, brune, à rayes longitudinales, qui tirent fur la couleur de chair, dont le haut de la tête n'eft point refendu, et qui mange les feuilles du Saule et de l'Ozier.

— — p. 697. t. 22. f. 9.
Phalene à antennes à barbes noires, fans trompe, grife à rayes ondées noirâtres fur les ailes, et à corcelet tacheté de noir.

— Tom. II. Part. I. p. 306. no. 5. *Phalene à ailes velues.*
Phalene à antennes barbues, fans trompe; à ailes presque horizontales grifes velues, avec des mouchetures noires fur les nervures.

Degeer

*) An G. *Hirtaria Fabric.* Mantiff. p. 286? Pectinicornis, alis cinereis; ftriga fufca undata albae innata.

**) Die Puppe liegt *über* 19 *Monat*, ehe der Vogel auskömmt.

Degeer Ueberſ. I. 11te Abh. 2 Qu. p. 103. t. 22. f. 6-9.

Der groſse, braune, zehnfüſsige, fleiſchfarbig geſtreifte *Stockſpanner* auf den Bruch- und Zachweiden mit ungeſpaltenem Kopfe.

— — 4 Qu. p. 120. t. 22. f. 9.

Ein grauer *Nachtvogel* mit ſchwarzen bärtigen Fühlhörnern, ohne Saugrüſſel, mit wellenförmigen ſchwärzlichen Streifen auf den Flügeln, und einem ſchwarzgefleckten Halskragen.

— II Th. I B. p. 220. no. 5. der *Rauchflügel.*

Die ohnzüngige *Phaläne* mit bärtigen Fühlhörnern, und mit grauen, haarichten, auf den Adern ſchwarzgefleckten, beynahe horizontal liegenden Flügeln.

2. *Defoliaria*, der *Blatträuber.*

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. p. 225. Ph. *Defoliaria.*

Pectinicornis; alis griſeis, medio albis; puncto lituraque poſtica nigris; *Femina aptera.*

— Faun. Suec. ed. 2. p. 326. no. 1238. Ph. *Defoliaria.*

Clerk Phal. t. 7. f. 4.

Réaum. Inſ. II. t. 30.

Röſels Inſektenbel. III. p. 83. t. 14.

Die zu der 3 Kl. der N. V. gehörige rothbraune *Spannenraupe*, nebſt ihrer Verwandlung in einen *ungeflügelten* Papilion weibliches Geſchlechts. (*Weibchen.*)

— p. 241. t. 40. f. 6. das *geflügelte Männchen.*

Füeſsl. ſchweiz. Inſ. p. 40. t. 766. Ph. *Defoliaria.*

Bey uns ſehr gemein auf allen Arten von Stauden, Gewächſen und Bäumen.

— Magaz. der Entomol. II. p. 36. Ph. *Defoliaria.* (Chorh. *Meyer.*)

Berl. Mag. IV. p. 518. no. 29. Ph. *Pulveraria*, die *Sommersprosse*.

Okergelb mit einer breiten braunen Binde, und vielen braunen Punkten; das *Weibchen* hat keine Flügel.

Naturforsch. XI. p. 70. no. 29. Ph. *Pulveraria* ist L. *Defoliaria.* (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Forstwiss. I. p. 390. no. 9. Ph. *Pulveraria*, die *Sommersprosse*.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. XXXII. p. 21. Ph. *Defoliaria.*

Glasers physikal. ökon. Abhandl. von schädlichen Raupen der Obstbäume p. 24. 30. die *große Art von Frostnachtschmetterlingen*: Ph. *Brumata maior*, Ph. *Defoliaria* t. 2. f. 1-6.

Mülleri Faun. Fr. p. 48. no. 424. Ph. *Defoliaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1451. Ph. *Defoliaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. S. E. p. 625. no. 30. *Phalaena Defoliaria.* Nom. *Linn.*

— Femina aptera, nigro-*punctata.*
Larva ferruginea, stria laterali sulphurea.
Pupa brunnea.

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 313. no. 236. c. Phal. *Defoliaria*, der *Schabflügel.*

3. *8-maculata*, der *Achtfleck.*

Linn. Mantiss. p. 540.

Seticornis, alis nigris; omnibus maculis duabus albis rotundatis. Habitat in *Anglia.*

Müllers Suppl. und Reg. B. p. 313. no. 236. d. Ph. *8-maculata*, der *Engländer.*

4. *Ribearia*, der *Johannisbeerſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 326. no. 1239.
Pectinicornis; alis griſeis fuſco-ſubfaſciatis, faſcia poſtica moniliformi.
Clerk Phal. t. 6. f. 5. Ph. *Ribeata.*

5. *Pendularia*, der *Hangpuppenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. p. 327. no. 1244. Ph. *Pendularia.*
Pectinicornis; alis omnibus cinereis ocello ferrugineo ſtrigaque nigro-punctata.
Habitat in *Salice.*
Larva *Incarnata*, *pupa pendula.*
Clerk Phal. t. 7. f. 5.
Wien. Schmett. p. 107. H. *wechſelnde Spanner.*
No. 1. *Hangelbirkenſpannerraupe* (Betulae albae); *Hangelbirkenſpanner*, Ph. *Pendularia.*
Réaum. Inſ. II. ed. 4. p. 364-366. t. 29. f. 1.
Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 360. no. 2. t. 6. f. 7. *Phalene à Criſalide ſuſpendue.*
Phalene à antennes barbues, à trompe, à ailes horizontales d'un blanc ſale un peu cendré avec deux lignes transverſes de points noirs et un petit oeil roux, et dont les inférieures font un angle.
— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 262. no. 2. t. 6. f. 7. die *Hangpuppenphaläne.*
Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und horizontalen weiſsgraulichen, etwas aſchfarbigen Flügeln, mit zwo Queerlinien von ſchwarzen Punkten, und einem kleinen braunröthlichen Auge, deren Unterflügel einen Winkel machen.

6. *Carbonaria*, der *Kohlenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 327. no. 1246.

Pectinicornis *nigra;* alis ſtrigis tribus albidis undatis ſubinterruptis; antica remotiore.

Clerk Phal. t. 1. f. 11. Ph. *Carbonaria.*

7. *Fuliginaria*, der *Schlottfegerſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 327. no. 1247. Ph. *Fuliginaria.*

Pectinicornis; alis nigris albo punctato-vndulatis, ſubtus griſeſcentibus.

Clerk Phal. t. 8. f. 7.

Fabric. S. E. p. 629. no. 46. *Phalaena fuliginaria.*

Pectinicornis; alis atris, albo-ſubfaſciatis; ſubtus griſeis; faſciis fuſcis.

8. *Margaritaria*, der *Perlflügel.* *)

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 328. no. 1249.

Subpectinicornis; alis *margaritaceis;* faſcia rivulari luteſcente, extremitatibus fuſcis. — *Holmiae.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1452. Ph. *Margaritaria.* Nom. *Linn.*

9. *Quadrifaſciaria*, die *Vierbinde.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1253.

Pectinicornis, alis griſeis, faſcia fuſca undata, puncto atro.

Clerk Phal. t. 6. f. 4. Ph. *Quadrifaſciata.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 48. no. 431. Ph. *Quadrifaſciaria.* Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 126. no. 1453. Ph. *Quadrifaſciaria.* Nom. *Linn.*

Fabric. Mantiſſ. p. 289. no. 77·78.

Se-

*) Nicht mit *Linn. Margaritata* no. 231. zu verwechſeln.

Seticornis; alis griſeo-fuſcis, faſcia lata nigra; puncto ſubocellari nigro.

In Europae *pratis ſylvaticis.*

Alae ſubtus albidae puncto centrali ſtrigisque nigris.

Wien. Schmett. p. 112. M. *Eckeſtreifigte Spanner.* No. 6. *Unbek. Raupe; bräunlicher düſternſtreifiger Spanner*, Ph. *Quadrifaſciaria.*

10. *Bidentata*, der *zweyzähnichte Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 329. no. 1255.

Seticornis, alis eroſis griſeis, puncto nigro ocellari; ſuperioribus faſcia ſaturatiore. — In *Roſa et Alno.*

Clerk Phal. t. 7. f. 2. Geometra *Bidentata.*

Degeer Inſ. Tom. I. Mém. 12. p. 378. t. 25. f. 1-6.

Chenille arpenteuſe en bâton, d'un brun griſeatre; à quatorze jambes, ou à ſix intermédiaires de grandeur inégale, quatre de ces jambes étant très-petites.

— — p. 695. t. 25. f. 6.

Phalene à antennes à barbes et à trompe; à ailes découpées d'un brun griſeatre, dont les ſupérieures ſont traverſées de deux rayes ondées obſcures, qui renferment un point noir.

— Tom. II. Part. I. p. 343. no. 1.

Phalene brune à deux rayes et un point.

Phalene à antennes barbues, à trompe; à ailes découpées horizontales d'un brun griſeatre avec deux rayes tranſverſes ondées obſcures bordées de blanc et un point noir au milieu.

— *Ueberſ.* I. 12te Abh. 2 Qu. p. 121. t. 25. f. 1-6.

Die

Die graulichbraune, vierzehnfüſsige aſtförmige *Spannraupe* mit ſechs ungleichen Bauchfüſſen, darunter viere ſehr klein ſind.

Degeer Ueberſ. I. 4. Qu. p. 118. t. 25. f. 6.

Ein *Nachtvogel* mit bärtigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und braungraulichen ausgezackten Flügeln, davon die Oberflügel zwo dunkle wellenförmige Streifen haben, zwiſchen welchen ein ſchwarzer Punkt befindlich iſt.

— II Th. I B. p. 249. no. 1. die *braune zwogeſtreifte und einpunktirte Phalene.*

Eine *Phaläne* mit kammförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel und gezackten horizontalſtehenden, braungraulichen Flügeln, mit zwo wellenförmigen dunkeln, weiſsgerändelten Queerſtreifen, und einem ſchwarzen Mittelpunkt.

11. *Teſtata*, der *muſchelbraune Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 331. no. 1262.

Seticornis; alis ſuperioribus fulveſcentibus; macula pallida ſtriga alba, lineolaque apicis alba. — *Maiuscula.*

12. *Citrata*, der *Zitronblätterſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 332. no. 1265.

Citrata, ſeticornis, alis griſeis macula ſubterminali albo-fulva ſtriaque alba, apicis lineola fuſca.

Habitat in Foliis *Citri*, quae noctu edebat Larva Geometra viridi-palleſcens. Magnitudo Ph. *Piniariae.*

13. *Liturata*, der *gelbgeſtrichte Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 334. no. 1273.

Seti-

Seticornis, alis ſubangulatis cineraſcentibus; litura poſtica flava, apice ſubtus dealbatis.

Clerk Phal. t. 6. f. 6. Ph. *Liturata.*

Wien. Schmett. p. 106. G.

No. 10. *Unbek. Raupe; hellgrauer gelbſleckigter Spanner*, Ph. *Liturata.*

14. *Lividata*, der *grüngelbe Spanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 337. no. 1285.

Seticornis; alis antice pallidis ſtriga fuſca, poſtice fuſcis ſtriga pallida.

Clerk Phal. t. 5. f. 10.

15. *Ferrugata*, der *kleine Roſtſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 338. no. 1292.

Seticornis; alis purpuraſcentibus; ſtrigis tribus albidis, poſtice cinereis, macula didyma fuſca.

Fabric. S. E. 637. no. 87. Ph. *Ferrugata.* Nom. *Linn.*

Wien. Schmett. p. 113. M. *Schuppenraupen.*

No. 11. *Vogelkrautſpannerraupe* (Alſines mediae); *Vogelkrautſpanner*, G. *Ferrugaria* (*Ferrugata* L.).

16. *Abſinthiata*, der *Wermuthſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 339. no. 1296.

Seticornis; alis obſcure cinereis puncto lituriſque tribus nigris marginalibus, punctoque ani albo.

Clerk Phal. t. 8. f. 9. Ph. *Abſinthiata.*

17. *Purpurata*, die *Purpurbinde.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. no. 1302.

Seti-

Seticornis; alis ſuperioribus vireſcentibus; faſciis duabus *purpureis;* inferioribus luteis ſubtus litura purpuraſcente.

Fabric. S. E. p. 637. no. 91. Ph. *Purpurata.* Nom. *Linn.*

18. *Albo-punctata*, der *Weiſspunkt.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſita*, p. 548. no. 2285.
Pectinicornis ſpirilinguis; alis patentibus cinereis; faſciis duabus fuſcis. — Habitat in *Vmbroſis.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 34. Nom. *Linn.*

19. *Rubroſtriata*, der *rothe Rückenſtreif.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 548. no. 2286.
Seticornis, ſpirilinguis, alis patentibus canis, faſciis cinereis duabus tribusve punctoque nigro. Habitat in pratis arboribus conſitis.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 152. no. 39. Nom. *Linn.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 32. t. 8. das dickere grüne *Spannräuplein mit dem rothen Rückenſtreif.*

20. *Graminea*, der *Grasſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. *Sepoſ.* p. 548. no. 2287.
Seticornis, ſpirilinguis; alis patentibus flaveſcente-niveis, faſciisque linearibus nigris. Habitat in *Pratis* et in *Gramine.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 153. no. 49. Nom. *Linn.*

21. *Muſcaria*, der *Fliegenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2289.

Pha-

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis incumbentibus griſeis, albo-fulvoque reticulato-maculatis.

Habitat in *Sambuco.*

Magnitudo *maioris muſcae.*

Liſt. Goed. p. 136. f. 55.

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 156. no. 61. *Phalene du Sureau.* Nom. *Linn.*

22. *Humulata*, der *Hopfenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2291.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis depreſſis fuſcis, linea utrinque ferruginea, humeris gibbis, faſciculoque medii dorſi.

23. *Hortulana*, der *Gartenſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 549. no. 2292.

Seticornis, ſpirilinguis, alis deflexis pallide griſeis; faſcia ſaturatiore. Habitat in *hortis.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 75. *Phalene de Jardin.* Nom. *Linn.*

24. *Arbuſtata*, der *Strauchſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2293.

Seticornis, ſpirilinguis; alis deflexis ſupra fuſcis, margine albam lineolam emittentibus.

Inter *Arbuſta.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 76. Nom. *Linn.*

25. *Domeſtica*, der *Hausſpanner.*

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2294.

Seticornis, ſpirilinguis; *corniculis* duobus recurvis baſi criſtatis, alis plano incumbentibus.

In

In *Domibus*, frequens Vere.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 77. Nom. *Linn.*

Réaum. Inſ. I. t. 18. f. 12-14.

Schriften der Dronth. Geſellſch. IV. p. 286. no. 47. Nom. *Linn.* Norv. *Forvaeld.*

26. *Sylveſtris*, der *Waldſpanner*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 550. no. 2295.

Seticornis, ſpirilinguis, corniculis duobus ſubulatis recurvis, alis nigricantibus ſupra albo-maculatis. — In *Nemoribus.*

Syſt. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 78. *Phalene des bosquets.* Nom. *Linn.*

27. *Tetralunaria*, das *Fenſterchen.*

Berlin. Mag. IV. p. 506. no. 3.

Die innere Hälfte aller vier Flügel meiſt braun, mit einem durchſichtigen halben Rande, die äuſsere Hälfte weiſslichgelb mit braunen Punkten; der äuſsere Rand ausgeſchweift, und ausgezakt.

Naturf. XI. p. 64. no. 3. G. *Tetralunaria.*

1) In der Gröſse der *Syringaria.*
2) Das *Männchen* merklich kleiner.
3) Der Vogel einer der ſeltenſten und ſchönſten. *) (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 550. no. 8. Ph. *Tetralunaria*, das *Fenſterchen.*

28. *Repandaria*, der *breite Saum.*

Berl. Mag. IV. p. 508. no. 6.

Die

*) Deſſen *Abbildung* zu wünſchen.

Die Flügel ausgeſchwungen; das innere Feld pomeranzengelb mit einem braunen Queerſtrich, das äuſsere Feld etwas ins Bläuliche fallend.

Naturf. XI. p. 65. no. 6. Ph. *Repandaria.* In der Gröſse der Ph. *Vavaria* L. no. 219. (v. *Rottemburg.*)

29. *Fuliginaria*, die *Kellermotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 508. no. 7.

Dunkelerdfarbig, mit einigen hellgrünen Flecken.

— p. 621. C. Raupe ſoll *Moos* freſſen.

Naturf. XI. p. 65. no. 7. Ph. *Fuliginaria.* Das *Weibchen* in der Gröſse der *Vavaria*; das *Männchen* kleiner. (v. *Rottemb.*)

30. *Vrticaria*, die *Neſſelmotte.* *)

Berl. Magaz. IV. p. 508. no. 8.

Weiſsgrau, braun beſtäubt mit unterbrochenen ausgekappten braunen Queerſtreifen.

— p. 621. D. die kleinere Art wahrſcheinlich die *Männchen.*

Naturf. XI. p. 65. no. 8. Ph. *Vrticaria.* In der Gröſse der *Atomaria* L. no. 214. Die *Raupe* zu Ende des Auguſts auf dem *Rhamno.* (v. *Rottemb.*)

31. *Flammeolaria*, die *Flammenmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 510. no. 11.

Weiſs-

*) Obgleich die Beſchreibung des *Linné* von ſeiner *Vrticata* no. 272. einigermaſsen mit dieſer übereinkömmt, ſo iſt dennoch die Hufnagelſche eine ganz eigene Art, wie der Hr. von *Rottemburg* ebenfalls zu beſtärigen ſcheint.

Weifsgelb mit okergelben geflammten Zeichnungen, und einem fchwarzen Punkt in der Mitte der Oberflügel.

Naturf. XI. p. 66. no. 11. Ph. *Flammeolaria.* Einer der *kleinften* diefer Klaffe. (v. *Rottemb.*)

32. *Atomaria*, der *faule Efel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 510. no. 12.

Weifsgrau, mit braunen Queerftreifen, die Flügel mit wenigen Staubfedern befetzt.

— p. 622. F. Die *Phaläne* bekömmt man felten zu fehen, *theils* weil fie wie Baumrinde ausfieht; *theils* weil fie fchon fo zeitig im *April* auskömmt.

Naturf. XI. p. 66. no. 12. Ph. *Atomaria.* Nicht *Atomaria* L. no. 214. ob fie gleich die Gröfse und den Bau derfelben hat. Der *Augenfchein* unterfcheidet beyde am deutlichften. (v. *Rottemb.*)

Kleem. Beytr. I. p. 299. t. 35. f. 1. 2. 3. 4. *Raupe* und *Puppe.* Die grofse glatte, bald dunkelrothbraune, bald röthlichgraue, mit vielen zarten Linien überzogene, und mit etlichen Reihen fchöner gelber Queerflecken auf dem Rücken gezierte, zehnfüfsige *Spannraupe.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 136.

Gleditfch Forftwiff. I. p. 390. no. 7. Ph. *Atomaria*, der *faule Efel.*

33. *Lichenaria*, die *Moosmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 512. no. 15.

Der Grund hellgrau mit vielen, theils dunkelgrünen, theils braunen und grauen Punkten, Zeichnungen und Strichen.

Naturf. XI. p. 67. no. 15. Ph. *Lichenaria.* In der Gröſse der *Vararia* L. Farben und Zeichnungen, auch die ganze Geſtalt der Raupe dem *Moos* ſo ähnlich, daſs man ſie, wenn ſie darauf ſitzt, kaum davon unterſcheiden kann. (v. *Rottemb.*)

Knochs Beyträge zur Inſektengeſchichte, I. St. p. 49. no. 10. t. 3. f. 5-9.

Ph. G. pectinicornis, alis griſeis populeo cupreoque adſperſis; anticis lineis duabus vndulatis nigris albo-diſtinctis, poſticis vna.

34. *Similaria*, der *Semmelvogel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 512. no. 16.

Weiſslichgelb mit braunen Binden, und vielen dergleichen Punkten.

Naturf. XI. p. 67. no. 16. Ph. *Similaria.* Etwas gröſser als *Lichenaria;* aber ſchwer zu beſchreiben. (v. *Rottemb.*)

35. *Binaria*, der *Sperber.*

Berlin. Magaz. IV. p. 516. no. 21.

Okerbraun, mit zween ſchwarzen Punkten auf jedem Oberflügel, deren Spitzen ſichelförmig ſind; das Weibchen etwas heller.

Naturf. XI. p. 68. no. 21. Ph. *Binaria*, das *Weibchen* die Gröſse der *Falcataria*; das *Männchen* kaum halb ſo groſs. (v. *Rottemb.*)

36. *Sepiaria*, die *Zaunmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 516. no. 23.

Dunkel aſchgrau, mit zwo ſchmalen braunen Queerſtreifen.

— p. 624. *Raupe und Phaläne* häufig an alten breternen *bemooſten Zäunen.*

Naturf. XI. p. 69. no. 23. Ph. *Sepiaria.* Von den *kleinſten.* (v. *Rottemb.*)

37. *Faſciolaria*, die *Bandmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 516. no. 24.

Braun, mit gelblichen Binden; der äuſsre Rand gelblich.

Naturf. XI. p. 70. no. 24. Ph. *Faſciolaria.* Auch unter die *kleinſten.* Die *Raupe* auf *Tannen.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 752. no. 72. Ph. *Faſciolaria*, die *Bandmotte.*

38. *Arenaria*, die *Sandmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 518. no. 28.

Weiſsgrau, braun beſtäubt, mit geſchlungenen Queerſtreifen durch die Oberflügel.

39. *Quercinaria*, das *gelbe Blatt.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 31.

Strohgelb, mit zwo braunen Streifen durch die Oberflügel; alle vier Flügel ausgeſchweift, und ausgezackt.

— p. 624. L. Viel ähnliches mit *Alniaria.*

Naturf. XI. p. 70. no. 31. Ph. *Quercinaria.* Auf beyden Seiten aller vier Flügel blaſsſchwefelgelb. — In der Gröſse der Ph. *Syringaria* — nicht das Männchen der Ph. *Alniaria.* (v. *Rottemb.*)

Kleemanns Beytr. I. p. 219. t. 26. a b. Der zur 3ten Kl. der N V. gehörige hellledergelbe *Spannenpapilion* mit zierlich aus- und eingeſchweiften, auch bräunlichgelb gezeichneten Flügeln.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 655. no. 40. Ph. *Quercinaria*, das *gelbe Blatt.*

40. *Ace-*

40. *Aceraria*, der *Widder*.

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 33.
Ganz leberfarbig, mit kleinen gelblichen Flecken besäet.

— p. 624. M. Noch eine Art mit weisslichem Grunde mit verschiedenen, zum Theil unterbrochenen Queerstreifen. Vielleicht das *Weibchen*, wie die Fühlhörner anzuzeigen scheinen.

Naturf. XI. p. 71. no. 33. Ph. *Aceraria.* Das *Weibchen* hat eine *weiße* Grundfarbe. Das *Männchen* weit stärker mit braunen Punkten besäet. Die Grösse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

41. *Pruinata*, die *Reifmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 34.
Weisslichgrün, wie bestäubt, mit dunkelgrünen, und einer weissen ausgekappten Queerstreife.

— p. 625. N. Einige haben keine grüne Farbe, sondern fallen ganz ins Weissliche, oder ins Röthlichgraue.

Naturf. XI. p. 72. no. 34. Ph. *Pruinata.* Eigentlich *Pruinaria.* Die Grundfarbe aller vier Flügel weisslichgrün. In der Grösse der *Vavaria* und *Pectinicornis.* (v. *Rottemb.*)

42. *Pustulata*, die *Beule.*

Berlin. Magaz. IV. p. 520. no. 35.
Schön gelblich grün, mit einem gelblichgrauen Fleck an dem äussern Ende des innern Randes aller vier Flügel, dergleichen auch an dem Vorderrande des Unterflügels.

Naturf. XI. p. 72. no. 35. Ph. *Pustulata.*
Der gelblichgraue Fleck am Unterwinkel jedes

jedes Flügels (in angulo ani). In der Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 655. no. 41. Ph. *Puſtulata,* die *Beule.*

43. *Serrata,* die *Säge.*

Berlin. Magaz. IV. p. 522. no. 36.

Der Grund weiſslich, mit ſehr vielen hellbraunen ausgekappten Queerlinien.

Naturf. XI. p. 72. no. 36. Ph. *Serrata.*

In der Gröſse der *Puſtulata.* (v. *Rottemb.*)

44. *Siterata,* das *grüne Moos.*

Berlin. Magaz. IV. p. 522. no. 39.

Dunkelgrün mit Braun vermiſcht, und einer breiten braunen Binde.

Naturf. XI. p. 73. no. 39. Ph. *Siterata.*

In der Gröſse der *Fimbriata.* (v. *Rottemb.*)

45. *Concatenata,* die *Kette.*

Berlin. Magaz. IV. p. 522. no. 40.

Schmutziggelb mit verſchiedenen grauen, ausgekappten unterbrochenen Queerſtreifen.

46. *Fuſcata,* der *Sperling.*

Berlin. Magaz. IV. p. 524. no. 44.

Durchaus bräunlich grau.

Naturf. XI. p. 73 no. 44 Ph. *Fuſcata.*

Zu den kleinſten Arten. Nicht gröſser, als die *Viridulata.* (v. *Rottemb.*)

47. *Hortulata,* der *Fuchskopf.*

Berlin. Magaz. IV. p. 524. no. 45.

Weiſs,

Weiſs, mit dunkelgrauen Flecken, der Rückenſchild und Kopf gelb.

48. *Albipunctata*, das *weiſse Auge.*

Berlin. Mag. IV. p. 526. no. 48.
Weiſsgrau, mit 2 Reihen brauner Punkte, in der Mitte jedes Flügels ein kleiner weiſser, braun gerändeter Fleck.

Naturf. XI. p. 74. no. 48. Ph. *Albipunctata:* ſollte *Albipunctaria* heiſsen, weil das *Männchen* haarige Fühlhörner hat. *(v. Rottemb.)*

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 11. p. 656. no. 42. Ph. *Albipunctata*, das *weiſse Auge.*

49. *Luridata*, der *Hornträger.*

Berlin. Mag. IV. p. 526. no. 49.
Gelblichgrau mit kleinen braunen Strichen beſäet, mit 2 roſtfarbigen Queerſtreifen durch die Oberflügel.

Naturf. XI. p. 75. no. 49. Ph. *Luridata.* In der Gröſse der Ph. *Plagiata. (v. Rottemb.)*

50. *Nigropunctata*, der *Tintenfleck.*

Berl. Mag. IV. p. 526. no. 50.
Weiſsgrau, mit blaſsgrauen Queerſtreifen, und einem ſchwarzen Punkt in jedem Flügel.

Naturf. XI. p. 75. no. 50. Ph. *Nigropunctata.* In der Gröſse der *Vavaria. (v. Rottemb.)*

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 750. no. 60. Ph. *Nigropunctata*, der *Dintenfleck.*

51. *Bidentata*, der *Zweyzack.*

Berlin. Magaz. IV. p. 600. no. 51.
Gelblichbraun, am Rande ins Weiſse fallend,

 mit

mit einem schwarzgrauen, breiten Queerstreif, der in eine Spitze ausläuft.

Naturf. XI. p. 75. no. 51. Ph. *Bidentata.* In der Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

52. *Transversata*, der *Einsiedler.*

Berlin. Magaz. IV. p. 600. no. 52.

Blaſsgelbbraun, mit vielen dunkel- und blaſsgrauen Queerstreifen.

Naturf. XI. p. 76. no. 51. Ph. *Transversata.* In der Gröſse der Ph. *Luteolata* s. *Crataegata.* (v. *Rottemb.*)

53. *Truncata*, der *Flüchtling.*

Berlin. Magaz. IV. p. 602. no. 56.

Der Grund an der Einlenkung der Flügel rothbraun, in der Mitte grauweiſs bestäubt, am Ende rostfarbig und grau, weiſs bestäubt.

— p. 625. P. Die Farben sehr abwechselnd. Sehr schwer, sie am Stamme des Baumes zu erkennen.

Naturf. XI. p. 78. no. 56. Ph. *Truncata.*

In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Forstwiſſ. I. p. 654. no. 36. Ph. *Truncata*, der *Flüchtling.*

54. *Dimidiata*, das *abgeschnittene Band.*

Berlin. Magaz. IV. p. 602. no. 57.

Blaſsgelblichgrau, mit einigen schwarzen Punkten, und einem schwarzen Strich, so kaum bis an die Hälfte der Flügel reicht.

Naturf. XI. p. 78. no. 57. Ph. *Dimidiata.*

Zu den kleinsten; kaum die Gröſse der Ph. *Nymphaeata.*

55. *Cucu-*

55. *Cuculata*, das *Säumchen.*

Berlin. Magaz. IV. p. 602. no. 60.

Weiſs, an der Einlenkung der Oberflügel braun, an der Spitze eine braune Binde; die Unterflügel weiſsgrau.

Naturf. XI. p. 79. no. 60. Ph. *Cuculata.* In der Gröſse der *Clathrata.* (v. *Rottemb.*)

56. *Angulata*, die *Fichtenrinde.*

Berlin. Magaz. IV. p. 604. no. 61.

Grau, mit einer okerbraunen breiten Binde durch die Oberflügel, an der Einlenkung braun.

Naturf. XI. p. 79. no. 61. Ph. *Angulata.* Eigentlich *Angularia.* In der Gröſse der *Plagiata.* (v. *Rottemb.*)

57. *Flaveolata*, die *Kanarienmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 604. no. 63.

Ganz gelblichweiſs.

Naturf. XI. p. 80. no. 63. Ph. *Flaveolata.*

Schmalflüglich; in der Gröſse der *Vrticata.* (v. *Rottemb.*)

58. *Fimbriata*, der *weiſse Saum.*

Berlin. Magaz. IV. p. 604. no. 64.

Ganz grasgrün, mit einem weiſsen Rande, und weiſsen Queerſtreifen durch alle vier Flügel.

Naturf. XI. p. 80. no. 64. Ph. *Fimbriata.* Sollte *Fimbriaria* heiſsen, wegen der kammförmigen Fühlhörner. Iſt etwas gröſser als ihn *Röſel* abgebildet hat.

Röſels Inſektenbel. I. NV. 3. Kl. p. 46. t. 13. Das kleine, ſehr ſchlanke und braungeſchuppte *Spannenräuplein.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 97. (nicht Viridata *Linn.*)

Wien. Schmett. p. 97. B. *Schoſsraupen. Weiſsſtriemigte Spanner.*

No. 4. *Haſenöhrchenſpannerraupe* (Bupleuri falcati); *Haſenöhrchenſpanner*, G. *Bupleuraria.* (Fimbrialis *Scop.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 37. Ph. *Fimbriata*, der *weiſse Saum.*

Scop. Entom. carn. p. 216. no. 535. Ph. *Fimbrialis.* *Long.* lin. 6. *Lat.* 5.

Alae capparinae; *anticae* ſtrigis *binis* albis; *poſticae* vna: omnibus fimbria *albida*, *ferrugineo-punctata.* *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 51. no. 454. Ph. *ſtrigata:* Seticornis (Femina), alis viridibus, *margine teſſulato;* ſtrigis *duabus* albis.

— Zool. Dan. Prodr. p. 129. no. 1486. Ph. *Strigata.*

59. *Emarginata*, die *krumme Linie.*

Berlin. Magaz. IV. p. 606. no. 67.

Dunkelgrau, weiſs beſtäubt, mit 2 ausgebogenen gelblichen Queerſtreifen; der äuſsere Rand der Oberflügel ausgeſchnitten.

Naturf. XI. p. 81. no. 67. Ph. *Emarginata.* Nicht die Ph. *Emarginata Linn.* Dieſer in der Gröſse der *Vavaria.* (v. *Rottemb.*)

60. *Muricata*, die *Purpurmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 606. no. 70.

Am äuſsern Rande oraniengelb, das übrige dunkel

*) Dies ſind die vorzüglichſten Karaktere, um ihn nicht mit *Linn. G. viridata* no. 230. zu verwechſeln.

dunkel purpurroth mit einigen oraniengelben Flecken.

Berlin. Magaz. IV. p. 625. Q. zu den *Kleinsten* dieser Klasse, aber schön gezeichnet, und selten.

Naturf. XI. p. 81. no. 70. Ph. *Muricata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 748. no. 53. Ph. *Muricata*, die *Purpurmotte.*

61. *Rectangulata*, der *rechte Winkel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 606. no. 71.

Blassgrün; die Oberflügel mit einigen dunkelgrauen Queerstreifen, so weiss gerandet; die Unterflügel hell aschgrau.

Naturf. XI. p. 82. no. 71. Ph. *Rectangulata.* Nicht die *Rectangulata Linn.* (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 750. no. 59. Ph. *Rectangula*, der *rechte Winkel.*

Die Flügel grün und braunbandig; unten eine rechtwinklichte Zeichnung.

62. *Halterata*, der *Doppelflügel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 72.

Weiss mit Aschgrau bestäubt; die Unterflügel ganz weiss.

— p. 626. R. An der Einlenkung der Unterflügel eine Art eines doppelten Flügels.

Naturf. XI. p. 82. no. 72. Ph. *Halterata.* Die mit vier Unterflügeln die *Männchen;* die andern, denen sie fehlen, die *Weibchen.* (v. *Rottemb.*)

Kleem. Beytr. I. p. 169. t. 19. f. a. b. Der zur 4ten Kl. der N. V. gehörige, und mit 6, als 2 hellgrauen, schwarz gezeichneten grossen *Vorder-* und 4 weissgrauen kleinern *Hinterflügeln* gezierte *Papilion.*

Wien.

Wien. Schmett. p. 109. K. *Scheineulenraupen. Wellenstriemigte Spanner.*

No. 10. *Bergbuchenspannerraupe* (Fagi Sylvaticae). *Bergbuchenspanner*, G. *Hexapterata.*

Degeer Inſ. Tom. II. P. I. p. 459. t. 9. f. 8. no. 9. *Phalene à ſix ailes.*

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues d'un gris blancheatre à trois bandes ondées jaunâtres & un point noir, dont le *mâle* a une *troiſieme paire de très-petites ailes.*

— *Ueberſ.* II Th. I B. p. 338. no. 9. t. 9. f. 8. Die *ſechsflüglichte Phaläne.*

Die Phaläne mit fadenförmigen Fühlhörnern, einem Saugrüſſel, und breiten grauweiſslichten Flügeln, mit drey gelblichen gewäſſerten Binden, und ſchwarzem Punkt, davon das Männchen noch ein *drittes Paar ganz kleine Flügel* hat.

63. *Bicolorata*, der *Mittelpunkt.*

Berl. Mag. IV. p. 608. no. 73.

Schneeweiſs; die Oberflügel an der Einlenkung gelbbraun, dergleichen Fleck in der Mitte mit einem ſchwarzen Punkt, am äuſsern Rande ſchwarzgrau.

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 557. no. 12. Ph. *Bicolorata*, der *Mittelpunkt.*

64. *Virgata*, die *Stengelmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 74.

Weiſsgrau, mit einer breiten braunen, weiſseingefaſsten Binde durch die Oberflügel, in welchen ein ſchwarzer Punkt.

Naturf. XI. p. 83. no. 74. Ph. *Virgata.* In der Gröſse der G. *Succenturiata* L. (v. *Rottemb.*)

65. *Obli-*

65. *Obliterata*, der *Perpendikel.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 75.

An der Einlenkung gelblichgrau, gegen den äuſsern Rand braun, das Weibchen mehr gelbgrau.

— p. 626. S. Sie legen, wenn ſie auf den Blättern ſitzen, die Flügel ſo oben zuſammen, wie die Tagvögel.

Naturf. XI. p. 83. no. 75. Ph. *Obliterata.*

Das *Weibchen* auf der Oberſeite aller 4 Flügel weiſslich und braun beſtäubt; das *Männchen* aber graubraun. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 35. Ph. *Obliterata*, der *Perpendikel.*

66. *Curvata*, der *Krummſtrich.*

Berlin. Magaz. IV. p. 608. no. 76.

Dunkelgrau, mit einer weiſsgrauen breiten Binde.

67. *Rubiginata*, der *Eiſenroſt.*

Berlin. Magaz. IV. p. 610. no. 77.

Roſtfarbig mit 3 dunklern ausgeſchwungenen Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 83. no. 77. Ph. *Rubiginata.* Eine der kleinſten, gleicht in der Gröſse und Grundfarbe der Ph. *Fuſcata*, unterſcheidet ſich aber durch die 3 Queerlinien. (v. *Rottemb.*)

68. *Farinata*, die *Kornmotte.*

Berlin. Magaz. IV. p. 610. no. 78.

Weiſslichgrau, fein beſtäubt, welches ihr ein bläuliches Anſehen giebt.

Naturf. XI. p. 84. no. 78. Ph. *Farinata.* Die

Ober-

Oberflügel auſserordentlich ſein grau beſtäubt, daher *perlfarbig*. Die *Unterflügel* ſchneeweiſs. In der Gröſse der *Plagiata*. (v. *Rottemb.*)

69. *Dilatata*, die *Furche*.

Berlin. Magaz. IV. p. 610. no. 81.

Weiſsgrau mit einigen braunen Queerſtreiſen und Binden.

Naturf. XI. p. 84. no. 81. Ph. *Dilatata*. In der Gröſse der Ph. *Halterata*. (v. *Rottemb.*)

70. *Deſignata*, die *braune Binde*.

Berlin. Magaz. IV. p. 612. no. 83.

Aſchgrau, mit einer breiten braunen Binde durch die Oberflügel, welche 2 Spitzen haben.

Naturf. XI. p. 85. no. 83. Ph. *Deſignata*. (v. *Rottemb.*)

71. *Igneata*, die *Brandmotte*.

Berlin. Magaz. IV. p. 612. no. 84.

Aſchgrau, mit einer brandgelben Queerbinde durch alle 4 Flügel.

Naturf. XI. p. 85. no. 84. Ph. *Igneata*. In der Gröſse der *Averſata*. (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 58. Ph. *Igneata*, die *Brandmotte*.

72. *Serpentata*, die *Welle*.

Berlin. Magaz. IV. p. 612. no. 86.

Röthlichgelb, mit vielen geſchlängelten dunklen Queerlinien.

Naturf. XI. p. 86. no. 86. Ph. *Serpentata*. Die Grundfarbe des *Weibchens* okerbraun; des *Männ-*

Männchens rothbraun. In der Gröſse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

73. *Spadiceata*, der *Bräunling.*

Berlin. Mag. IV. p. 612. no. 87.

Gelblichgrau mit 2 rothen Queerbinden; die Unterflügel dunkelgrün.

74. *Humiliata*, das *rothe Säumchen.*

Berlin. Mag. IV. p. 614. no. 89.

Schmuziggelb, mit blaſsgrauen ausgeſchwungenen Queerſtreifen; der andere Rand röthlich.

75. *Contaminata*, das *Tiſchtuch.*

Berlin. Mag. IV. p. 614. no. 91.

Schneeweiſs, an der Einlenkung okerbraun; dergleichen Fleck an dem Vorderrande der Oberflügel; der äuſsere Rand grau.

Naturf. XI. p. 86. no. 91. Ph. *Contaminata.* In der Gröſse der *Remutata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 55. Ph. *Contaminata*, das *Tiſchtuch.*

76. *Graminata*, die *Erdmotte.*

Berlin. Mag. IV. p. 614. no. 92.

Gelblichgrau, mit weiſslichen ausgeſchwungenen Queerſtreifen.

Naturf. XI. p. 86. no. 92. Ph. *Graminata.* In der Gröſse der *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

77. *Zonata*, das *braune Band.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 93.

Aſchgrau, mit einer gelb eingefaſsten Binde in den Oberflügeln, in welcher Mitten ein ſchwarzer Fleck.

78. *Cor-*

78. *Corculata*, das *schwarze C.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 94.
Röthlichbraun, an dem äussern Rande ein schwarzes C, an der Einlenkung gelblichgrau.

Naturf. XI. p. 87. no. 94. Ph. *Corculata.* In der Grösse der *Notata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditsch Forstwiss. II. p. 794. no. 57. Ph. *Corculata*, das *schwarze C.*

79. *Innotata*, die *Beyfußmotte.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 95.
Dunkelgrau, mit einem schwarzen Punkt in der Mitte der Oberflügel, die Flügel ziemlich lang.

Naturf XI. p. 87. no. 95. Ph. *Innotata.* In der Grösse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

Knochs Beyträge zur Insektengesch. I St. p. 22. t. 1. f. 7. *Larva.* f. 8. *Phaläna.*

80. *Albulata*, der *Weißling.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 96.
Weissgrau mit dunklern Queerstreifen, in der Mitte eines jeden Flügels ein schwarzer Punkt.

Naturf. XI. p. 88. no. 96. Ph. *Albulata.* Nächst der *Lemnata* die kleinste. (v. *Rottemb.*)

81. *Coronata*, die *Krone.*

Berlin. Mag. IV. p. 616. no. 97.
Weissgelb mit olivenfarbenen in einander gezogenen Zeichnungen.

Naturf. XI. p. 88. no. 97. Ph. *Coronata.* Die grösste Aehnlichkeit mit den Ph. *Aquaticis.* In der Grösse zwischen *Potamogata* und *Nymphäata.* (v. *Rottemb.*)

82. *Pal-*

82. *Pallidata*, das *braune Säumchen.*

Berlin. Mag. IV. p. 617. no. 98.

Glänzend, blaſsgelb mit einigen feinen braunen Strichen, der äuſsere Rand braun.

Naturf. XI. p. 88. no. 98. Ph. *Pallidata.* In der Gröſse der *Halterata.* (v. *Rottemb.*)

83. *Tridentata*, das *breite Band.*

Berlin. Mag. IV. p. 618. no. 100.

Weiſs, an der Einlenkung braun, mit einer breiten braunen Binde durch die Oberflügel.

Naturf. XI. p. 89. no. 100. Ph. *Tridentata.* In der Gröſse der *Remutata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. II. p. 749. no. 56. Ph. *Tridentata*, das *breite Band.*

84. *Biſelata*, die *Bürſtenmotte.*

Berlin. Mag. IV. p. 618. no. 101.

Schmuziggelb, gegen den äuſsern Rand bräunlich grau, mit einem Punkt in der Mitte jedes Flügels.

— p. 626. T. Einige am Ende der beyden Hinterfüſse einen Haufen kleiner Federchen, wie ein Pinſel.

Naturf. XI. p. 89. no. 101. Ph. *Biſelata.* In der Gröſse der *Succenturiata.* (v. *Rottemb.*)

Gleditſch Forſtwiſſ. I. p. 654. no. 38. Ph. *Biſelata*, die *Bürſtenmotte.*

85. *Margine punctata*, die *doppelte Punktreihe.*

Röſels Inſektenbel. I. N. V. 3 Kl. p. 41. t. 11.

Die geſchmeidige, mit verſchiedenen Schuppenflecken und Punkten gezierte Spannenraupe. Alis repandis cervinis atomariis, margine flaveſcente, *duplici ſerie punctorum nigrorum.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 37. no. 95.

86. *Umbrata*, der *Nachtſchatten.*

Röſels Inſektenbel. III. p. 21. t. 4.

Die geſchmeidige braune Spannenraupe, mit weiſsen Rücken- und Seitenflecken.

Nigricans, alis cinereis, nigro-punctatis venoſisque.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 19. no. 33.

87. *Clypeata*, die *Schildmotte.*

Kleemanns Beytr. I. p. 225. t. 26. f. 1-6.

Alis umbroſis nigricantibus, margine *clypeis cinereis.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 25. no. 57.

Die zur N. V. 3 Kl. gehörige, mit 10 Füſsen verſehene glatte, röthlich braungelb gefleckte, und ſchwarz getüpfelte Spannenraupe.

88. *Sericata*, die *Seidenmotte.*

Kleem. Beytr. I. p. 231. 232. t. 27. f. A.

Der zur dritten Kl. der N. V. gehörige, als Seide glänzende, und mit verſchiedenen Kappenzügen gezierte, und gemaſerte bräunlich graue Spannenpapilion. (coll. t. 14. f. 1. 2. t. 28. f. 1. 2.)

Magna. Alis nigro-fuſcis, venis, lineis undulatis, atomisque innumeris nigris.

89. *Rubro-ſtriata*, die *Rothader.*

Kleemanns Beytr. I. p. 301. t. 35. f. A B C D.

Die einſame, glatte, dunkelbräunlich graue zartgeſtreifte, zehnfüſsige Spannenraupe, mit zween höckrigen Abſätzen.

Alis

Alis *anticis* nigricantibus, *rubro-venosis*, *posticis* flaveolatis, nigro-punctatis striatisque.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 27. no. 61.

90. *Glauco-fasciata*, der *Blaustrich.*

Kleemanns Beytr. I. p. 377. t. 40. f. 1-5.

Die halbspannende grasgrüne gelbgestreifte Raupe mit ungleichen Bauchfüssen des Nachtvogels 2ter Klasse.

Alis aurantiacis, nigro-striatis maculatisque; *anticis* fascia transversa glauca.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 50. no. 136.

Degeer Inf. I. p. 377. t. 21. f. 10. 11.

Chenille *arpenteuse* verte, à seize jambes, dont les huit intermédiaires membraneuses sont très-inégales entre elles en grandeur.

— *Uebers.* I. 2 Qu. p. 119. t. 21. f. 10. 11.

Die grüne sechzehnfüssige *Spannraupe* mit acht stumpfen Mittelfüssen von ungleicher Grösse.

91. *Quadrifaria*, das *Schildvögelein.*

Sulzers Gesch. p. 162. t. 23. f. 4.

Braun, auf jedem Flügel mit einem grossen gelben Fleck, auf beyden Seiten gleich.

92. *Rubro-ciliata*, das *rothe Fränzchen.*

Naturf. III. p. 7. t. 1. f. 3. no. a. (D. *Kühn.*)

Alis stramineis rubro-fasciatis.

Füessl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 3.

Schäff. Icon. t. 22. f. 5. (verstäubt).

93. *Trifasciata*, die *Dreybinde.*

Naturf. III. p. 7. t. 1. f. 4. no. b. (*Kühn*).

Alis flaveolatis griſeo-atomatis; *tribus faſciis* transverſis rubeſcentibus.

Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 4.

94. *Quadripunctata*, der *Vierpunkt.*

Naturf. III. p. 7. t. 1. f. 5. no. c. (*Kühn*).

Alis pallide-flavis, oblique fuſco-ſtriatis, *punctis quatuor fuſcis.*

Füeſsl. Magaz. der Entomol. II. p. 106. no. 5.

95. *Annulata*, der *Ringelſpanner.*

Naturf. VI. p. 92. t. 4. f. 2. (D. *Schulz*).

Paleacea, ſtriis 2 et faſcia nigra undulata cum *annulo nigro* in cunctis alis. In *Germaniae Dumetis.*

96. *Centumnotata*, der *Hundertſpanner.*

Naturf. VI. p. 93. t. 4. f. 5. (D. *Schulz*).

Albo-nigroque nebuloſa, faſcia lata, in medio anguſtiore cervina, ad apicem alarum.

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 83-84. Ph. *Centumnotata.*

Seticornis; alis ferrugineo-fuſcoque variis, faſcia media griſea *C atro notata.*

97. *Veſtalis*, der *weiſſe Schleyer.*

Naturf. XIII. p. 30. no. 4. t. 3. f. 7. a b. (*Walch*).

G. *antrorſum* alis *ſuperioribus* albis margine lato cinereo, lineis ſerratis nigris et fuſcis ornato; *inferioribus* itidem albis et ad marginem maculis nebuloſis, *retrorſum* alis omnibus unicoloribus dilute cinereis, faſcia obſcuriore et in medio nigro puncto notatis.

98. *Tigris*, der *kleine Tiger.*

Naturf.

Naturf. XIII. p. 31. no. 5. t. 3. fig. 8. a b. (*Walch*).

Antrorſum alae *ſuperiores* albae maculis et punctis nigris; *inferiores* albae punctis tantum nigris ſubtiliſſimis adſperſae; *retrorſum* alae omnes dilute flavae punctis nigris rarioribus.

99. *Frumentata*, der *Getreideſpanner.*

Naturf. XV. p. 112. t. 3. f. a b c. (D. *Meyer.*)

Seticornis, alis rotundatis, *ſuperioribus* albidis, cinereo-faſciato-maculatis, macula vireſcente rhombea; *inferioribus* ſubangulatis fulvis, baſi et margine interiori nigreſcentibus.

Ad *Pragam Bohemiae.*

Larva primo vere victitat graminibus, *frumentis infeſta.*

100. *Pectinataria*, das *gekämmte Fühlhorn.*

Knochs Beytr. zur Inſektengeſch. I. p. 55. t. 3. f. 10.

Alis viridibus; faſciis duabus crenatis lineolaque albeſcente ſubterminali undulata.

101. *Funebris*, der *Trauerſpanner.*

Der *Königl. Norwegiſchen Geſellſch. Schr.* IV. p. 285. t. 16. f. 17.

Seticornis, *alis atris*, maculis albis; *ſuperioribus* tribus, *inferioribus* duabus.

102. *Fulvulata*, der *Sibiriſche Birkenſpanner.*

Pallas Reiſ. Ausz. II. no. 95.

Magnitudo paulo ſupra Crataegatam; corpus nigrum valde hirſutum. Alae *ſuperiores* ſupra fuſco-fuliginoſae; *ſecundariae* luteo-fulveſcentes.

In *Betulis Sibiriae.*

Müllers Suppl. B. p. 313. t. 236. e. Ph. *Fulvulata*, der *Birkenvogel.* *)

103. *Prasinaria*, der *Lerchbaumspanner.* **)
Wien. Schmett. p. 96. A. no. 3.

104. *Cythisaria*, der *Geißkleespanner.*
Wien. Schmett. p. 97. B. no. 2.

105. *Bajularia*, der *Eichenspanner.*
Wien. Schmett. p. 97. B. no. 6.
Die *Raupe* immer mit Blütschuppen und andern dergleichen Dingen beladen; daher könnte man sie auch den *Lastträger* nennen.
Geoffr. Inf. II. p. 126. no. 33.

Pha-

*) Ich könnte hier aus *Gladbachs* Schmetterl. noch einige anführen: allein Beschreibungen und Abbildungen sind so unvollkommen, dass der Kenner keine Befriedigung findet. Daher will ich sie nur nachweisen.

1) p. 19. t. 9. f. 3. 4. der *kleine rare weisse Blausieb.*
2) p. 20. — f. 5. 6. der *weisse Ochs.*
3) p. 23. t. 11. f. 1. 2. die *kleine Diana.*
4) p. 24. t. 12. f. 1. 2. das *kleine Steindeckerchen.*
5) p. 26. — f. 5. 6. das *Manchettenvögelchen.*
6) p. 33. t. 14. f. 1-8. t. 15. f. 1-4. die *Halbtrauer.*
7) p. 36. t. 16. f. 6. 7. das *rare Rosevögelchen.*
8) p. 38. t. 18. f. 1. 2. das *Pulvervögelchen.*
9) p. 43. t. 20. f. 1. 2. der *gelbe Vter.*
10) p. 47. t. 21. f. 1 - 7. das *Kayservögelchen mit seiner Raupe, Gespinnst und Puppe.*
11) p. 55. t. 24. f. 7. 8. der *Halbkartun.*
12) p. 63. t. 27. f. 3 - 6. das *Hirschbärtchen.*
13) p. 67. t. 29. f. 6. 7. das *kleine Perlhühnchen.*

**) Da das Wiener Werk in den Händen aller Entomologen ist, so habe ich mich hier der Kürze befleissigen wollen.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis viridibus, limbo maculaque anguli ani cinereo-fuscis.
La Phalene-verdelet.
Long. 6 lign.

106. *Viridata*, der *Brombeerſpanner.*

Wien. *Schmett.* p. 97. B. no. 7.
Réaum. Inſ. Tom. II. Mém. 9. p. 149. *Arpenteuſe de la Ronce.*
Albin Inſ. t. 48. f. 80. die *Raupe* auf *Haſelnußblättern.*

107. *Prodromaria*, der *Lindenſpanner.*

Wien. *Schmett.* p. 99. C. no. 1.
Geoffr. Inſ. II. p. 118. no. 22.
Phalaena pectinicornis elinguis albida, nigropunctata, alis deflexis; *ſuperioribus* faſcia duplici fuſca dentata nigro-terminata.
La Primtaniere.
Long. 11 lign.

108. *Hiſpidaria*, *dunkelgrauer gelbhörnigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 99. C. no. 4.

109. *Zonaria*, *Garbenſpanner.* *)

Wien. *Schmett.* p. 100. C. no. 5.
Chenille arpenteuſe de la Jacée. *Réaum.*

110. *Piloſaria*, der *Birnſpanner.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 6.

*) No. 108. 109. *Weibchen flügellos.*

111. *Horridaria, ſchwarzbrauner, ſchwarzgeſtrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 7.

112. *Lichenaria, Baumflechtenſpanner.* *)

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 8.

113. *Corticaria, Cerreichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 9.

114. *Cineraria, Staubmoosſpanner.*

Wien. Schmett. p. 100. C. no. 10.

115. *Roboraria, Steineichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 1.

116. *Abietaria, Edeltannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 3.

117. *Rhomboïdaria, Gutheinrichſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 4.

118. *Secundaria, Weiſstannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 5.

119. *Cinctaria, grauneblichter ringleibiger Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 6.

120. *Crepuſcularia, Agleyſpanner.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 8.

121. *Vi-*

*) Ob dies unſere Lichenaria no. 33. ſey, kann ich nicht mit Gewiſsheit ſagen.

121. *Viduaria*, (p. 315.) *weißer, schwarzgestrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 9.

122. *Aerugaria, Weichselspanner.* *)

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 10.

123. *Leucophaearia, Kahneichenspanner,*

Wien. Schmett. p. 101. D. no. 11.

124. *Aescularia, Roßkastanienspanner.*

Wien. Schmett. p. 102. D. no. 12.

125. *Aceraria, Ahornspanner.*

Wien. Schmett. p. 102. D. no. 13.

126. *Lineolata, blaßgrauer, feingestrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 1.

127. *Artesiaria, schiefergraulicher, mattgestrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 2.

128. *Coarctaria, hellgrauer engstreifigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 3.

129. *Arenacearia, Kronwickenspanner.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 5.

130. *Obliquaria, Silbergrauer, schregbraunstreifigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 6.

*) No. 121 - 124. *Weibchen flügellos.* Heisst p. 315. nun *Bajaria.*

131. *Aureolaria*, *Heckenwickenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 8.

Geoffr. Inſ. II. p. 128. no. 138.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis patentibus flavis, lineis ſuperne tribus, inferne duabus transverſis fuſcis.

La double ceinture.

Long. 3½ lign.

132. *Gilvaria*, *Tauſendblattſpanner.*

Wien. Schmett. p. 102. E. no. 10.

133. *Angularia*, *Sandlindenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 3.

Geoffr. Inſ. II. p. 127. no. 36.

Phalaena pectinicornis elinguis, alis patentibus angulatis, fuſco-luteis, faſcia duplici transverſa obſcuriore.

La *Zone.*

Long. 8 lign.

134. *Eroſaria*, *Hageichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 4.

135. *Evonymaria*, *Spindelbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 5.

136. *Pectinaria*, *Tannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 6.

137. *Lunaria*, der *Holzbirnſpanner.*

Wien. Schmett. p. 103. F. no. 7.

— p. 276. §. 12. t. I. a. fig. 4.

Pectinicornis alis eroſis, flaveſcenti-rufoque variis, biſtriatis, ſuperioribus macula ad angulum externum *ſublunari.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 623. no. 14. Ph. *Lunaria.*

Pectinicornis; alis angulato-dentatis, basi rufis, *lunula* alba, apice cinereis.

Sepp Nederl. Inf. VI. p. 9. t. 2. De *Vlinder* het *Herculesje.*

138. *Flavicaria*, *zart ledergelber randmaklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 104. F. no. 12.

139. *Apiciaria*, *oranienfarbiger spitzrandstreifiger Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 104. F. no. 14.

140. *Parallelaria*, *oranienfarbiger*, *breitrandstreifiger Spanner. Unbekannte Raupe.*

Wien. Schmett. p. 104. F. no. 15.

141. *Capreolaria*, der *Fichtenspanner.*

Wien. Schmett. p. 105. G. no. 2.

142. *Rubicapraria*, *gänsefarbiger*, *mattstreifiger Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 105. G. no. 3.

143. *Murinaria*, *mäusefarbiger*, *hellgraustreifiger Spanner.*

Wien. Schmett. p. 105. G. no. 4.

144. *Glarearia*, *Gelbwickenspanner.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 6.

145. *Conspersaria*, *weißlichter*, *braunsprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* p. 106. G. no. 8.

146. *Plumaria*, *Schottenkleeſpanner.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 9.

147. *Alternata*, *weißgraulicher*, *gelbgerandeter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 11.

148. *Punctulata*, *grauweißlicher*, *ſchwarzſprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 106. G. no. 13.

149. *Omicronaria*, *Maſſernſpanner.*

Wien. Schmett. p. 107. H. no. 3.

Chenille arpenteuſe d' érable. *Réaumur.*

Geoffr. Inſ. II. p. 144. no. 71.

Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus albis, ſingulis faſcia undulata ſerrata, et *Omicro* albis.

Les *quatre Omicrons. Long.* 4. lign.

150. *Decuſſata*, *graulichtweißer*, *braunſchwarzgegitterter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 107. H. no. 7.

151. *Furvata*, *Mehlbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 1.

152. *Pullata*, *grauſprenklichter*, *ſchwartzſchattichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 2.

153. *Obſcurata*, *Bocksbeerſpanner.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 3.

154. *Ob-*

154. *Obfuſcata, Ellerbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 4.

155. *Carbonaria, Knotenmoosſpanner.*

Wien. Schmett. p. 108. I. no. 5.

156. *Vetulata, mattbrauner, rothſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 1.

157. *Rhamnata, Kreuzdornſpanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 2.

158. *Dilutata, Heckeichenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 4.

159. *Impluviata, Gartenbirnſpanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 5.

160. *Rupeſtrata, fahlweißer, blaßbraunſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 6.

161. *Sylvata, Rothtannenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 7.

162. *Polycommata, rindefarbiger, ſchwartzſtriemigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 8.

163. *Salicata, Bandweidenſpanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 11.

164. *Albulata, lilienweißer, gelblichtstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 12.

165. *Rivulata, brauner, weißstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 13.

166. *Tersata, hellbrauner, mattstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 14.

167. *Vitalbata, Linenspanner.*

Wien. Schmett. p. 109. K. no. 15.

168. *Luteata, hellederfarbiger, jonkillengelbstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 18.

169. *Rubricata, röthelsteinfarbiger, dunkelstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 19.

170. *Pallidata, weißlichter, braungelbstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 21.

171. *Osseata, beinfarbiger, bräunlichstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 22.

172. *Candidata, Rothbuchenspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 23.

173. *Sub-*

173. *Subumbrata, hellgrauer, dunkelgerändeter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 25.

174. *Pusillata, Wacholderspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 26.

175. *Minutata, Wermuthspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 27.

176. *Variata, Pechtannenspanner.*

Wien. Schmett. p. 110. K. no. 28.

177. *Badiata, Heckerosenspanner.*

Wien. Schmett. p. 111. L. no. 3.

178. *Caesiata, blaugrauer, dunkelstriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 112. L. no. 6.

179. *Olivata, Eschenspanner.*

Wien. Schmett. p. 112. L. no. 7.

180. *Psittacata, Graslindenspanner.*

Wien. Schmett. p. 112. L. no. 8.

181. *Fulvata, hochgelber, oranienstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 112 M. no. 4.
Forsteri nov. Spec. Inf. p. 76. no. 76. Ph. *Fulvata.*
Seticornis, alis rotundatis, anticis fulvis, fascia ad basin, aliaque in medio undato repanda, ferrugineo-rufa.
In Angliae *Crataego oxyacantha.*

182. *Ligu-*

182. *Ligustrata, Hartriegelspanner.*

Wien. Schmett. p. 112. M. no. 5.

183. *Propugnata, graubräunlichter, schwarzbräunstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 112. M. no. 7.

184. *Linariata, Leinkrautspanner.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 9.

185. *Spadicearia, okerbräunlicher, rothstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 12.

186. *Montanata, milchweißer, fahlbraunstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 14.

187. *Rusticata, schmuzigweißer, schwarzbraunstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 15.

188. *Tophaceata, gelbweißer, graustreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 16.

189. *Russata, zimmetbrauner, schwarzstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 18.

190. *Silaceata, dottergelber, schwarzgraustreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 20.

191. *Rubicata, dunkelrother, schwarzstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 22.

192. *Berberata, Sauerdornspanner.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 23.

193. *Derivata, taubenhalsfarbiger, braungestrichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 113. M. no. 24.

194. *Procellata, weißer, bandschwarzstreifichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 1.

195. *Reticulata, schwarzfleckichter, weißaderichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 3.

196. *Vetustata, flachsfarbiger, schwarzbraunfleckichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 4.

197. *Rubiginata, schneeweißer, rostgelbfleckichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 5.

198. *Sinuata, mattweißer, graubraunfleckichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 6.

199. *Centaureata, Flockenblumenspanner.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 7.

200. *Aduſtata, Spillbaumſpanner.*

Wien. Schmett. p. 114. N. no. 9.

201. *Alpinata, ſammetſchwarzer, oranienfleckichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 115. N. no. 14.

202. *Griſeata, lichtgrauer Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 2.

203. *Illibata, weißer, wellenrandflüglichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 5.

204. *Taminata, weißer, auſſenrandſprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 6.

205. *Heparata, leberbrauner, ſaumſprenklichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 8.

206. *Euphorbiata, Wolfsmilchſpanner.*

Wien. Schmett. p. 116. O. no. 9.

207. *Pyraliata, Wollſtrohſpanner.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 1.

208. *Virgulata, weiſsgrauer, geradeſchattigter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 8.

209. *Moniliata, milchrahmfarbiger, perlrandichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. p. 117. P. no. 9.

210. *Fim-*

210. *Fimbriata*, *gelblichtweiſser*, *braungerandeter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* p. 117. P. no. 11.

211. *Scurulata*, *helfenbeinfarbiger*, *rundmaklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* p. 117. P. no. 12.

212. *Decorata*, *weiſser*, *blaurandmaklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* p. 117. P. no. 13.

213. *Aeruginaria*, *blaſsgraugrüner Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* *Nachtr.* p. 314. no. 10.

214. *Serotinaria*, *gelbweiſslichter*, *grauſprenklichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* *Nachtr.* p. 315. no. 14.

215. *Honoraria*, *trübgelbrother*, *doppeltſtreiſichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* *Nachtr.* p. 315. no. 18.

216. *Diverſata*, *braunrother und oraniengelber Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* *Nachtr.* p. 315. no. 14.

217. *Dilucidaria*, *hellſilbergrauer*, *ſchwarzgrauſchattichter Spanner.* *Unbekannte Raupe.*

Wien. *Schmett.* *Nachtr.* p. 315. no. 6.

218. *Anguſtata*, *ſchiefergrauer*, *weiſs- und düſterſtriemichter Spanner.* *Unbek. Raupe.*

Wien. *Schmett.* *Nachtr.* p. 315. no. 30.

219. *Scripturaria, mattweiſser, ſchwarzſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 31.

220. *Inundaria, braungrauer, weiſs- und ſchwarzſtriemichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 32.

221. *Suffumata, grauweiſslichter, rauhſchwarzſtreiſichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 27.

222. *Luctuata, ſchwarz und weiſswechſelnder Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 28.

223. *Blandiata, milchweiſser, ſchwarzgrauſtreiſichter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 15.

224. *Conſpicuata, hochgelber, ſchwarzgerandeter Spanner. Unbek. Raupe.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. no. 16.

225. *Nebulata*, der *Nebelſpanner.*

Scop. Entomol. carn. p. 215. no. 532.

Alae ſupra albido - cervinoque nebuloſae, ſubtus pallidiores; poſticae ſubangulatae.

Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{4}$.

226. *Retialis*, der *Netzſpanner.*

Scop. Entomol. carn. p. 217. no. 536.

Alae albae, venis faſciisque 4 murinis *reticulatae.*

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

227. *Pun-*

227. *Punctinalis* der *Punktspanner*.

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 537.

Alae albae; serie transversa *punctorum* fuscorum, fascia obsoleta submarginali atomisque fuscis.

In *arboribus pomiferis*.

Long. lin. 10½. *Lat*. 6.

228. *Fenestrella*, der *Fensterspanner*.

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 538.

Alae fuscescentes, erectae, dentatae, punctis rufis albisque.

Long. lin. 3½. *Lat*. 2.

Floribus involat.

229. *Niveata*, der *Schneespanner*.

Scop. Entom. carn. p. 217. no. 539.

Alba tota et immaculata.

Long. lin. 7. *Lat*. 4¼.

In *Pratis*.

Wien. *Schmett*. p. 116. O. *Spreckenraupen, einfärbige Spanner*.

No. 4. *Unbek. Raupe. Weisser, plattrandflüglichter Spanner*, G. *Nivearia*.

230. *Lineata*, der *randlinichte Spanner*.

Scop. Entom. carn. p. 218. no. 540.

Alba tota; *linea marginali* venisque subtus fuscis.

Long. lin. 10. *Lat*. 6.

In *Pomariis*.

231. *Exanthemata*, der *rostpunktirte Spanner*.

Scop. Entom. carn. p. 218. no. 542.

Alba; ſtrigis obſoletiſſimis *punctatisque* copioſis *ferrugineis*, utrinque variegatas alas gerens.

Long. lin. 5½. *Lat.* 3½.

In *Salicetis.*

Wien. Schmett. p. 107. H. *Strichraupen; wechſelnde Spanner.*

No. 5. *Unbek. Raupe. Weiſser, braungelblichtgeſtrichter Spanner.*

232. *Punctata*, der *ſchwarze Mittelpunkt.*

Scop. Entom. carn. p. 218. no. 543.

Alba; alis omnibus utrinque puncto nigro medio; *anticis* punctis 7 nigris marginem externum utrinque occupantibus.

Long. lin. 5½. *Lat.* 3¾.

In *collibus herbidis.*

233. *Ornata*, der *geſchmückte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 219. no. 545.

Alba; alis omnibus ſupra faſciis binis limbi: antica undata.

Long. lin. 6. *Lat.* 3½.

In Pratis *Carnioliae.*

Wien. Schmett. p. 117. P. *Fadenraupen. Bogenſtriemichte Spanner.*

No. 14 *Unbek. Raupe. Schneeweiſser, bräunlichtrandfleckichter Spanner*, G. *Ornata.*

234. *Glaucata*, der *blaurandigte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 220. no. 549.

Alba; alis *anticis* faſcia media ſubeluta fuſceſcente, ad marginem inferiorem glauco-fuſcoque varia.

Long. lin 5⅓. *Lat.* 4.

In *Sylvis.*

235. *Chlorosata et Mucronata*, der *holztaubenfarbige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 222. no. 551. Ph. *Chlorosata.*
Albida; seu colore eodem fere ut vultus in Cachexia virginea.
Long. lin. 7. *Lat.* $5\frac{1}{2}$.
In Pascuis.
— No. 552. Ph. *Mucronata.*
Osso-cinerea; alis *anticis* apice acuminatis lineaque fusca ibidem.
Long. lin. 8. *Lat.* $5\frac{2}{3}$.
In *Salicetis.*

Wien. Schmett. p. 107. E. *Zweigschossraupen. Geradstreifichte Spanner.*
No. 7. *Unbek. Raupe. Holztaubenfarbiger, gelbgestrichter Spanner.* G. *Palumbaria:* Chlorosata et Mucronata *Scop.*

236. *Verberata*, der *Striemenspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 223. no. 554.
Albida; alis *anticis* strigis 5 undatis transversis fusco-ferrugineis, duabus posticis approximatis.
Long. lin. 7. *Lat.* 5.
In *sterilioribus pratis.*

237. *Vndulata*, der *Wellenspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 223. no. 555.
Alae cinereae; *anticae* fascia lata fusco-cinereoque nebulosa dentata; punctis duobus nigris, undulisque obsoletis crebris obscurioribus transversim strigatae.
Long. lin. $7\frac{1}{3}$. *Lat.* 5.
In *Sylvis.*

Wien. Schmett. p. 111. L. *Runzelraupen. Mittelſtreifichte Spanner.*

No. 5. *Lülchſpannerraupe* (Lolii perennis); *Lülchſpanner*, G. *Bipunctaria.*

238. *Contaminata*, der *Schmuzſpanner.*

Scop. Entom. carn. p. 225. no. 559.

Alae utrinque faſciis cinereis et ferrugineis alternantibus coloratae, atomisque fuſcis adſperſae.

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

In *herbidis montanis.*

239. *Menſurata*, der *kaffeſpitzige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 225. no. 560.

Alae cineraſcentes; atomis fuſcis obſitae; *anticae* faſciis tribus lineaque apicis caffeatis; margine paleaceo.

Long. lin. 6. *Lat.* 5.

In *ſiccis et apricis collibus.*

Wien. Schmett. p. 111. L. no. 2. *Treſpeſpannerraupe* (Bromi arvenſis); *Treſpeſpanner*, G. *Menſuraria.*

Schaeff. Icon. t. 76. f. 4. 5.

240. *Moeniata*, die *Kaffeſtreiſe.*

Scop. Entom. carn. p. 226. no. 561.

Alae *anticae* albido-cineraſcentes, *faſcia caffeata* dentata, margine paleaceo.

Long. lin. $8\frac{1}{2}$. *Lat.* 6.

In *Sylvis.*

Wien. Schmett. p. 112. M. *Schuppenraupen. Eckeſtreifichte Spanner.*

No. 1. *Unbek. Raupe. Veilgrauer, braunſtreifichter Spanner*, G. *Moeniaria.*

241. *Laccata*, der *Lackſpanner*.
Scop. Entom. carn. p. 226. no. 563.
Alae ſupra viridanae; faſciis binis poſticis primorumque margine craſſiore *laccatis*.
Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.
In *Juniperetis* verno tempore.

242. *Inflammata*, der *Feuerſpanner*.
Scop. Entom. carn. p. 226. no. 564.
Alae *anticae* hepaticae; diſco ſubtus nigricante; utrinque maculis quinis lineaque limbi *aureis*; *poſticae* fuſcae; faſciis binis maculaque *aureis*.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Pratis*.

243. *Aurata*, der *Goldfleckigte Spanner*.
Scop. Entom. carn. p. 227. no. 565.
Habitus et colores ut in priore, ſed alae *anticae* maculis 4; *poſticae* unica utrinque *aureis*, faſciis nullis.
Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.
In *Montanis*.

244. *Ochrata*, der *Okerſpanner*.
Scop. Entom. carn. p. 227. no. 567.
Alae *ochrae* colore, ſubtus obſcuriores, utrinque ſtrigis transverſis repandis obſcurioribus.
Long. lin. 5. *Lat.* $3\frac{1}{3}$.
In *Montanis*.
Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 129. no. 1489. Phal. *Ochrata*.
Seticornis, alis albo-flaveſcentibus; anticis ſtrigis undulatis 2-3; *poſticis* puncto diſci fuſco.
Geoffr. Inſ. II. p. 153. no. 87.

Ph. ſeticornis ſpirilinguis; alis deflexis albo-flaveſcentibus, faſcia duplici transverſa fuſca.

La *Phalene blanchâtre à deux bandes brunes.*

Long. 7. lign.

Wien. Schmett. p. 110. K. *Scheineulenraupen*; *wellenſtriemichte Spanner.*

No. 20. *Schwingelſpannerraupe.* (Feſtucae duriuſculae); *Schwingelſpanner*, G. *Ochreata.*

245. *Limitata*, der *hirſchhornfarbiggeſäumte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 568.

Alae ferrugineae; *anticae* ſupra faſcia lata nigro puncto ſignata, limboque cervinis.

Long. lin. 8. *Lat.* 5¾.

In *Pratis noſtris.*

246. *Spataceata*, der *beinfarbige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 570.

Alae oſſeae; ſtrigis transverſis obſcurioribus repandis obſoletis, puncto nigro vtrinque notatis.

Long. lin. 6. *Lat.* 4.

247. *Alpinata*, der *haarbrüſtige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 228. no. 571.

Fuſco-cervina; *thorace* capiteque nigricantibus *tomentoſis.*

Long. lin. 5¾. *Lat.* 3½.

In ſummis herbidisque cacuminibus *Alpium Vochinenſium.*

248. *Murinata*, der *mäuſefarbige Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 229. no. 572.

Murina

Murina tota; absque maculis fasciisque.
Long. lin. $4\frac{2}{3}$. *Lat.* 3.

249. *Rivulata*, der *bachgestrichte Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 229. no. 573.
Alba; alis *anticis rivulis* ferrugineis; *posticis* fascia strigisque duabus transversis fuscis; omnibus striga marginali vtrinque ferruginea.
Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Pratis.*

250. *Litterata*, der *Buchstabenspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 229. no. 574.
Alae cervinae; *anticae* linea transversa postica, alia antica, hisque interiecta littera (V) albis; posticae fasciis binis angustis albis.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Pratis.*

251. *Laevigata*, der *geglättete Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 230. no. 575.
Cinereo-murina; alis subdentatis; denticulis puncto nigro notatis; *anticis* strigis punctatis duabus nigris.
Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Arbustis.*
Wien. Schmett. p. 117. P. *Fadenraupen, bogenstriemichte Spanner.*
No. 10. *Unbek. Raupe, röthlichweißer düsternstriemichter Spanner.*

252. *Inquinata*, der *Sudelspanner.*

Scop. Entom. carn. p. 230. no. 576.
Tota pallide ferruginea; alis omnibus supra fasciis bilineatis fuscescentibus, subtus immaculatis.
Long.

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.
In *Pratis.*

253. *Tenebrata*, der *braundüstere Spanner.*

Scop. Entom. carn. p. 230. no. 577.
Fuscescens; alis *anticis* subtus macula flava; *posticis* utrinque fascia flava.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.
In *Montanis.*

254. *Despicata*, der *Winkelkriecher.*

Scop. Entom. carn. p. 231. no. 579.
Alae cervinae aut murinae; *anticae* fascia postica maculisque binis marginalibus; *posticae* fasciis binis ferrugineis.
Long. lin. $4\frac{1}{2}$. *Lat.* $2\frac{3}{4}$.
In incultis, siccis neglectisque locis.

255. *Nigrata*, der *Schwärzling.*

Scop. Entom. carn. p. 231. no. 580.
Fusca; alis omnibus fimbria fasciaque albis; anticis punctis binis albis.
Long. lin. $3\frac{1}{2}$. *Lat.* 2.

256. *Aethiopata*, der *Mohr.*

Scop. Entom. carn. p. 231. no. 581.
Nigra; alis omnibus utrinque fascia albida.
Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{4}$.
In *herbidis subsylvestribus.*

257. *Obfuscata*, der *Bräunling.*

Scop. Entom. carn. p. 232. no. 582.
Fusco-nigra; alis omnibus alba fimbria maculaque flava.

Long.

Long. lin. 3. *Lat.* 2.

In *calidiore Carniolia.*

258. *Trilineata*, die *Dreylinie.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 115. no. 128.

Alis concoloribus flavis rotundatis.

In *Pratis.*

259. *Trifaſciata*, die *Dreybinde.*

Scop. Ann. 5. hiſt. nat. p. 116. no. 129.

Alis rotundatis concoloribus flavis faſciis tribus utrinque ſuperne obſcurioribus, inferne fuſcis.

260. *Nivearia*, der *weiße engliſche Spanner.* *)

Fabric. Syſt. Entomol. p. 620. no. 2.

Pectinicornis; alis ſubangulatis albis; margine poſtico anticisque ſubtus fuſcis; poſticis puncto centrali nigro.

261. *Cultraria*, der *deutſche Sichelſpanner.*

Fabric. S. E. p. 621. no. 9.

Pectinicornis; alis *ſubfalcatis*, luteis; faſcia ſaturatiori, antennis apice ſetaceis.

262. *Dentaria*, der *engliſche Zahnſpanner.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 15.

Pectinicornis; alis angulato-dentatis, ſupra pallidis; ſtrigis ferrugineis, ſubtus ferrugineis; *lunula* obſcuriore.

263. *Undaria*, die *indianiſche Braunwelle.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 16.

Bipe-

*) An *Niveata* Scopoli? no. 229.

Bipectinicornis; alis dentatis albis, *fuſco-undatis;* antennis apice ſetaceis.

264. *Rondelaria.*

Fabric. S. E. p. 623. no. 18.

Pectinicornis; alis anticis griſeis; poſticis ferrugineis.

In *Rondeletia Indiae orientalis.*

265. *Turcaria*, der *deutſche Weiſsmond.*

Fabric. S. E. p. 624. no. 22.

Pectinicornis; alis griſeo-nebuloſis, omnibus ſubtus puncto nigro; *lunula alba.*

266. *Limbaria*, der *engliſche Schwarzſaum.*

Fabric. S. E. p. 624. no. 24.

Pectinicornis; alis ferrugineis; *limbo* nigro; poſticis ſubtus nigris, albo-ſtriatis.

267. *Ocularia*, das *indianiſche Weiſsauge.*

Fabric. S. E. p. 625. no. 28.

Pectinicornis; alis rotundatis, flavis, omnibus *puncto ocellari* albo.

268. *Annularia*, der *deutſche braunringlichte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 625. no. 29.

Pectinicornis; alis cinereis; ſtriga *annulo* faſciisque duabus fuſcis.

269. *Praſinaria*, der *engliſche wieſengrüne Spanner.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 33.

Pectinicornis; *alis viridibus;* ſtrigis tribus; anticis obſcurioribus, poſtica alba.

270. *Viridaria*, der *englische Grünling.*

Fabric. S. E. p. 626. no. 34.

Pectinicornis; alis rotundatis *viridibus;* albostrigosis, maculisque marginalibus atris.

271. *Fenestraria*, der *chinesische Blaustrich.*

Fabric. S. E. p. 627. no. 38.

Pectinicornis; alis rotundatis; atris, *coeruleostriatis* maculatisque.

272. *Venaria*, die *indianische Schwarzader.*

Fabric. S. E. p. 627. no. 39.

Pectinicornis; alis luteis; margine *venisque* dilatatis, ramosis, *nigris.*

273. *Plumbaria*, der *englische bleyfarbige Spanner.*

Fabric. S. E. p. 628. no. 44.

Pectinicornis; *alis plumbeis;* strigis tribus punctoque medio fuscis.

274. *Fasciata*, die *indianische Schneebinde.*

Fabric. S. E. p. 629. no. 47.

Seticornis; alis angulatis fuscis; *fascia nivea.*

275. *Regulata*, die *brasilianische Braunlinie.*

Fabric. S. E. p. 629. no. 48.

Seticornis; alis angulatis cinereis, *anticis litura fusca.*

276. *Falcata*, der *englische Sichelspanner.*

Fabric. S. E. p. 629. no. 49.

Seticornis; alis *falcatis* fulvis; punctis duobus fuscis inter strigas luteas.

277. *Demandata*, der *Leipziger Purpurthau.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 50.

Seticornis; alis ſubangulatis, luteſcentibus; ſtrigis tribus punctoque medio fuſcis.

Statura *Amatariae*, at minor; alae omnes flaveſcentes, *purpureo ſubtiliſſime irroratae.*

278. *Explanata*, der *chineſiſche Monſonſpanner.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 51.

Seticornis; alis dentatis ferrugineis, faſcia fuſca, puncto nigro.

Muſ. *Monſon.*

279. *Dimidiata*, der *engliſche halbgelbe, halbbraune Spanner.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 52.

Seticornis; alis dentatis; *antice flavis*, *poſtice fuſcis.*

280. *Irrorata*, der *oſtindianiſche braunbereifte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 630. no. 53.

Seticornis; alis dentatis flavis, *fuſco-irroratis*, ſubtus macula faſciaque poſtica fuſcis.

281. *Ulmata*, der *engliſche Ulmenſpanner.*

Fabric. S. E. p. 632. no. 62.

Seticornis, alis albis, faſciis duabus ferrugineo-fuſcis, poſtica maculari.

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 13. t. 3. De *Porcelein-Vlinder.*

282. *Rufata*, der *engliſche Fuchs.*

Fabric. S. E. p. 633. no. 68.

Seti-

Seticornis; alis cinereis, poſtice ferrugineis, ſtriga alba, punctisque marginalibus nigris.

283. *Bimaculata*, der *Leipziger Zweyfleck.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 76.
Seticornis; alis albis; *anticis* maculis *duabus coſtalibus* fuſcis.

284. *Volutata*, der *deutſche Linienſtrich.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 77.
Seticornis; alis omnibus viridibus, *ſtrigis duabus albis.*

285. *Lyncea*, der *engliſche Groſspunkt.*

Fabric. S. E. p. 635. no. 79.
Seticornis; alis rotundatis, albis, faſciis duabus punctoque apicis fuſcis.

286. *Exſpectata*, der *aſiatiſche Roſtrand.*

Fabric. S. E. p. 636. no. 82.
Seticornis; alis rotundatis viridibus, *margine ferrugineo.*

287. *Duplicata*, die *engliſche Doppelſtreife.*

Fabric. S. E. p. 636. no. 84.
Seticornis; alis griſeis; ſtrigis duabus fuſcis *duplicatis.*

288. *Punctata*, der *engliſche Punktrand.*

Fabric. S. E. p. 637. no. 89.
Seticornis; alis rotundatis niveis, puncto medio fuſco, *margineque nigro punctato.*

289. *Sociata*, die *Engliſche Zahnbinde.*

Fabric. S. E. p. 637. no. 90.

 Seticor-

Seticornis; alis flavissimis, fascia lata, fusca, retrorsum dentem exserente.

290. *Niveata*, der *Amerikanische Schneespanner.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 94.

Seticornis; alis striatis, *niveis*, immaculatis.

291. *Costata*, die *Amerikanische Rostrippe.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 95.

Seticornis; alis niveis; anticis *costa ferruginea.*

292. *Stictiicata*, der *Afrikanische gepickelte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 96.

Seticornis; alis concoloribus rufis, margine nigro, albo-punctato.

293. *Capitata*, der *Indianische Rostkopf.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 97.

Seticornis; cinerea; *capite* thoracis alarumque margine basi *ferrugineis.*

294. *Argentata*, der *Chinesische Silberstrich.*

Fabric. S. E. p. 638. no. 99.

Seticornis; alis apice flavis; *anticis* strigis duabus *argenteis;* posticis macula quadruplici nigra.

295. *Sulphurata*, der *Indianische Schwefelspanner.*

Fabric. S. E. p. 639. no. 100.

Seticornis; alis flavis; maculis margineque postico fusco-ferrugineis.

296. *Perspectata*, der *Ostindianische Spiegelspanner.*

Fabric.

Fabric. S. E. p. 640. no. 107.

Seticornis; alis anticis griſeis, *hyalino-maculatis*; poſticis *hyalinis*; margine flavo, *hyalino*-maculato.

297. *Indicata*, der *Tottiſche orientaliſche Spanner.*

Fabric. S. E. p. 640. no. 106.

Seticornis; alis flavis; *anticis* ſtrigis tribus, duabus undatis, fuſcis.

Muſ. *Tottianum.*

298. *Derogata*, der *orientaliſche Königsſpanner.*

Fabric. S. E. p. 641. no. 109.

Seticornis; alis albis; ſtrigis plurimis fuſcis. *Koenig.*

299. *Ejectata*, der *orientaliſche, glasfleckichte Spanner.*

Fabric. S. E. p. 641. no. 110.

Seticornis; alis fuſco flavoque variis; maculis *hyalinis* ſparſis.

300. *Feneſtrata*, das *Amerikaniſche Glasfenſter.*

Fabric. S. E. p. 641. no. 111.

Seticornis, flava; alis *albo-hyalinis*; ſtrigis flavis numeroſis, ſubanaſtomoſantibus.

301. *Strigaria*, der *oſtindiſche Strichſpanner.*

Fabric. S. E. App. p. 831. no. 9-10.

Pectinicornis; alis angulato-caudatis, albis; *ſtrigis* undatis fuſcis, ſupra duabus, ſubtus unica.

302. *Equeſtraria*, der *gelbe Ritter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 284. no. 11-12.

Pectinicornis; alis angulatis; anticis fuscescentibus, *fascia lata flava*, posticis flavis.

Habitat *Hamburgi*.

303. *Ilyraria*, der *Surinamische Bartafter.*

Fabric. Mantiss. p. 284. no. 17-18.

Pectinicornis; alis angulatis viridibus; anticis strigis tribus fuscis.

Anus *rufo-barbatus.*

Cramer Pap. exot. I. t. 10. fig. E. Ph. *Ilyrias.*

304. *Monilaria*, der *Indianische grüne Zahnflügel.*

Fabric. Mantiss. p. 285. no. 15-16.

Pectinicornis; *alis dentatis viridibus*, striga punctorum nigrorum; posticis puncto duplici albo.

305. *Roraria*, der *europäische Braunreif.*

Fabric. Mantiss. p. 285. no. 24-25.

Pectinicornis; alis flavis *fusco-irroratis*; anticis apice nigris.

306. *Ditaria*, der *Hamburgische Rostfleck.*

Fabric. Mantiss. p. 286. no. 33-34.

Pectinicornis; alis viridibus, maculis marginalibus ferrugineis.

307. *Marginaria*, der *Hamburgische Randstrich.*

Fabric. Mantiss. p. 286. no. 40-41.

Pectinicornis; alis albidis pulverulentis, omnibus striga marginali punctorum nigrorum.

308. *Cynara*, die *Surinamische Zynara.*

Fabric. Mantiss. p. 286. no. 47-48.

Seticor-

Seticornis; alis angulatis, fuſco-albo-nigro-fulvoque variis; poſticis ſubtus albis.

Cramer Pap. exot. II. t. 15. fig. CD. Ph. *Cynara.*

309. *Sinuata*, der *Winkelſpanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 287. no. 49-50.

Seticornis; alis emarginato-griſeis; punctis duobus fuſcis inter ſtrigas albidas.

In *Germania.*

310. *Mantata*, der *Surinamiſche Mantoſpanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 287. no. 49-50.

Seticornis; alis angulatis fuſcis; faſcia obſcuriore, anteriorum puncto ocellari atro.

Cramer Pap. exot. I. t. 10. fig. F. Ph. *Manto.*

Müllers Regiſt. Band p. 312. Ph. *Manto*, der *Dreyeckflügel.*

311. *Obſcurata*, der *Schulziſche Zahnflügel.*

Fabric. Mantiſſ. p. 287. no. 54-55.

Seticornis; alis dentatis griſeis, ſtrigis pallidioribus undatis obſoletis.

In *Germania.*

312. *Nitata*, der *kleine Wiſchpunkt.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 55-56.

Seticornis; alis ſubdentatis obſcure griſeis; ſubtus pallidioribus puncto faſciaque fuſcis.

In *Germania.*

313. *Equeſtrata*, der *ſchwarze Ritter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 65-66.

Seticornis; alis omnibus *nigris*, faſcia fulva.

Habitat *Hamburgi.*

314. *Coerulata*, der *himmelblaubandirte Spanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 67-68.

Seticornis; alis obſcure viridibus fuſco-faſciatis, faſciisque duabus *coeruleis.*

Hamburgi.

315. *Griſata*, der *Grauling.*

Fabric. Mantiſſ. p. 288. no. 72-73.

Seticornis; alis *griſeis;* anticis ſtriga, faſcia punctoque fuſcis.

Habitat *Hamburgi.*

316. *Fimbriata*, der *Gelbſaum.*

Fabric. Mantiſſ. p. 289. no. 77-78.

Seticornis; alis plumbeis; faſcia lata fuſca *flavo-marginata.*

In *Germania.*

Schaeff. Icon. t. 80. fig. 6. 7.

317. *Rivulata*, der *ſchwarzbandirte Spanner.*

Fabric. Mantiſſ. p. 289. no. 79-80.

Seticornis; alis albidis; *faſciis duabus nigris;* poſteriore terminali.

In *Germania.*

318. *Lunulata*, der *Gelbmond.*

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 84-85.

Seticornis; alis fuſcis poſtice ſtrigis undatis flavis.

Verſus marginem poſticum ſtrigae tres *e lunulis flavis.*

In *Germania.*

319. *Me-*

319. *Mediata*, der *Zentralpunkt.*

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 89 - 90.

Seticornis; alis omnibus griſeo - undatis, *punċto centrali* fuſco margineque nigro - punctato.

In *Germania.*

320. *Centrata*, das *ſchwarze Zentrum.*

Fabric. Mantiſſ. p. 290. no. 90 - 91.

Seticornis; alis flaveſcentibus, fuſco - undatis; *anticis punċto centrali nigro.*

Habitat *Hamburgi.*

321. *Variegata*, die *Buntſchecke.*

Fabric. Mantiſſ. p. 291. no. 92 - 93.

Seticornis; alis omnibus purpureis, maculis margineque flavis.

Habitat *Hamburgi.*

322. *Melata*, der *Nordamerikaniſche Rothafter.*

Fabric. Mantiſſ. p. 291. no. 99 - 100.

Seticornis; alis atris albo - maculatis; *ano rufo.*

Cramer Papill. exot. II. t. 18. fig. D.

323. *Elevata*, der *Südamerikaniſche Silberſaum.*

Fabric. Mantiſſ. p. 291. no. 107 - 108.

Seticornis; alis flaviſſimis, fuſco - punctatis (argenteo - ciliatis), ſubtus immaculatis.

324. *Matronaria*, der *Matronenſpanner.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 49. no. 433.

Pectinicornis; alis undatim faſciatis; anticis cinereis fuſcisque, poſticis cinereis.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1455. — Litura angulo apicis inferiori. — *Schaeff.* Icon. t. 12. f. 1. 2?

325. *Faginaria*, der *Buchenſpanner.*

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 126. no. 1456.
Subpectinicornis; alis dentato-eroſis, fulvis; *anticis* ſtrigis duabus transverſis fuſcis; *poſticis* unica.

326. *Curvata*, das *Krummhorn.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1469.
Ph. G.? Seticornis, ſpirilinguis, *corniculis* duobus recurvis baſi criſtatis, alis plano incumbentibus.
Norv. *Forvaelde.*
Stroem Söndmör 190. no. 9.

327. *Alternata*, die *Wechſelbinde.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1484.
Seticornis; alis dentatis, faſciis albis nigricantibusque alternis, ſtriga marginali duplici undata.
— Faun. Fridr. p. 51. no. 452.
Schaeff. Icon. t. 126. fig. 2.

328. *Teſſulata*, der *Würfelrand.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1485.
Seticornis; alis omnibus *margine teſſulato*, diſco cinereo, ſubtus luteſcentibus; ſtrigis undulatis albis.
— Faun. Fridr. p. 51. no. 453.

329. *Vſtulata*, der *Brandſpanner.*

Mülleri

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1487.

Seticornis; alis glaucis; ſtrigis tribus undatis, interruptis, albis, margine nigro teſſulato.

330. *Paſcuata*, der *Viehweidenſpanner.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1488.

Seticornis; alis albis; ſupra ſtrigis quinque ſublutescentibus; ſubtus tribus nigricantibus punctoque diſci nigro.

331. *Flexuata*, die *Bogenlinie.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1490.

Seticornis; alis murinis; anticis lineis transverſis tribus, *media flexuoſa;* omnibus ſubtus ſtrigis duabus punctoque diſci obſcuris.

332. *Duplicata*, der *Zwillingfleck.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1491.

Seticornis; alis flaveſcentibus, macula media ocellari *didyma* nigra; margine poſtico fuſco.

Strigae duae obſcurae *undulatae* in quibusdam.

333. *O. Miata*, der *O M Spanner.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1492.

Seticornis; alis albidis, ſtrigis quatuor cinereis, ſecunda in figuras *literarum O M* curvata.

334. *Albata*, der *doppelte Weißſtrich.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 127. no. 1493.

Seticornis; alis anticis luteo-fuſcis baſi apiceque ferrugineis; poſticis cinereis, *ſtriga duplici alba.*

335. *Flammata*, der *Flammenſpanner*.

Sepp Nederl. Inſ. VI. p. 21. t. 5. De *Worbelhout-Vlinder.*

Seticornis, alis fuſcis *flammeolatis*; poſticis cinereis, lineis undulatis transverſis albis.

336. *Fulvo-ſtriata*, der *braungelbgeſtrichte Spanner*.

Geoffr. Inſ. II. p. 131. no. 45.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis; alis patentibus albido-luteis; omnibus fulvo transverſim denſe ſtriatis.

La *Phalene ſtriée fauve.*

Long. 5. lign. *Larg*. 1. pouce.

337. *Inaequalis*, die *ungleiche Queerlinie*.

Geoffr. Inſ. II. p. 132. no. 47.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, fuſco-nebuloſis; *lineis transverſis inaequalibus*.

La *Bande inégale.*

Long. 7. lign. *Larg*. 13. lign.

338. *Marginaria*, der *Bindenpunkt*.

Geoffr. Inſ. II. p. 133. no. 49.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereo-obſcuris, linea faſciaque alarum transverſa obſcuriore; *puncto marginali nigro*.

La *Bande à point marginal.*

Long. 5. lign.

339. *Griſeo-nigra*, der *ſchwarzgraue Spanner*.

Geoffr. Inſ. II. p. 134. no. 51.

Phalaena pectinicornis ſpirilinguis, alis patentibus *cinereis*; atomis maculisque nigris.

La

La *Griſaille.*
Long. 11. 12. 14. lign.

340. *Sulcata*, die *weiſse Pickelbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 134. no. 52.
Phalaena ſeticornis ſpirilinguis, alis patentibus cinereis, faſciis plurimis transverſis, nonnullis connexis, atomisque fuſcis.
La *rayure blanche picotée.*
Long. 5. lign. *Larg.* 13. lign.
Raj. Hiſt. Inſ. p. 180. no. 6.
Phalaena media, colore vario e ſordido flaveſcente ſeu fulveſcente et nigro, cum tribus lineis transverſis nigris in exterioribus alis.

341. *Ferruginata*, die *Roſtbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 140. no. 62.
Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus albidis, atomis cineraſcentibus, et faſcia duplici undulata *ferruginea.*
Les *atomes à deux bandes.*
Long. 5½ lign. *Larg.* 1 pouce.

342. *Interrupta*, die *Bruchbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 141. no. 65.
Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus niveis; omnibus pone faſcia undulata fuſca, ſuperiorum margine externo maculis nigris.
La *bande interrompue.*
Long. 4½ lign. *Larg.* 8 lign.

343. *Brunneata*, die *Braunlinie.*

Geoffr. Inſ. II. p. 142. no. 67.

Ph.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus albis; linea duplici undulata *fuſca.*

La *Phalene blanche à lignes brunes ſans points*

Long. 5. lign. *Larg.* 1. pouce.

344. *Limbata,* der *Zahnſaum.*

Geoffr. Inſ. II. p. 143. no. 70.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus cinereis, faſciis plurimis fuſcis undulatis transverſis, *limbo ſubdentato.*

La *Brocatelle brune.*

Long. 4. lign.

345. *Fuſco-venoſa,* die *Braunader.*

Geoffr. Inſ. II. p. 144. no. 72.

Ph. Setic. ſpiril. alis patentibus cinereis, margine exteriore fuſco, punctoque alarum nigro.

La *Nervure brune.*

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

346. *Viridi-faſciata,* die *Grünbinde.*

Geoffr. Inſ. II. p. 144. no. 73.

Phal. Setic. ſpiril. alis patentibus viridi-fuſcoque variegatis, faſcia triplici undulata obſcuriore.

La *Phalene à bandes vertes.*

Long. 5. lign. *Larg.* 11. lign.

347. *B. ata,* der *Neuyorkiſche B-Spanner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 15. t. 7. f. 2.

Ailes environ *un pouce & demi.*

Setic. Alis *anticis* furvis, flavo-lineatis, verſus apicem *litera B. flava; poſticis* hilare rubris atro-maculatis.

348. *Lineola*, die *Neuyorkiſche Einlinie.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 16. t. 8. f. 2.

Ailes environ *deux pouces.*

Seticornis. Alis dentatis aurantiacis concoloribus; *lineola unica* tranſverſa per omnes alas fuſca.

349. *Uncinularia*, der *Neuyorkiſche Hakenſpanner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. I. p. 17. t. 8. f. 3. *)

Ailes *un pouce & trois quarts.*

Pectinicornis. Alis pallide viridi-flaveſcentibus, *atro-uncinulatis.*

Cramer Pap. exot. III. t. 228. Fig. E. Ph. *Catenaria.*

350. *Argentata*, der *ſierraleoniſche Silberſpanner.*

Drury Illuſtr. of nat. hiſt. Vol. II. p. 25. t. 14. f. 2.

Ailes *presque un pouce & trois quarts.*

Seticornis; alis cinereis, *bacillis flavis, argenteo-marginatis; poſticis ocellis binis nigris.*

351. *Area*, die *ſurinamiſche Area.*

Cramer Pap. exot. I. p. 88. t. 56. Fig. D.

Alis concoloribus niveis; *anticis* margine anteriore binis lineolis luteis; *poſticis* dentato-ciliatis, quatuor lineis incurvatis aurantiacis, anticarum partem tangentibus.

352. *Cydonia*, die *ſurinamiſche Zydonia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 34. t. 22. Fig. F.

Alis

*) Ich bin ungewiſs, ob die Phal. *Drury* I. t. 20. f. 3. 4. Geometrae oder Noctuae ſind.

Alis fuſco-cinereis albicantibus margine obſcuriore; *anticis* binis lineis transverſis fuſcis, albo-marginatis.

353. *Deolis*, die *weſtindiſche Deolis.*

Cramer Pap. exot. I. p. 59. t. 36. Fig. F.

Alis *anticis* ſubfalcatis, dente prominente, viridi-micantibus, binis ocellis nigris, iride aurantiaca, *poſticis* incarnatis.

354. *Diores*, die *ſurinamiſche Diores.*

Cramer Pap. exot. I. p. 119. t. 75. Fig. F. *Mas.*

Alis fuſco-incarnatis, lineis transverſis fuſcis undulatis; *anticis* linea ex quatuor o compoſita; *poſticis* dentatis.

355. *Feſtiva*, der *ſurinamiſche Staatsſpanner.*

Cramer Pap. exot. I. p. 112. t. 71. Fig. C. *Mas.*

Alis griſeo-albis, nigro-venoſis.

356. *Heſparia*, die — *Heſparia.*

Cramer Pap. exot. I. p. 87. t. 56. Fig. C.

Alis antice cyaneis; poſtice purpuraſcentibus, media faſcia transverſa lata incurvata alba.

357. *Merops*, der *ſurinamiſche Merops.*

Cramer Pap. exot. I. p. 26. t. 18. Fig. C.

Alis rubicunde variegatis; linea transverſa albido-atra undulata.

358. *Myrrha*, die *ſurinamiſche Myrrha.*

Cramer Pap. exot. I. p. 47. t. 29. Fig. G.

Alis *ochreaceis* concoloribus aterrime marginatis; linea *anticarum* transverſa atra.

359. Sy-

359. *Syringa*, die *koromandelſche Syringa.*

Cramer Pap. exot. I. p. 8. t. 5. Fig. CD. *Foem.*

Alis *anticis* vireſcentibus; transverſis faſciis rubicundis; *poſticis* rubris nigro-maculatis.

360. *Amabilis*, die *ſurinamiſche Schöne.*

Cramer Pap. exot. II. p. 24. t. 112. Fig. G. *Belle Cloporte.*

Alis niveis; *anticis* longitudinaliter late fuſco-faſciatis; *poſticis* puncto et litera J *deauratis*; atomis numeroſis nigris.

361. *Carinenta*, die *koromandelſche Karinenta.*

Cramer Pap. exot. II. p. 47. t. 128. Fig. F.

Magna. Alis denticulatis vireſcentibus punctatis; *anticis* binis lunulis literisque 7 atris; lineolisque longitudinalibus undulatis nigris.

362. *Cenis*, die *chineſiſche Zenis.*

Cramer Pap. exot. II. p. 82. t. 147. Fig. E.

Alis albicantibus fuſco-maculatis, corpore aurantiaco; *thoracis imagine humana* atro-ſignata, abdominis annulis nigris.

363. *Faſciata*, der *bataviſche Bandſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 12. t. 104. Fig. D.

Alis niveis; faſciis transverſis incarnatis; *poſticis* acute dentatis, tribus margine exteriore punctis atris.

364. *Geminia*, die *amboiniſche Geminia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 57. t. 133. Fig. C.

Alis niveis, transverſe fuſco-faſciatis; *anticarum* margine anteriore nigro-liturato; *poſticis* obtuſe

obtuſe dentatis, dentium baſi binis maculis atris.

Clerk Icon. t. 50. f. 3. 4. Geom. ***Sambucaria.*** (Alſo nicht *Linn. Samb.)*

365. *Gyges*, der *ſurinamiſche Gygesſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 9. t. 102. Fig. B.

Alis furvis; *anticis* binis lituris albis; *poſticis* diſco albo.

366. *Hilaria*, die *ſurinamiſche Hilaria.*

Cramer Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. F.

Alis *anticis* incarnatis, faſcia transverſa ſulphurea, binis ocellis nigris, iride aurantiaca; *poſticis* aurantiacis.

367. *Hypanus*, der *ſurinamiſche Hypanusſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 42. t. 142. Fig. D.

Alis caneſcentibus; faſciis fuſcis transverſis; multisque globulis fuſcis.

368. *Labda*, der *ſurinamiſche Labdaſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 129. t. 181. Fig. D.

Alis *anticis* flaveſcentibus, bacillo transverſo luteo; *poſticis* albis margine incarnatis, omnibus ciliatis.

369. *Lacticinia*, die *koromandelſche Laktizinia.*

Cramer Pap. exot. II. p. 47. t. 128. Fig. E.

Alis furvis; *anticis* quatuor maculis albis, binis anterioribus coalitis, punctisque binis albis; *poſticis* albo-fuſcis.

370. *Lothos*, der *ſurinamiſche Lothosſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 136. t. 185. Fig. G.

Alis

Alis fuſcis aurantiaco-faſciatis, lineolisque transverſis nigris undulatis.

371. *Marmorata*, der — *Marmorſpanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 87. t. 151. Fig. F.

Alis *marmoratis* atro-punctatis lineolisque transverſis undulatis nigris; *poſticis* denticulatis.

372. *Netrix*, die — *Näherinn.*

Cramer Pap. exot. II. p. 87. t. 151. Fig. E.

Alis dentatis viridi-flaveſcentibus, numeroſis punctis cineraſcentibus; *poſticis* binis maculis albis ſinuoſis.

373. *Oſiris*, die *ſurinamiſche Oſiris.*

Cramer Pap. exot. II. p. 28. t. 115. Fig. E.

Alis nigris, quatuor magnis maculis hilare flavis.

374. *Perdica*, die — *Perdika.*

Cramer Pap. exot. II. p. 127. t. 178. Fig. E.

Alis incarnatis, fuſco-marginatis, *anticis* faſcia transverſa fuſca, et *ſemicirculo* fuſco communi.

375. *Phylira*, die *ſurinamiſche Phylira.*

Cramer Pap. exot. II. p. 113. t. 170. Fig. D.

Alis concoloribus viridibus, *anticis poſticisque* binis ocellis fuſcis glauco-pupillatis; *poſticis* dentatis.

376. *Polita*, der *ſurinamiſche V-Spanner.*

Cramer Pap. exot. II. p. 65. t. 139. Fig. E.

Alis flavissimis fusco-maculatis; *anticis* binis litteris V fuscis versus marginem anteriorem; *posticis* dentatis, macula inaequali fusca magna.

377. *Rhanis*, die *westindische Rhanis.*

Cramer Pap. exot. II. p. 34. t. 119. Fig. BC.

Alis virescentibus, disco communi rubescente, quatuor uncinulis rubris binis maculis flavis, lineaque transversa alba undulata.

378. *Amata*, der *surinamische Liebling.*

Cramer Pap. exot. III. p. 62. t. 228. Fig. F.

Alis niveis, hilare-viridi-longitudinaliter fasciatis.

379. *Apidania*, die *surinamische Apidania.*

Cramer Pap. exot. III. p. 103. t. 152. Fig. CD. C. *Mas.* D. *Foem.*

Alis concoloribus olivaceis, violaceo-lituratis.

380. *Brunnea*, der *surinamische Bräunling.*

Cramer Pap. exot. III. p. 171. t. 187. Fig. G.

Alis nigro-purpurascentibus, atro-transverse fasciatis.

381. *Canente*, die *koromandelsche Kanente.*

Cramer Pap. exot. III. p. 98. t. 250. Fig. C.

Alis incarnatis, fusco-lituratis.

382. *Clelia*, die *koromandelsche Klelia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 172. t. 288. Fig. BC.

Alis dentato-falcatis fusco-canis; atomis numerosis nigris, *posticis* margine furvis.

383. *Eleonora*, die *koromandelſche Eleonora.*

Cramer Pap. exot. III. p. 172. t. 288. Fig. EF. *Mas.* G. *Foem.*

Alis fuſco - olivaceis ſubdentatis luteo - alboque marginatis, faſcia transverſa communi alba.

384. *Erota*, die *ſurinamiſche Erota.*

Cramer Pap. exot. III. p. 152. t. 276. Fig. G.

Alis nigerrimis concoloribus, faſcia transverſa communi aurantiaca; *poſticis* margine binis lineis coeruleis.

385. *Flaviaria*, der *ſurinamiſche Gelbling.*

Cramer Pap. exot. III. p. 171. t. 287. Fig. F.

Alis ſubfalcatis; *anticis* flavo - olivaceis; *poſticis* hilarioribus.

386. *Formoſanta*, die *ſurinamiſche Formoſanta.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. G.

Alis fuſco - rubris; *poſticis* binis ocellis nigris albo - pupillatis iride alba, punctisque argenteis.

387. *Gootenaria*, die *ſurinamiſche Gootenaria.*

Cramer Pap. exot. III. p. 102. t. 252. Fig. B.

Magna. Alis fuſcis; *anticis* nigro - hieroglyphicis, tribus maculis albis; *poſticis* lineis longitudinalibus nigris undulatis.

388. *Heſperia*, die *Guinéiſche Heſperia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 99. t. 251. Fig. A. *Foem.* B. *Mas.*

Alis albo-virefcentibus, bafi fufco-radiatis; lineis transverfis apice fufcis; *pofticis* nigro-venofis, margine aurantiaco-fufcis.

389. *Lincea*, die *furinamifche Linzea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 61. t. 228. Fig. B.

Alis nigro-fufcis; *anticis* tribus maculis olivaceis, apice pofticisque femiluteis.

390. *Polita*, die *furinamifche Polita.*

Cramer Pap. exot. III. p. 152. t. 276. Fig. F.

Alis incarnatis, fafciis transverfis communibus flaviffimis; *pofticis* fafciis marginalibus flavis, aureis luteisque.

391. *Tafima*, die *furinamifche Tafima.*

Cramer Pap. exot. III. p. 80. t. 240. Fig. DE.

Alis falcato-dentatis incarnatis, numerofis punctis nigris, fafciis longitudinalibus communibus olivaceis luteisque.

392. *Titea*, die *virginifche Titea.*

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. C.

Alis grifeis; *anticis* atro-punctatis, ftrigisque transverfis fufco-nigris; *pofticis* linea marginali nigra undulata.

393. *Trofonia*, die *kapenfifche Trofonia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 92. t. 247. Fig. F.

Alis *anticis* ferrugineis, albo-maculatis; *pofticis* incarnatis.

394. *Vesulia*, die *surinamische Vesulia.*

Cramer Pap. exot. III. p. 79. t. 240. fig. B C.

Alis griseo-flavescentibus, atro-punctatis, nigro-venosis; *posticis* binis acervulis punctorum atrorum.

395. *Virginiaria*, die — *Virginiaria.*

Cramer Pap. exot. III. p. 149. t. 275. fig. G.

Alis griseis, fulvo-punctatis, lineis longitudinalibus undulatis fuscis continuis et interruptis.

396. *Martia*, die *surinamische Martia.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 32. t. 305. fig. D.

Alis subdentatis, *anticis* incarnatis fasciis transversis latis, strigisque undulatis fuscis; *posticis* rubescentibus.

397. *Nina*, die *surinamische Ninà.*

Cramer Pap. exot. IV. p. 31. t. 305. fig. E.

Alis *anticis* glaucescentibus fusco-maculatis, striatisque; *posticis* rubescentibus margine postico albo.

398. *Degeeriaria*, der *Degeerische Holunderspanner.*

Degeer Ins. Tom. II. Part. I. p. 446. no. 2.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes horizontales d'un brun griseatre, à grandes taches luisantes d' un blanc jaunâtre.

Phalene du Sureau.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 326. no. 2.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und horizontalen braungrau-

 lichen

lichen Flügeln, mit groſsen, glänzenden, weiſs-gelblichen Flecken.

Die *Holunderphaläne.*

Goed. Inſ. Tom. I. (ed. gall.) t. 68.
Liſt. Goed. p. 136. no. 55. f. 55.
Blank. Inſ. t. 15. F. G. H.
Albin. Inſ. t. 37. a b c d.
Réaum. Inſ. Tom. I. t. 15. f. 7. 8. 9.

399. *Biſtortata*, der *Natterwurzſpanner.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 449. no. 5. t. 8. f. 16.

Phalene à antennes filiformes, à trompe, à ailes étendues, d' un blanc ſale variées de nuances griſes, avec deux lignes transverſes d' un brun noirâtre ſur chaque aile.

Phalene blanche ſale à deux rayes noirâtres.

— *Ueberſ.* II B. I Th. p. 330. no. 5. t. 8. f. 16.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüſſel, und weiſsgrauen, breiten, mit graulichen Schattirungen, geſcheckten Flügeln, und zwo braunſchwärzlichen Queerlinien auf jedem.

Die ſchmuzigweiſse Phaläne mit zwo ſchwärzlichen Streifen.

400. *Nigro-faſciaria*, die *Schwarzſtreife.*

Degeer Inſ. Tom. II. Part. I. p. 457. no. 8. t. 9. f. 5.

Phalene à antennes filiformes; à trompe; à ailes étendues couleur de lilas mêlée de gris & de blanc ſale, avec trois rayes ondées transverſes noires.

Phalene lilas à rayes noires.

Degeer Uebers. II B. I Th. p. 336. no. 8. t. 9. f. 5.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und breiten, lilafarbigen, grau und schmuzigweiss gemischten Flügeln, mit drey schwarzen gewässerten Queerstreifen.

Die lilafarbige Phaläne mit schwarzen Streifen.

401. *Abietaria*, der *Tannapfelspanner.*

Degeer Ins. Tom. II. Part. I. p. 462. no. 10. t. 9. f. 12.

Phalene à antennes filiformes, à trompe; à ailes étendues grises à rayes ondées noires & griseatres, avec un point noir & une bande d'un brun roussâtre.

Phalene de l' arpenteuse de la Pomme de Sapin.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 340. no. 10. t. 9. f. 12.

Die *Phaläne* mit fadenförmigen Fühlhörnern, Saugrüssel, und breiten grauen Flügeln, mit wellenförmigen, schwarzen und graulichten Streifen, einem schwarzen Punkt, und einer braunröthlichen Binde.

Der Tannapfelspanner.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Goeze, Johann August Ephraim,

Entomologische Beyträge Zu Des Ritter Linné Zwölften Ausgabe Des Natursystems

Bd.: Dritten Theiles Dritter Band

Leipzig 1781

Zool. 212-3,3/4
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10307324-6
VD18 80328849